

萬氏女科

下

婦人科

產后章

產后專以補虛爲主其有他疾以未治之今併催生之法設爲問答以盡病源以著治法臨產之工庶有所憑司命之寄亦可無負

○難產

問難產者何也曰前章已條矣多因產母倉皇坐艸太蚤或胞氣雖破見身未轉或轉未順被母用力努責以致足先來者謂之逆產手先來者謂之橫產或滯其肩與耳與額者謂之側產

或被勝帶纏絆不得下者謂之碍產倉卒之間一命所係不可無法而臨爲仁之術也

○救逆產

令其產母正身仰卧務要定心定神不可驚怖却求惜熟穩婆
剪去手甲以香酒潤手將兒足輕輕送入又再推上兒身必轉
面待身轉頭正然後服前催生之藥酒則飲以蜜水饑則食以
薄粥然後扶掖起身用力一送兒即生矣此在穩婆之良否粗
事蠢人不可用也切不可使針刺足心及鹽塗之法此痛上奪
一命難存

○救橫產

萬家金

法半如上仍將兒手輕輕送入再推上摸定兒肩漸漸扶正令頭順產門后進催生之藥飲食之物一切如上扶正兒卽小矣
忌用針刺

○救側產

亦令母仰卧法如上穩婆用灯審視或肩或額或左或右務得其真以手法輕輕扶撥令正仍服藥食如前法起身用力兒卽下矣

○救礙產

令母仰臥穩婆用燈審視看臍帶絆着兒之何處仔細以手法輕輕取脫服藥食如前法扶起用力一送卽下矣

○盤腸生

問_云者何曰當產之時子腸先出盤露于外子隨後_云產后而腸不卽收此謂盤腸生也若不忍見蓋由平日氣虛不能收束血熱易于流動下元不固關鍵不牢致如此若救治之法于子下衣來之后却令產母仰臥穩婆先將子腸溫水洗淨惹帶之物然后托起輕輕送入推而上之却令產母兩足交緊穀道裏腸自收上也或取草麻子日十九粒去壳搗爛付在頂心待

湯散而急去之次也或用冷水和醋令人噴面一噴二噴
漸收之又其次也欲免其苦者宜于此後無孕時多服地黃
加五味子兩肉桂兩以固下元之關鍵及有孕時多服胡連兩
加人參兩以補氣又服三補丸以涼血如滑胎瘦胎之藥不可
輕服于八月之時再服八物湯加訶子 瞿麥 粟壳服十餘
剎庶可免矣

○產子氣絕不啼

問三
云者何曰子欲下時并護其痛僵後傾側兩足不開扭夾
兒頭氣不得伸故生下悶絕不啼謂之寤生救法待胎衣來切

勿斷臍急取小鍋燒水以胎衣置湯中頻頻用水燒臍帶須臾氣煖入腹兒氣卽回啼聲發出矣若倉卒斷其臍帶不可救也

○子死腹中

問云者何曰兒當欲下之時被母護疼而足不開夾其頭而死者或因產母痛悶忍耐當事之人不善扶掖緊抱其腰以致傷胎而死者或因產難胞漿已乾生路漸塞于不得出氣閉而死者或因生路不順若逆側等症穩婆蠢庸用手莽撞反傷其子而死者以被臍帶纏頸氣絕而死者其候但觀其母口青手指青臍下冷日中有臭氣者子死腹中問矣急用炆味五苓散

奪命丹取去死胎以保其母 婦婆善取者尤妙如丹唇面頂
則難救矣

○胎衣不下

問云者何曰或因產母力之氣不轉運或因血少乾澀或因
子宮空虛吸貼而不下者急服加味五苓散甚快若倉卒無藥
可尋路土破艸鞋一隻近陰處軟繫臍帶數道而下務宜仔細
繫束繫定然疔斷其臍帶洗兒收養產母任其坐卧行立胎衣
自下有過旬日而爛下者易試有驗若不斷帶使子氣貫入衣
中衣轉浮脹而不得出矣夫寒之時猶不便于子也惟懼熱細

婦人經水不調 卷之三
醫善取胎者甚不勞力

○產後血暈

問云者何曰新產婦昏眩平倒不省人事口噤氣冷謂之血暈此惡候也不可救者多若誤作暗風庸醫殺之耳蓋由血暈之時不知用前防血暈等方所以有此其症有二當分治之如血來太多卒然昏仆者此氣血兩虛也急用茱萸醋嗅法以待其醒清魂散主之

澤蘭葉

人參

各一

荆芥穗

川芎

歸身

各一

茶葉水

酒各藥末煎一盞入重便一鍾同服

如血去少惡露未止腹中有痛而昏眩

者因_之法令醒黑神散

主之

黑豆一合

熟地

當歸

桂皮去

乾

薑炒

炙艸

白芍

酒炒蒲

黃各二

如上法服

○產後子宮脫山

問云

者何曰其人素虛產時用力努

責太過以致脫出白不

能收也宜用補中益氣湯外用洗法

荆

藁香葉

梟精

樹白皮炙等分剉細煎水無時洗之

子宮即入

○產後年見鬼神

問云者何曰心主血血去太多心神恍惚睡卧不安言謬失度如見鬼神俗醫不知呼爲邪祟誤人多矣茯神散主之

茯神 栢子仁 遠志 人參 當歸 生地 炙艸

各一

桂心五分積猪心一法如上煎服調辰砂和食后服

如心下脹悶煩燥昏乱狂言妄語如見鬼神者此敗血停積上干于心心不受觸便成此症芫當湯心湯主之

婦稍 川芎 玄胡索 蒲黃 牡丹皮

各

桂心七分水煎

調五灵脂另研末一錢食后服

○產后心痛

問云者何曰心者血之主其人宿寒內伏因產后虛寒血凝不行上衝心之絡脉故心痛也但以大果蜜湯治之寒去則血脉行而經絡通心痛自止若誤以芫散血攻之則虛極寒益其漸傳心之正經變為真心痛而死矣

生地 當歸身

獨活 吳茱萸

白芍

酒炒

乾薑

炒

炙艸

桂心

小艸

各一

細辛

五分

水煎熱服

○產後腹脹滿悶嘔吐惡心

問云

云

者何曰敗血散于脾胃脾受則

不能運化津液而或腹

脹胃受則不能受水穀而生嘔逆若以

平常治脹治嘔之劑則

藥不對症反增其病宜用抵聖湯主之

赤芍 半夏製 澤蘭葉 陳皮去人

參各二 炙艸各一 生薑五

分 水煎服

亦有傷食而腹脹嘔逆者以脉辨之因

于血則脉弦滿不惡食

而嘔多血腥因于食則脉弦滑而嘔多

食臭加味平胃散下之

蒼木米泔水浸焙

厚朴薑炒

陳皮

香附醋炒

人參各一

炙艸

生薑

倍名神麴炒一

水煎熱服或用見曉

九赤崔

眼曉丸

良薑炒

薑黃炒

薤白

陳皮去人

木 煨三稜 煨人參各等

分共示蘿日湯火煮熟研爲末和藥

白湯下

加味六君子湯治產後傷食嘔吐腹脹

六君加枳實

五分

川查

五分

薑黃

三分

○產後口乾痞悶

問云

云

者何曰由氣血大虛中氣未足

更經太早脾胃不能清

化麪毒結聚于胃土燠胸中是以有此

也頓勿下之見曉

主之

若其臟氣本虛宿夾積冷胸腹脹痛嘔

吐惡心飲食減少亦因

新產血氣暴虛風冷乘之以致寒邪內勝宿疾益加吳茱萸湯
主之

吳茱萸炒 桔梗 乾薑炒 炙艸 半夏洗 細辛 當歸

白茯苓 杜心 陳皮 薑引水煎熱服

若因胎衣未下惡露不來肚腹脹大細急如鼓嘔吐黃水等

腥臭加喘者死

若因產后多疾妄接湯丸重虛其內

損精神痰用少

氣之乾嘔者死

○產后咳嗽

問云者何曰產後或有惡露上攻注
八肺經乃成咳嗽其症

胞肺脹悶宜服二母湯主之

二母 貝母 白茯苓 人參各一 杏仁各一 桃仁各一 水煎服

後溫服

又曰肺主氣也為衛所以充皮毛衛腠理也產後氣虛衛虛皮
毛不充腠理不密風寒乘之先入于肺肺小成咳嗽其症癸執強
寒鼻塞声重或多噴嚏鼻流清涕旋服化湯主之

旋覆花 赤芍 煎胡 半夏 荆芥穗 甘菊 白茯苓

五味 麻黃去根 杏仁 各等分 薑 蜜三引 煎服如前

有汗者去麻黃加桂枝如發久不止涕唾稠帶加味其枯
湯至之

甘州 桔梗 欬冬 其叶 前胡 枳壳 白朮 五味

麥冬 各等分 漿竹葉十五片煎服
如產后吃塊

早者難治

口產後喉中氣 謔謔

問云二者何曰榮者血也衛者氣也六

血下過多榮血暴竭衛氣無毛獨聚肺

經陰最爲難治也取鞋底灸熱于小腹