

臨證指南醫案卷十

古吳葉桂天士先生著

許關李大瞻翰通

錫山華南田岫雲同校

邵銘新甫

幼科要畧

按襁褓小兒體屬純陽所患熱病最多世俗醫者固知謂
六氣之邪皆從火化飲食停留鬱蒸變熱驚恐內疳五
志動極皆陽奈今時治法初則發散解肌以退表熱仍
混入消導繼用清熱苦降或兼下奪再令病家禁絕乳



乳雖不可禁
絕然大宜減
少佐以米飲
不令生疾爲
妙矣也

食每致胃氣索然內風來乘變見驚癇告斃甚多附記
世俗通套之方藥於左不可不知不足取法也

防風 荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通

赤芍 藟子 厚朴 陳皮 山查 麥芽

枳殼 神麴 鈎藤 夏佐香薷冬佐麻黃羌活

兩三日熱不解

柴胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹

薄荷 葛根 木通 鈎藤 厚朴 枳實

瓜瀉實 九劑必用大黃

四五日不解但言食滯未盡表裏不和總以柴苓小陷



錄出諸品藥
戒人不可輕
用及觀後幅
所用之藥仍
不出此諸味
則前後相背
又要知此等
藥總在用之
得宜不對症
則用之有害
不必錄出垂
戒反啟後人
之疑也

胸若嘔逆煩渴用竹茹黃連半夏若痰多喘促即用葶
藶杏仁蘇子荀子胆星貝母甚者加牛黃此皆套法所
當戒也

屢清消不愈便無方法苟不變驚必曰骨蒸孩勞所用
藥餌不分氣血陰陽但知見症施治如早涼暮熱必用

地骨皮 丹皮 生地 玄參 甘草 北沙參

石斛 知母

有痰加

蘇子 杏仁 貝母 橘紅 胆星 桔梗

其鈎藤石斛茯苓穀芽之屬每劑必用總之取無故疲



藥待其自愈。倘有變症，希冀掩飾而已。

愚按嬰兒肌肉柔脆，不耐風寒。六腑五臟氣弱，乳汁難化。

內外二因之病自多。然有非風寒竟致外感，不停滯已。

屬內傷。其故何歟？皆由氣血不足。嘗思人在氣交之中，春夏地氣之升。

秋冬天令之降，呼出吸入，與時消息，間有穢濁吸入，即

是三焦受邪。過募原直行中道，必發熱煩躁。倘幼醫但

執前藥，表散消導，清火通便，病輕或有倖成，病重必然

顛覆。錢仲陽云：「冀履不可近襁褓小兒。」余言非無據矣。

四十年來治效頗多，畧述其槩云。

夫春溫夏熱，秋涼冬寒，四時之序也。春應溫而反大寒，夏

傷寒後學金丹名又

應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。皆
不正之乖氣也。病自外感。治從陽分。若因口鼻受氣。未
必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪。首先犯肺。發熱咳
喘。口鼻均入之邪。先上繼中。咳喘必兼嘔逆。膈脹雖因

外邪。亦是表中之裏。設宗世醫發散陽經。雖汗不解。幼

穉質薄神怯。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

伏氣

伏氣為病。當以清解三焦。黃芩湯用甘草。太少合利。如陰邪。涼膈。硝黃。梔子。翹。黃芩。甘。竹。存。有。燒。以。葉。塞。而。膝。湯。上。中。焦。燥。渴。之。消。清。心。涼。渴。加。黃。連。以。火。上。或。用。老。豆。豉。加。藍。根。占。青。

春溫一症。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。

入春發於少陽。以春木內應肝胆也。寒邪深伏。已經化

熱。昔賢以黃芩湯為主方。苦寒直清裏熱。熱伏於陰。苦

皆正論也

味堅陰乃正治也知溫邪忌散不與暴感門同法若因
外邪先受引動在裏伏熱必先辛涼以解新邪繼進苦
寒以清裏熱况熱乃無形之氣幼醫多用消滯攻治有
形胃汁先涸陰液劫盡者多矣

黃芩湯

葱豉湯 新邪引動伏邪

備用方

涼膈散

清心涼膈散

風溫

風溫者春月受風其氣已溫經謂春氣病在頭治在上焦
肺位最高邪必先傷此手太陰氣分先病失治則入手
厥陰心胞絡血分亦傷蓋足經順傳如太陽傳陽明人

皆知之肺病失治逆傳心胞絡幼科多不知者俗醫見
身熱咳喘不知肺病在上之旨妄投荆防柴葛加入枳
朴杏蘇荀子查麥廣皮之屬輒云解肌消食有是痰喘
便用大黃礞石滾痰丸大便數行上熱愈結幼穉穀少
胃薄表裏苦辛化燥胃汁已傷復用大黃大苦沉降丸
藥致脾胃陽和傷極陡變驚癇莫救者多矣

按此症風溫肺病治在上焦大風溫春溫忌汗初病投
劑宜用辛涼若雜入消導發散不但與肺病無涉劫盡
胃汁肺之津液上供頭目清竅徒爲熱氣薰蒸鼻乾如
燥目瞑或上竄無淚或熱深肢厥狂躁溺瀉胸高氣促

正論

可急救非此不

皆是肺氣不宜化之徵斯時若以肺藥少加一味清降
使藥力不致直趨腸中而上痺可開諸竅自爽無如城
市庸醫僉云結胸皆用連薤柴枳苦寒直降致閉寒食
甚告斃甚多

按此症初因發熱喘嗽首用辛涼清肅上焦如薄荷連
翹牛蒡象貝桑葉沙參梔皮薤皮花粉若色蒼熱勝煩
渴用石膏竹葉辛寒清散痧症亦當宗此若日數漸多
邪不得解芩連涼膈亦可選用至熱邪逆傳八膈中
昏目瞋鼻竅無涕淚諸竅欲閉其勢危急必用至寶
或牛黃清心丸病減後餘熱只甘寒清養胃陰足矣



子室年堂之意桃仁
 取辦行血清熱
 瀉白桑皮地骨皮
 甘性梗米四瓶宜
 參苓知若皆可入
 肺熱喘嗽此方施
 白布石羔知甘梗
 陽以經熱此能振
 品之加入人考者
 煩燥熱咳止久傷
 以藥石羔湯之考
 麥冬姜麥梗米林
 暑煩熱渴脈虛者
 補腎瀉肺立二經
 清涼救肺桑葉麥
 石羔杏仁麻胡仁
 桑在阿膠枇杷葉

備用方葦莖湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

葶蘆大棗湯

白虎湯

至寶丹

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

喻氏清燥救肺湯

夏熱

夏為熱病然夏至已前時令未為大熱經以先夏至病溫
 後夏至病暑溫邪前已申明暑熱一症幼醫易眩夏暑
 發自陽明古人以白虎湯為主方後賢劉河周創議迥
 出諸家謂溫熱時邪當分三焦投藥以苦辛寒為主若
 拘六經分症仍是傷寒治法致悞多矣蓋傷寒外受之



續醫諸痿喘喉

夜多目母心毒入

血枯生地此厚

亦要

大順散乃治

暑月傷冷之

方也何得連

類及之

臨證指南醫案

卷十

寒必先從汗解辛溫散邪是已口鼻吸入之寒即為中

寒陰病治當溫裏分三陰見症施治若夫暑病滿方甚

必皆因前人畧於暑詳於寒耳考古如金匱暑暍瘧之

因而潔古以動靜分中暑中熱各具至理茲不槩述論

幼科病暑熱夾雜別病有諸而時下不外發散消導加

入香薷一味或六一散一服考本草香薷辛溫發汗能

泄宿水夏熱氣閉無汗渴飲停水香薷必佐杏仁以杏

仁苦降泄氣大順散取義若此長夏濕令暑必兼濕暑

傷氣分濕傷氣汗則耗氣傷陽胃汁大受劫爍變病

由此甚多發泄司令裏真白虛張鳳達云暑病首用辛

妙法

涼縱用甘寒。再用酸泄酸斂不必用。下可稱要言不煩矣。然幼科因暑熱蔓延變生他病。茲摘其旣

受熱厥逆

夏令受熱昏迷若驚。此爲暑厥。卽熱氣閉塞孔竅所致。其邪入絡與中絡同。法牛黃丸至寶丹芳香利竅可效。神甦以後用清涼血分知連翹心竹葉心玄參細生地鮮生地二冬之屬。此症初起大忌風藥。初病暑熱傷氣竹葉石膏湯或清肺輕劑。大凡熱深厥深四肢逆冷。但看面垢齒燥二便不通或瀉不爽爲是大忌。誤認傷寒也。

疳



幼兒斷乳納食值夏月脾胃主氣易於肚膨泄瀉頭熱足心熱形體日瘦或煩渴善食漸成五疳積聚當審體之強弱病之新久有餘者當疏胃清熱食入糞色白或不化當健脾佐消導清熱若濕熱內鬱蟲積腹痛道滯驅蟲微下之緩調用肥兒丸之屬

口疳

夏季秋熱小兒泄瀉或初愈未愈而口皆生疳蝕嘗有阻塞咽喉致危者此皆在裏濕盛生熱熱氣蒸灼津液不升濕熱偏傷氣分治在上焦或佐淡滲世俗常刮西瓜翠衣治疳取其輕揚滲利也

夏季濕熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運濕着內蘊

七

皆屬於脾。以健脾燥濕爲穩。治治之不效。技窮束手矣。
不知凡病皆本乎陰陽通表利小便。乃宣經氣利腑氣。
是陽病治法。暖水臟溫脾腎。補方以驅水。是陰病治法。
治肺痺以輕開。上治脾必佐溫通。若陰陽表裏乖違。臟
眞日漓。陰陽不運。亦必作脹。治以通陽。乃可奏績。如局
方禹餘糧丸。甚至三焦交阻。必用分消。腸胃室塞。必用
下奪。然不得與傷寒實熱同例。擅投硝黃枳朴。擾動陰
血。若太陰脾臟飲濕阻氣。溫之補之。不應欲用下法。少
少甘遂爲九可也。其治實症選用方法備採。

方太峻

備用方 葶藶大棗湯

渴白散

大順散

諸方亦即太
猛厲者不可
輕用

牡蠣澤瀉散

五苓散

越婢湯

甘遂半夏湯

控涎丹

五子五皮湯

子和桂苓湯

禹功丸

茯苓防己湯

中滿分消湯

小青龍湯

木防己湯

附記一徐姓小兒單脹數月。幼科百治無功。僉用肥兒

九萬安散磨積丹綠礬丸雞肫藥俱不效。余謂氣分不

效。宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸鬚桃仁延胡山甲

蛻螂廔蟲靈脂山查之類。為丸。十日全愈。

吐瀉霍亂

吐瀉一症。幼兒脾胃受傷。陡變驚搐最多。若是不正穢氣



觸入或口食寒冷。套用正氣散六和湯五積散之類。正氣受傷。肢冷呃忒。嘔吐自利。卽用錢氏益黃散。有痰用星附六君子湯。理中湯等。倘熱氣深伏。煩渴引飲。嘔逆者。連香飲黃連竹茹橘皮半夏湯。熱閉神昏。用至寶丹。寒閉用來復丹。

食瓜果泄瀉

穉年夏月食瓜果水寒之濕着於脾胃。令人泄瀉。其寒濕積聚未能遽化。熱氣必用辛溫香竄之氣。古方中消瓜果之積。以丁香肉桂或用麝香。今七香餅治瀉亦祖此意。其平胃散胃苓湯亦可用。

瘧

瘧因暑發居多。方書雖有痰食寒熱瘴癘之互異。幼穉之

瘧都因脾胃受病。然氣怯神弱。初病驚癇厥逆為多在

夏秋之時。斷不可認為驚癇。大方瘧症須分十二經與

欬症相等。若幼科庸俗。但以小柴胡去參。或香薷葛根

此說何來。此七終身與柴胡為仇何也。

之屬。不知柴胡動肝。陰葛根竭胃。汁致變屢矣。幼科純

陽暑為熱氣症。必熱多煩渴。邪自肺受者。桂枝白虎湯

二進必愈。其有冷食不運。有足太陰脾病見症。初用正

氣。或用辛溫。如草果生薑半夏之屬。方書謂草果治太

陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之熱。瘧久色奪唇白汗