


續名醫類案

第三十一



續名醫類案卷三十一

錢塘魏之琇編集

僕院呂大綱慎會
海昌王士雄孟英
同校

癰疽

李東垣治通父家翟梗于尻臀上足太陽經生癰堅硬腫痛

大作左右尺脈俱緊按之無力羌活黃柏各二錢防風藁

本連翹各一錢肉桂七分甘草蒼朮陳皮各五分當歸一

錢黃耆一錢五分酒二大盞水一大盞煎至一盞去渣空

心熱服以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈



南京中醫藥大學圖書館藏

子族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側廉上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脈之俱弦大浮數而重按似澁曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變症以人參一斤作膏下以竹瀝病者吝費招一外科以十宣五香散閒與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召視之核稍高大似有膿于中起一紅線延過肩後斜走繞背脊過入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脈同前但弦多耳作人參膏合芎朮生薑汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮甘草半夏生薑百餘帖而安此等若在春令雖神仙不治

也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏驟補何由得免

朱朗年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一腫毒此是冷折熱在肺經血分與此方葇仁黃藥子赤芍歸頭條苓各三錢青皮角刺桂枝各二錢甘草節一錢分四帖煎服一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前飲以忍冬藤渣敷腫上

呂穉人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此方白朮川芎各三錢赤芍連翹各二錢半防風陳皮黃芩各二錢木通錢半甘草五分分五帖煎服

鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初患額絲竹空

涌出一角。長短大小如雞距稍堅。求治曰：此非膏粱所致，而何宜斷厚味？先解食毒。針灸以開泄壅滯，未易治也。此少陽經所過，氣多血少者。鄭以憚煩召他醫，以大黃枳實腦子等涼藥罨之。一夕豁開如醬，蚘徑三寸。一二日後血自蚘中濺出，高數尺而死。此涼藥外逼，熱鬱不得發，宜其發之暴如此也。

陳自明外科精要云：神仙截法治癰疽發背一切惡症。預服則毒氣不入內。真麻油一斤，銀石器內熬十數沸，候冷用酒兩碗入油五盞，通口熱服。一日用盡，緩則數日服之。吳安世云：吾家三世用之，無有不驗。又云：獵者云：凡中藥齏

急飲麻油藥毒卽消鄭學諭德甫屢用之甚驗

薛立齋治一男子患癰腫硬疼痛發熱煩躁飲冷脈沈實大便秘乃邪在臟也用內疏黃連湯疏通之以絕其源先投一劑候行一次勢退一二再進一劑諸症悉退乃用黃連消毒散四劑而消

一男子患癰膿熟不潰欲針之補以托裏不信乃服攻毒藥及致惡心少食始悟而用針更以六君子湯加藿香當歸四劑少可再以加味十全大補湯數劑而斂凡瘡膿熟不行針刺膿毒侵蝕輕者難療重者不治老弱之人或偏僻之處及緊要之所若一有膿宜急針之更以托裏庶幾無

變

一男子患癰作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以托裏藥潰之而愈大抵瘡疽之症寒熱虛實皆能作痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以溫熱之劑散之因風而痛者除其風因溼而痛者導其溼燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡閉澀者利之慎勿概用寒涼之藥況血脈喜溫而惡寒若冷氣入裏血卽凝滯反爲難瘥矣

馮楚瞻治趙翁年七十二右頰腫硬連及顙項耳後一片堅

實不熱不痛已兩月餘諸治不效漸至口內出膿牙際不
開飲食少進精神日衰脈則洪大而空知爲元氣大虧陰
寒所聚所謂石疽是也。不得陽和。何以外解。若內潰日久
穿喉破頰不可療矣。乃用豬脂搗爛入肉桂細末葱頭食
鹽杵勻。厚敷患處。敷藥以脂膏治血肉同氣相應也。葱能

透竅。鹽能軟堅。桂能行血。油能浸潤皮膚。內則空心生脈
飲送八味丸食。遠志參耆歸苓苓朮薄桂銀花角刺之類。
使陽回則陰寒自解。血氣沖和。自能逐毒。三五日後冰硬
者熱軟。漫腫者高聳。木者疼痛。紫者紅活。飲食日進。血氣
漸長。毒既外出久凝久瘀之血肉消者消膿者膿不再旬

而愈。

張景岳治一儒者年近三旬素病聾耳發必潰膿至是益甚自耳根下連頸項上連頭角耳前後莫不腫痛或與散風降火一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日必出鍾許而腫痛全不消枕不可近察其形色已大不足而腫痛則若有餘脈之或急或緩弱此非實熱可知遂先與六味湯二三劑元氣稍振繼與一陰煎加牛蒡伏苓澤瀉倍加白茯苓爲君服五十餘劑外用降癰散晝夜敷治兩月而後愈蓋此症雖似潰瘍有餘而實以肝腎不足上實下虛一奇

症也何奇之有

張通府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛彼以爲痰結核其脈軟而時見數經云脈數不時見則生瘡也非痰結仲景云微弱之脈主血氣俱虛形精不足又云沈遲軟弱皆宜托裏遂以人參白朮黃耆當歸川芎炙草以託裏少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火化痰外帖涼藥覺寒徹腦患處大熱頭愈重飲食愈少復請治以四君子湯加藿香炮干薑數劑飲食漸進膿成刺之更以十全大補湯去桂及炙草貼以豆豉餅又月餘而愈

胡生耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛發熱煩躁喜冷此膽

經蘊熱而發先用神仙活命飲一劑勢減二三時值仲冬彼惑於藥有用寒遠寒之禁故不再服自用十宣散託裏之藥勢漸熾耳內膿潰復請治視其喉腫閉藥不能下而歿

一婦人年逾四十近環跳穴生一毒尺脈沈緊腿不能伸經曰脾寒移于肝癰腫筋攣夫脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸治之少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消

一婦人倏傷次指成膿不潰焮痛至手誤敷涼藥以致通焮微嘔少食彼以爲毒氣內攻診其脈沈細此痛傷胃氣而

然也遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進更服八珍湯
加黃耆白芷桔梗月餘而愈又一後生亦患此色黑不痛
其指已死欲令斬去速服補劑恐黑上臂不治彼不信另
服敗毒藥手竟黑遂不可救又一男子亦傷拇指色紫不
痛服託裏藥及灸五十餘壯作痛潰膿而愈又吳舉人幼
女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而
愈又藍上舍女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿數滴謂足
大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘀血去陽氣至
瘡口自合否則不治彼忽之不早治後變勞症而歿蓋至
陰之下血氣難到若女人患此又多因扎縛致血脈不通

或被風邪所襲。則無氣血榮養。遂成死肉。惟當壯其脾胃。行其經絡。生其血氣。則愈。其有成破傷風。以致牙關緊急。口眼喎邪者。先以玉真散一二服。然後投以通經生血之劑。

于御郎骸胛患毒痛甚。服消毒藥。其勢未減。卽以槐花酒一服。勢隨大退。再以託裏消毒之藥而愈。

立齋曰。予丙子年。忽惡心。大椎骨甚痒。須臾臂不能舉。神思甚倦。此天疽危病也。急隔蒜灸之。痒甚愈。又明灸五十餘壯。痒遂止。旬日而愈。精要云。灸法有回生之功。信矣。大凡蒸灸若未潰。則拔引鬱毒。已潰。則接補陽氣。祛散寒邪。瘡

口自合其功甚大其法用大獨蒜切片如三錢厚貼疽頂上以艾炷安蒜片上灸之每三壯一易蒜若灸時作痛要灸至不痛不痛要灸至痛方止大概以百壯爲度膿潰則以神異膏貼之不日而安一能使瘡不開大二內肉不壞三瘡口易合見效甚神丹溪云惟頭爲諸陽所聚艾壯宜小而宜少

王大廣年逾六十素厚味頰頤患毒未潰而肉先死脈數無力胃經積毒所致致頤頰正屬胃經未潰肉死則胃氣虛極老人豈宜患此辭不治果歿內經云膏粱之變足生大疔受如持虛

黃履素曰子座師茅五芝先生長公子子京偶于腎間患一
毒地非要害直易視之子京素知醫恐痛傷元氣輒服人
參其毒愈甚發寒熱乃始延醫又遇粗工潰後胸膈應服
參者又不能多服竟致不能收口而歿蓋癰疽初起先宜
瀉毒而後議補若補之太早遂有此禍可鑒也

邱汝誠面生疽即買藥舖肆所合神芎散九予之曰以此療
之其人怒不肯服歸而告人人曰未必非良法也服之即
瘥蓋其人嗜酒此丸實去酒病云

揮塵
新談

彭羨門少宰傳治腫毒初起方用錐子用銀簪插一孔用明
透雄黃二錢研極細未入之仍以簪攪極勻封孔入飯內

蒸熟食之日三枚神效

居易錄

前宦都令李聘說麥粉不拘多少用陳醋熬膏貼無名腫毒

神效

雄按此名烏龍膏麥粉乃洗麤造麵筋澄下之粉也

徐靈胎曰瘍科之法全在外治其手法必有傳授凡辨形容

色以知吉凶及先後施治皆有成法必讀書臨症二者皆

到然後無誤其升降圍點去腐生肌呼膿止血膏塗洗熨

等方皆必純正和平屢試屢驗者乃能應手而愈至於內

服之方護心託毒化膿長肉亦有真傳非尋常經方所能

奏效也惟煎方則必視其人之強弱陰陽而爲加減此則

必通於內科之理全在學問根柢然又與內科不同蓋煎

方之道相同。而其藥則有某毒主某藥。某症主某方。非此不效。亦另有傳授焉。故外科總以傳授爲主。徒恃學問之宏博無益也。有傳授則較之內科爲尤易。惟外科而兼內科之症。或其人本有宿疾。或患外證之時。復感他氣。或因外症重極。內傷臟腑。則不得不兼內科之法治之。此必平日講於內科之道。而通其理。然後能兩全而無失。若不能治其內症。則并外症亦不可救。此則全在學問深博矣。若爲外科者。不能兼。則另請明理內科。爲之定方。而爲外科者。參議於其間。使其藥與外證無害。而後斟酌施治。則庶幾兩有所益。若其所現內症。本因外證而生。如痛極而昏。