

景說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏

錫山禪醉道人計廉能元讓

弟 特行季芳氏

曙葉舒嵩明韓氏

中風人覺大指大指麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀卒倒仆地不知人痰壅喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當腑中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟

唇緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉口眼歪又有中經亦



景說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏

錫山禪醉道人計廉能元讓

弟 特行季芳氏

婿葉舒嵩明韓氏

中風

人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣而為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀

外症

卒倒仆地不知人痰壅喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當辨中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟

者緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉口眼歪又有中經亦



要知六經無症。濁調和。口不能言。肢不持。古人曾作真氣治。三

家好論。亦須思東垣大率主氣虛。河開腎虛。兼火治丹溪。

內生痰。總是類中。分明註治之。先用開閉法。皂牙早去。

各三錢。俱為末。再加麝香吹鼻中。有嚏則生。無難活。醒後。

三合湯。茯苓陳甘半。應相當星。黃歸枯芩。連木竹。瀝薑汁。共。

湯左癱。屬血右屬氣。血虛加芍芎。芎生。地。用姜汁炒。瘀血桃仁。

與紅花。便黑或腹中塊痛。氣虛參芪也。同劑益汁遺尿亦如之。

小便不利不可利。姜蠶全蠍。閉塞加。鈞藤善治牙關閉。肥人烏。

附少以引經。烏頭附子。氣是人參。亦要忌。右寸有力去參。恐風。

盛自汗身體痛。防風羌活并薄桂。頭目不利或頭疼。芎正。莫制。



要須無汗身疼加芷芷青防蒼朮秦艽配心血虧欠神恍惚
疾神遠志菖蒲入或心動驚悸者酸棗竹茹辰砂益風
盛須瞻星防枳牙皂瓜藹不食傷越步山查廷便秘還須
行大便結用三化湯厚朴太黃枳實羌活等分每服一兩微利之

示吉日東南類中風者多或從火痰氣而泊寔有神驗若果
係風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便秘
者三化湯通滯之後方用本湯調理更爲切當至于治口眼
歪斜方法固多不如馮夷車地龍只至左針右歪右針左
病可立愈

傷風



頭痛發熱鼻不通惡風自汗。旋傷風脈來浮緩兼無力。參蘇散。
服自然鬆。人參紫蘇及枳椇。桔梗乾葛。前胡同。陳皮茯苓。
夏木香少許水姜攻。加減咳嗽去參加桑杏。去皮以內有
黃芩進痰唾如膠。金沸草胸滿痰多。襲貝順冬月自汗桂枝。
若還無汗麻黃令傷食厚朴麴麥芽中酒白寇烏梅信頭疼羌活。
不可無氣喘杏蘇亦莫剩。

示吉日人之易于傷風者其故有二。一因元氣虛乏氣不衛
外風乘虛入治宜參芪益氣而佐以散邪。一因素有鬱熱在
內毛竅常開邪風易入治宜芩連清火而佐以疎風。此皆氣
虛鬱熱為本風為標也。治本則標自愈。



中寒

中寒傷寒殊非一

傷寒在後

傷則漸深中直入初起極冷

無熱不渴身戰慄脉來無力又沉渾加味理中湯有益

草并乾姜加桂陳皮功妙極寒甚附子及吳黃

監抄附侯

夏叶有力生姜煎就須冷服

供其所主先其所因也

無脉猪胆

一麝香

吃泄瀉不止加芪升姜汁三匙

黃帝

嘔吐入舌捲囊指指甲青脉絕

蒸臍不可忽

蒸臍法○用麝香半夏皂夾末一匙填臍中後用生薑片

貼于臍上放大艾火于姜片灸二七壯灸關元氣海各二七

壯熱通于中逼寒出外手足溫緩則生 一用硫黃麝香末

填臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅
再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連
五餅應用

暑病

暑天病熱名暑症腹痛吐瀉冒暑病頭痛身熱躁不寧身如
刺傷暑應寒熱自汗出不止咳嗽倦怠為中暑脈虛身熱動而
得之病屬陽加味香薷湯可止香薷冬五苓草皮厚扁麥味人白黃茯苓明黃陳朴豆木瓜次
第尋黃連燈心姜棗服氣虛參朮共芒璽寒熱柴芩為要藥香薷
加藿半注為精濕合澤猪真妙訣去未渴用知粉藥如神綿綿
腹痛傷冰冷乾姜滑石法從心去退小水不利或短赤浮渴山



桃并滑石。摘搗加羌。號暑風胸滿。寢候消食。積自汗不止。用

芪水。瀉木通。澤有益。頭痛川芎并石。羌。痰。胸。瓜。藹。及。枳。寢。

法。若居涼館。喜風涼。頭疼惡寒。頭項強身。形拘急。熱無汗。

得之陰寒傷。此因暑致病。宜服羌活并蒼朮。厚朴。乾葛。及薑香。

等分薑三片。水煎熱服。號并陽。湯。兼食神。麴。滑石炒。內傷冰冷。

用炮姜。

示吉曰。夏至一陰生。人內寒而外熱。若過食冰冷。及連需益。

元寒涼之劑。遂至寒積于中。而成內傷寒症。凡吐瀉而腹痛。

無休歇。脉來遲緩者是也。治宜理中湯。合平胃散。溫之寒甚。

加附子。如誤投香薷飲。則危矣。

注夏

溫熱蒸人夏日長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四肢倦怠
少不如常好卧口乾或泄瀉治用清暑益氣湯黃芪升麻
宋錢一參^{人白皮}木陳麴澤瀉^黃栢^黃麥冬青皮及當歸乾葛三分
味九粒甘草水煎引姜蜜盜汗還加浮小麥便赤滑石并山
渴甚天花烏梅食^{去蒼}頭痛川芎石羔好噉加羔杏升蒼出木
香砂仁胸不寬瀉加肉寇茯苓^{去萎}的^{去萎}

濕

東南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲
寒因而得小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身



實燥土滲濕湯可識伏苓香附半陳皮厚朴澤瀉蒼白朮引
砂仁并姜棗臨服半匙鹽可入外濕寒熱身腫痛羌防木
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳實黃連山查炒下
閉木通車前力濕熱發黃仗茵陳山梔車前兼滑石

示吉日治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風輩微汗
是也在裏在下者潔淨府用五苓輩利小便是也丹溪云濕
得燥則豁然而收用蒼朮是也濕從風散用羌獨活類是也
濕久則生熱用黃連山梔是也從此而變通之竟能活人
麻黃止可用二三分益汗多恐生變症耳

火



南京中医药大学图书馆藏

相火命門君火心二火一水不相均腎水經所謂五臟氣

并皆是火氣有餘便是火妄動須知燥至陰經所謂一水不勝二火

法一一從頭說與君心火亢極陽強病人吐氣寔不勝五火也古人謂

狂便閉用硝黃精大承氣湯朴硝大黃大便如常芩連黃連黃芩

熱錯語呻吟不眠煩躁脉數乾咽芩黃連黃芩栝山梔烏梅水煎服治大寔火可瀉從上方隨經

治須臾定飲食勞倦身發熱元氣少分曰傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝補中益氣湯人參黃芪當歸白朮陳皮甘草升麻柴胡生薑大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火耳寒降知栝四物法

通靈四物湯當歸生薑芍藥川芎腎水受傷陰虛病面紅耳熱

火盛左尺洪數無根火栝龜六味治如神六味地黃丸地黃山藥茱萸肉茯苓



脾色板空心弱已上補虛火升

脾中央火鬱之症升散之升陽散火最為良

四肢乏力肌熱筋痺或骨髓中熱用升麻葛根羌活白

參各五分炙甘草生甘草柴胡各三分防風二分牛水煎

寒涼物去獨活及生

命門火衰陽脫病面赤煩躁虛火盛

脈沉陰極躁回陽救急

中聖

起肝之火陰火還從臍下生腳下熱來侵腹者新入虛極藥

示言按積熱論曰治火之法始而涼和次而寒取寒取不

則因熱而從之從之不愈則技窮矣是從知治熱以寒而不

知熱之不哀由于真水之不足也。當壯水之主以制陽光。經曰：寒之而熱者取之陰陰，腎水也。求其屬也。此獨為積說。愚意治火除人壯氣寒者便秘者火微者從正治外傷。道此為則。蓋火非水不降，未有腎水足而心火熾者也。勝離湯是為火症之總司。湯見勞瘵。

內傷

飲食勞倦是內傷。或因飢飽過行房風寒傷人。名外感。辨明証。症病無妨。至少人迎盛。手背熱。寒熱邪作無間。歇惡寒無汗。鼻不通。此是外感。君須別內傷之症。氣口洪。手心有熱。微惡風寒熱。同作不知味。更兼氣弱。語言慵。內傷惡寒得煖解。外感近火寒。

仍攻外感內傷相挾者。脉症並見。須辨通內傷不足急補之外。

感有餘瀉不同。或先補養或先散。先後之間無為從。治內傷

益氣用黃人當白麻胡草皮。柴歸木升柴甘與陳引加姜棗水煎服。氣和微汗最。

為精。校腎水虧酒炒。入心養血。紅三分升麻柴胡目汗。

間不睡加棗仁。炒為末赤。川芎蔓荆頭疼用日乾乾葛藥為靈。

巔頂痛時辛藁本。細。怔忡驚悸棗茯神。甚者再加遠志。食加麴芽。

查枳椇瀉添澤瀉芍茯苓黃連枳椇除胸悶有痰前半茯苓為君。

防己木瓜除脚弱龍骨牡蠣。煨為末。治遺精防老正莖身熱用。兼。

寒頭疼。者加。虛火知母栢元參。火炎上。黃芩黃連清內熱菊花熟地。

醫眼疼。

傷食

後天之本屬脾胃。納化飲食。滋榮衛。胃主納飲食不下為胃

養生妙法。節飲食。脾胃受傷。飲食倍。脾主化飲食不消為

食。腹痛。累或吐瀉。時下洩。屁種種皆因傷食。例甚則發熱。胸腹飽悶并作酸

疼。惟身不痛。傷寒異。有傷食類傷寒左關平和。左關緊。香砂。

胃功有濟。蒼朮。陳皮。厚朴。此四味香附。砂仁。香理。氣川。芎。

枳。檳。并藿。香。木。姜。煎。服。食。須。忌。消。肉。查。菓。消。麵。卜。消。糯米。食。酒。

藥。麴。飯。食。神。麴。及。麥。芽。生。冷。瓜。菓。姜。青。遂。糯米索。粉。傷。時。加。有。

仁。西瓜。多吃。食。鹽。促。魚。傷。橄。欖。椒。紫。蘇。稻。草。將。來。消。牛。肉。麝。香。

能。消。蔬。菓。積。葛。梅。白。寇。酒。傷。入。枳。壳。桔。梗。除。胸。滿。挾。氣。烏。桤。寒。



姜益傷飲須合四苓湯。飲茶湯涼水之類四苓茯苓澤瀉猪苓白朮嘔吐臨服加姜

汗白朮茯苓治脾虛泄瀉車前寇白朮。已上清導之法上部有脉

脉其人當吐不吐卒指物探吐是良方否則瓜蒂散有力

豈為未溫水調。黃芩食積鬱久成濕熱芩連大黃不可缺再入

并澤瀉去蘆砂仁蒼朮訣胃中停滯生冷物心腹急痛人暴卒

大黃乾姜巴豆肉等分為末名備急蜜丸豆大服三九或吐或

瀉痛自息。已上下良積法

按丹溪曰明知身受寒氣口吃寒物初得之宜溫散溫利稍

久則成鬱鬱久則成熱熱久則生火若仍用溫藥寧不助火

添病乎宜用辛涼以發表辛寒以理中邪易伏而病易退也



至東垣則有輕則損其穀。重則逐其滯之論。益少壯新病。宜推逐急去為美。如老人久病。又宜導化漸去為佳。此二旨真消導法中口訣。故特拈出。

調理脾胃

至哉坤元調脾胃。萬物資生無病累。胃陽納受是所司。脾陰消化精神遂。飲食自倍脾胃傷。潔古枳朮丸為最。白朮八兩將土炒。四兩枳椇炒。枳皮為末。子荷葉包米煨飯丸。一補一瀉方真好。半夏陳皮消痰用。理氣香砂不可少。元氣素弱脾不磨。食多腹內即不和。加入末香炒陳麴。白芍人參亦用多。素有痰火鬱胸膈。噯酸噯氣并酒積。炒梔連芍芩陳皮。砂仁木香茯苓入胃強。

