

血症

下血

溺血

痔
附腸風臟毒

脫肛

腎臟疔瘡

臙瘡

前陰病

痛風

痿

癩

鬼注

邪崇

顛狂心疾

怔忡

名醫類案 未



名醫類案卷第八

新都篁南江瓘集

後學

仁和余 集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁 and 沈 煥敦曾

重校

歙 鮑廷博以文

血症

張杲在汝州因出驗尸有保正趙溫不詣尸所問之即云劓

血已數斗昏困欲絕張使人扶掖至鼻血如簷滴張謂治

血莫如生地黃遣人覓之得十餘斤不暇取汁因使生服

漸及三四斤又以其滓塞鼻須臾血定又癸未娣病吐血

有醫者教用生地黃自然汁煮服

此治熱血妄行

日服數升三日



而愈有一婢半年不月見釜中餘汁輒飲數盃尋即通利其效如此

東垣治一貧者脾胃虛弱氣促精神短少衄血吐血以麥門

冬二分人參歸身三分黃芪白芍甘草各一錢

益血脫氣

五味

五枚作一服水煎稍熱服愈繼而至冬天寒居密室臥大

熱炕而吐血數次再求治此久虛弱外有寒形而有火熱

在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱夫

冬寒衣薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒

伸故血出於口憶仲景傷寒有云太陽傷寒當以麻黃湯

發汗而不與之遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同遂用

之以麻黃桂枝湯入參益上焦元氣而實其表麥門冬保
肺氣各三分桂枝以補表虛當歸身和血養血各五分麻
黃去根節去外寒甘草補脾胃之虛黃芪實表益衛白芍
藥各一錢五味三枚安其肺氣臥時熱服一服而愈

丹溪治一婦貧而性急忽衄作如注倦甚脉浮數重取大大

陽○脉亦有大則爲虛非重取而得之也且芫此陽滯於陰病雖重可治急以

萱草根入薑汁各半飲之本草云萱草根同薑汁服乃大熱衄血仙方就以四

物湯加香附側柏葉四服覺渴仍飲以四物十餘貼而安

有形之血不能速生無形之氣所當急固况症倦甚而衄
如注耶乃先生以爲陽滯於陰不投參朮而用四物後學

宜細心別焉

一壯年患嗽而咯血發熱肌瘦吐血發熱治女人要問經次行否恐氣升而不降當問經

木俞子容治案可法醫用補藥數年而病甚脉濇此因好色而多怒

精神耗少又補塞藥多榮衛不行瘀血內積肺氣壅遏不

能下降治肺壅非吐不可精血耗非補不可唯倒倉法二

者兼備但使吐多於瀉耳兼灸肺俞左二穴肺俞勝在三

椎骨下橫過各一寸半灸五次而愈

一人咳嗽吐血四物加貝母瓜蒌五味桑白皮杏仁欵冬花

柿霜今人治血大率如此

一人年五十勞嗽吐血以人參白朮茯苓百合白芍藥紅花

細辛細辛紅花配方甚奇黃芪半夏桑白皮杏仁甘草阿膠訶子青



一 黛瓜萸海石五味天門冬

一 人近四十咳嗽吐血四物換生地加桑白皮杏仁欵冬花

五味天門冬桔梗知母貝母黃芩

一 人不欵吐而血見口中從齒縫舌下來者藥用滋腎水瀉

相火治之不旬日而愈後二人証同俱以此法治之效

一 人因憂病欵吐血面黎黑色藥之不效曰必得喜可解其

兄求一足衣食地處之於是大喜即時色退不藥而瘳經

曰治病必求其本又曰無失氣宜是知藥之治病必得其

病之氣宜苟不察其得病之情雖藥亦不愈也

滑伯仁治一婦體肥而氣盛自以無子嘗多服煖宮藥積久



火盛迫血上行爲衄。衄必數升。餘面赤脉躁疾。神恍恍如癡。醫者猶以上盛下虛丹劑鎮墜之。伯仁曰。經云上者下之。今血氣俱盛。溢而上行。法當下導。奈何實實耶。卽與桃仁承氣湯三四下。積瘀旣去。繼服旣濟湯二十劑而愈。

一人病嘔血。或滿杯。或盈盆。蓋且二三年。其人平昔嗜市利。不憚作勞。中氣因之侵損。伯仁視之。且先與八寶散一二日。服黃芩芍藥湯。少有動作。卽進犀角地黃湯。加桃仁大黃湯。稍間服抑氣寧神散。有痰用礞石丸。其始脉甚大。後脉漸平。三月而愈。屢效。

一人乘盛暑往途中吐血數口。亟還則吐甚。胸拒痛。體熱頭

眩病且殆或以爲勞心焦思所致與茯苓補心湯仁至診其脉洪而滑曰是大醉飽胃血壅遏爲暑迫血上行先與犀角地黃湯繼以桃仁承氣湯去瘀血宿積後治暑卽安一人病咳血痰診其脉數而散體寒熱仁曰此二陽病也在法不治當以夏月死果然

子和治一書生過勞大便結燥欬逆上氣時喝喝然有音吐嘔鮮血以苦劑解毒湯加木香漢防已煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣月餘而痊

呂滄洲治一人病痢淡旬不止時天暑脉弱衆醫以氣虛不

統血老生常談曰進芪歸茸附滋甚求治呂至未食頃其所痢

血已三覆器矣及切其脉兩手皆虛芤右上部滑數而浮

躁脉浮參以時令其鼻赤查而色白即告之曰此得之酒酒酒毒

暴悍而風暑乘之熱蓄於上焦故血妄行而淖溢彼曰某

嘗飢走赤日已而醉酒向風臥公所診誠是為製地黃汁

二升許補其本兼用防風湯瀉其標飲之即效

項彥章治一婦患衄三年許醫以血得熱則淖溢服瀉心涼

血之劑益困衄纔數滴輒昏六脉微弱寸為甚曰肝藏血

而心主之今寸口脉微知心虛也心虛則不能司其血故

逆而妄行法當養心仍補脾實其子子實則心不虛矣虛則補母

有之虛而補子之說今見此案信哉醫理以琥珀諸補心無窮盡無方體也故其命方曰歸脾湯

藥遂安

許先生論梁寬父病，右脇肺部也。欬而吐血，舉動喘逆者，肺

脹也。發熱脈數不能食者，火來刑金，肺與脾俱虛也。脾肺

俱虛而火乘之，其病為逆。如此者，例不可補瀉。若補金則

慮金與火持而喘咳益增瀉，火則慮火不退位而疰癘反

甚。真知箇中三昧正宜補中益氣湯先扶元氣，少以治病藥加之。

聞已用藥未效，必病勢若逆，而藥力未到也。遠期秋涼，庶

可復爾。蓋肺病惡春夏火氣，至秋冬火退，只宜於益氣湯

中隨四時升降寒熱，及見有證增損服之，或覺氣壅間與

加減枳朮丸，或有飲間服局方枳朮湯數月，逆氣少回逆

氣回則可施治法。但恐今日已至色青、色赤及脈弦、脈洪，則無及矣。病後不見色脈，不能懸料。以既愈復發言之，惟宜依准四時用藥，以扶元氣。庶他日既愈不復發也。其病初感必深，恐當時消導尚未盡，停滯延淹，變生他証。以至於今，宜少加消導藥於益氣湯中，庶可漸取效也。

一人膏粱而飲，至今病衄。醫曰：諸見血者爲熱，以清涼飲子投之，卽止。越數日，其疾復作。醫又曰：藥不勝病，故也。遂投黃連解毒湯，或止或作。易數醫，皆用苦寒之劑，俱欲勝其熱而已。飲食起居浸不及初，肌寒而時躁，言語無聲，口氣臭穢。似熱惡如冷風，其衄之餘波則未絕也。或曰：諸見血者

熱。衄。熱也。熱而寒之理也。今不愈而反害之。何耶。內經曰。以平爲期。又言下工不可不慎也。彼惟知見血爲熱。而以苦寒攻之。抑不知苦瀉。土土脾胃也。脾胃人之所以爲本者。今火爲病而瀉其土。火未嘗除而土已病矣。土病則胃虛。虛則榮氣不能滋榮。百脉元氣不循天度。氣隨陰化而無聲。肌寒也。噫。粗工嘻嘻以爲可治。熱病未已。寒病復起。此之謂也。

吳球治一少年患吐血。來如湧泉。諸藥不效。虛羸瘦削。病危。亟脉之。沉絃細濡。其脉爲順。血積而又來。寒而又積。疑血不歸源故也。嘗聞血導血歸。未試也。遂用病者吐出之血。

瓦器盛之俟凝入銅鍋炒血黑色以紙盛放地上上火毒
細研爲末每服五分麥門冬湯下進二三服其血遂止後
頻服茯苓補心湯數十貼以杜將來保養半年復舊

徐德占治一人患衄尤急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯
立止蓋血自此入腦注鼻中常人以線勒頸後尚可止衄
此灸宜效

秀州進士陸迎忽得疾吐血不止氣壓驚顛狂躁跳躍雙目
直視至深夜欲拔戶而出如是兩夕諸醫盡用古方及單
方極療不瘳舉家哀禱事觀音夢授一方但服一料當永
除根用益智一兩生硃砂二錢青皮半兩麝香一錢爲細

未燈心湯下。治驚狂吐血陸覺取筆記之服之乃愈

一人勞瘵吐血取茜草一斤琇按後云翦草狀如茜草則此處當作翦草淨洗碎

為末入生蜜一斤和成膏以陶器盛之不得犯鐵器日一

蒸一曝至九日乃止名曰神傳膏令病人五更起面東坐

不得語言用匙抄藥如食粥每服四匙良久呷稀粟米粥

壓之藥只冷服粟米飲亦不可太熱或吐或下皆無害凡

久病肺損咯血吐血一服立愈

翦草狀如茜草又如細辛婺台二州有之惟婺可用

饒州市民季七常苦鼻衄垂困醫授以方取蘿蔔自然汁和

無灰酒飲之則止醫云血隨氣運轉氣有滯逆所以妄行



蘿蔔最下氣而酒導之是以一服效經五日復如前僅存

喘息而張思順以明州刊王氏單方刮人中白置新瓦上

火逼乾以溫湯調下即止按人中白能去肝火三焦火導膀胱火下行故也且不多用火

力則清涼矣今十年不作張監潤之江口鎮適延陵鎮官曾棠

入府府委至務同視海舶曾著白茸毛背子盛服濟潔正

對談之次血忽出如傾變所服為紅色駭曰素有此疾不

過點滴耳今猛來可畏覺頭空空然張曰君勿憂我當為

製一藥移時而就持與之血止不復作人中白者旋盆內

積鹹垢是也蓋秋石之類特不多用火力治藥時勿令患

人知恐其以為污穢不肯服此方可謂奇矣

魏華佗善醫嘗有郡守病甚佗過之郡守令佗診候佗退謂其子曰使君病有異於常積瘀血在腹中當極怒嘔血卽能去疾不爾無生矣子能盡言家君平昔之懣吾疏而責之其子曰若獲愈何謂不言於是具以父從來所乖謬者盡示佗佗畱書責罵之父大怒發吏捕佗佗不至卽嘔血升餘其疾乃平獨異志

蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄衄血甚已死入殮

血尚未止

誘按血未止則生氣猶存

一道人過之聞其家哭詢之道云

是會服丹或燒煉藥子藥之當卽活探囊出藥半錢七吹八鼻中立止得活乃梔子燒存性末之

一人鼻衄大出欲絕取茅花一大把水兩碗煎濃汁一碗分

二次服立止良方

一人指縫中因搔痒遂成瘡有一小竅血濺出不止用止血藥及血竭之類亦不效數日遂死復有一人於耳後髮際搔痒亦有小竅出血與前相似人無識者適有道人云此名髮泉但用多年糞桶籬曬乾燒灰敷之立愈使前指縫血出遇之亦可以無死矣

邵村張教官患衄血多諸治不效首垂任流三晝夜不止危甚一道人教用生蕪一枝搗貼顛顛更以海巴燒存性為末鵝管吹入鼻內二三次即止海巴俗名壓驚螺即雲南所用肥也

