

天集

癲狂痴𪔐 癰閉 秘結 詐病

癰風 諸蟲 諸毒 諸氣

卷三十四至三十六

景岳全書卷三十四

雜證謨

天集

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯超

謙菴訂

癲狂痴瘖

經義

陰則爲瘖

宣明五氣篇曰邪入於陽則狂邪入於陰則瘖搏陽則癲疾搏
生氣通天論曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂○陽不勝其

陰則五臟氣爭九竅不通

調經論曰血并於陰氣并於陽故爲驚狂

通天篇曰太陽之人多陽而少陰必謹調之無脫其陰而瀉其陽陽重脫者易狂陰陽皆脫者暴死不知人也

本神篇曰肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精○肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人

脉解篇曰太陽所謂甚則狂癲疾者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂癲疾也○陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故棄衣而走也

陽明脉解篇帝曰足陽明之脉病甚則棄衣而走登高而歌甚
至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能
者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能
登高也熱盛於身故棄衣欲走也陽盛則使人妄言罵詈不
避親疎而不欲食故妄走也

病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者
因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以知之岐伯
曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也帝
曰治之奈何曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其

食即已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者下氣疾也

通評虛實論帝曰癰疾何如岐伯曰脉搏大滑久自己脉小堅

急死不治帝曰癰疾之脉虛實何如岐伯曰虛則可治實則

死

大奇論曰心脉滿大癰癥筋攣○肝脉小急癰癥筋攣○二陰

急爲癰厥

邪氣臟腑病形篇曰心脉緩甚爲狂笑微瀼爲癰疾○肺脉急

甚爲癰疾○腎脉急甚爲骨癰疾

奇病論帝曰人生而有病癰疾者病名曰何安所得之岐伯曰

病名爲胎病。此得之在母腹中時。其有所大驚氣上而不
下。清氣并居。故令子發爲癲疾也。

寒熱病篇曰。暴變癲眩。足不任身。取天柱。

癲狂篇曰。癲疾始生。先不樂。頭重痛。視舉目赤。甚作極。已而煩。

心候之於顏。取手太陽陽明太陰血變而止。○癲疾始作。先。

反僵。因而脊痛。候之足太陽陽明太陰手太陽血變而止。○

癲疾始作而引口。帝呼喘悸者。候之手陽明太陽左強者攻。

其右。右強者攻其左。血變而止。○治癲疾者。當與之居。察其。

所當取之處。病至視之。有過者瀉之。置其血於盆盞之中。至。

其發時血獨動矣不動矣窮骨也○骨

癲疾者顛齒諸膈分肉皆滿而骨居汗出顛恍惚多沫沫氣

下泄不治○筋癲疾者身倦攣急大刺項大經之太籽脉嘔

多沫沫氣下泄者不治○脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而

縱脉滿盡刺之出血不滿灸之挾項太陽穴帶脉於腰相去

三寸諸分肉本輪嘔多沫沫氣下泄者不治○癲疾者痰發

如狂者死不治○以上俱言癲疾

一狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者憂飢

者憂飢

治之治之取手太

陽明血變而止及取足太陰陽明○狂始生少臥不飽自

高賢也。自辯智也。自尊貴也。善罵詈。日夜不休。治之取手陽明太陽太陰。舌下少陰視之盛者。皆取之不盛釋之也。○狂言驚善笑。好歌樂妄行不休者。得之大恐。治之取手陽明太陽太陰。○狂目妄見耳妄聞。善呼者。少氣之所生也。治之取手太陽太陰陽明。足太陰頭而顙。○狂者多食。善見鬼神。善笑而不發於外者。得之有所大喜。治之取足太陰太陽陽明。後取手太陰太陽陽明。○狂而新發。未應如此者。先取曲泉。左右動脈及盛者。見血有頃已不已。以法取之。灸骨骹二十壯。○以上俱言狂證。

長刺節論曰病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺
之虛脉視分盡熱病已止病初發歲一發不治月一發不治
月四五發名曰癲病刺諸分諸脉其無寒者以鍼調之病已
止

二十難曰重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾之始發少臥而不饑

自高賢也自辯智也自倨貴也妄笑好歌樂妄行不休是也

○癲疾始發意不樂僵仆直視其脉三部俱盛是也

論證 其二條

癲狂之病。病本不同。狂病之來。狂妄以漸。而經久難已。癲病之至。忽然僵仆。而時作時止。狂病常醒。多怒而暴。癲病常昏。多倦而靜。由此觀之。則其陰陽寒熱。自有冰炭之異。故難經曰。重陽者狂。重陰者癲。義可知也。後世諸家有謂癲狂之病。大概是熱。此則未必然也。此其形氣脉氣。自亦有據。不可不辨。察陰陽分而治之。

一癲卽癰也。觀內經所言癲證甚詳。而癰則無辨。卽此可知。後世有癲癰風癰風癲等名。所指不一。則徒滋惑亂。不必然也。又如別錄所載五癰曰。馬癰牛癰猪癰羊癰雞癰者。卽今人

之謂羊癲猪癲也。此不過因其聲之相似遂立此名。可見癲
癇無二。而諸家於癲證之外。又有癇證。誠屬牽強無足憑也。
又千金方有風癇驚癇食癇及陰癇陽癇之說。皆所當辨。并
列後條。

論治 共五條

凡狂病多因於火。此或以謀爲失志。或以思慮鬱結。屈無所伸。
怒無所洩。以致肝胆氣逆。木火合邪。是誠東方實證也。此其
邪乘於心。則爲神魂不守。邪乘於胃。則爲暴橫剛強。故治此
者。當以治火爲先。而或痰或氣。察其甚而兼治之。○若止曰

火邪而無脹閉熱結者。但當清火。宜拙薪飲。黃連解毒湯。三
補丸之類。主之。○若水不制火而兼心腎微虛者。宜硃砂安
神丸。或服蠶煎。二陰煎。主之。○若陽明火盛者。宜白虎湯。玉
泉散之類。主之。○若心脾受熱。叫罵失常。而微兼閉結者。宜
清心湯。涼膈散。三黃丸。當歸龍薈丸之類。主之。○若因火致
痰者。宜清膈飲。抱龍丸。生鐵落飲。主之。甚者宜滾痰丸。○若
三焦邪實熱甚者。宜大承氣湯下之。○若痰飲壅閉氣道不
通者。必須先用吐法。并當清其飲食。此治狂之要也。
癲病多由痰氣。凡氣有所逆。痰有所滯。皆能壅閉經絡。格塞

心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視手足搐搦腰脊
強直食頃乃甦此其倏病倏已者正由氣之倏逆倏順也故
治此者當察痰察氣因其甚者而先之至若火之有無又當
審其脉證而兼爲之治也○氣滯者宜排氣飲大和中飲四
磨飲或牛黃丸蘓合丸集成潤下丸之類主之○痰盛者宜
清膈飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾涎丸
之類主之○兼痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸丹溪潤下
丸之類主之○痰逆氣滯之甚者必用吐法吐後隨證調理
之

一癰疽證無火者多。若無火邪不得妄用涼藥。恐傷脾氣。以致變生他證。且復有陰盛陽衰。及氣血暴脫。而絕無痰火氣逆等病者。則凡四君四物八珍十全大補等湯。或乾薑桂附之類。皆所必用。不得謂癰疽盡屬實邪。而概禁補劑也。若真陰大損。氣不歸根。而時作時止。昏沉難愈者。必用紫河車丸。方可奏效。○其有虛中挾實。微兼痰火。不清而病久不愈者。集驗龍腦安神丸。最得其宜。隨證增減。可爲法也。

一痴瘖證。凡平素無痰。而或以鬱結。或以不遂。或以思慮。或以疑貳。或以驚恐。而漸致痴瘖。言辭顛倒。舉動不經。或多汗。或

善愁其證則千奇萬怪無所不至。脉必或弦或數。或大或小。變易不常。此其逆氣在心。或肝胆二經氣有不清。而然。但察其形體強壯。飲食不減。別無虛脫等證。則悉宜服蠻煎治之。最穩最妙。然此證有可愈者。有不可愈者。亦在乎胃氣元氣之強弱。待時而復。非可急也。○凡此諸證。若以大驚猝恐一時偶傷心胆。而致失神昏亂者。此當以速扶正氣爲主。宜七福飲。或大補元煎。主之。

一小兒無狂證。惟病癲者。常有之。凡小兒之病。有從胎氣而得者。有從生後受驚而得者。蓋小兒神氣尙弱。驚則肝胆奪氣。

而神不守舍。舍空則正氣不能主。而痰邪足以亂之。故凡治小兒之驚癇。必須先審正氣。然後察其病邪。酌宜治之。諸法俱載小兒門。所當詳究。

述古 共四條

千金方云。小兒之癇有三。風癇。驚癇。食癇也。○風癇緣衣煖汗出。風因入也。初時先屈指如數。乃作。○驚癇起於驚悸。大啼乃作。○食癇其先不哺乳。而變熱後發。或先寒後熱者。皆食癇也。○又云。病先身熱。掣縱驚啼。叫喚而後發癇。脉浮者。爲陽癇。病在六腑。外在肌肉。猶易治也。○病先身冷。不驚掣。不

啼叫而病發時脉沉者爲陰癇病在五臟內在骨髓難治也
陳無擇云夫癲癇病皆由驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸
經厥而乃成或在母胎中受驚或幼小感風寒暑濕或飲食
不節逆於臟氣而成蓋忤氣得之外驚恐得之內飲食屬不
內外三因不同忤氣則一

愚謂此一家之說雖若切當然風寒外感自有表證飲食內
傷是有裏證俱未必亂神若此而癲癇爲病則忽爾昏厥此
其病則專在心經以及肝胆二臟又非風寒飲食所能煩病
若此者且風癇之義本以木邪所屬爲言亦非外感之謂卽