

欬嗽 痰飲 喘汗 不寐 健忘怔忡

瘧狂 癰瘻 痺麻 木厥 疝

頭暈 眩暈 目耳 胃胸 心腹 腰脇 痛

大小便 淋濁 瘡 腳氣

經帶胎產

吳門花洲顧靖遠松園著

男 元宰叙揆手錄
費 縣左國楫濟臣校字

症方發明 五

咳嗽 痰飲 喘 汗 不寐 健忘怔忡驚悸
顛狂 癰 痿 痺 麻木 厥 疝

咳嗽 肺 痿 肺癰附

此段論經言形寒飲冷傷肺致嗽特其一端其六氣皆能乘肺致嗽

此論五臟六腑皆令人咳然其實無不關於肺

咳嗽必由於肺。故帝有令人咳之問。而岐伯則曰。五臟六腑皆令人咳。非獨肺也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從胃脈上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則為肺咳。此舉形寒飲冷。傷肺致咳之一端耳。形寒者。外感風寒也。飲冷者。內傷寒冷也。然六氣不獨風寒乘肺致咳。其火暑濕燥皆能乘肺。皆足致咳。各有的症可憑。又曰。五臟各以其時受病。非其時。各傳以與之。乘秋則肺先受之。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘季夏則脾先受之。乘冬則腎先受之。言四臟各以其時。先受邪為病。次便及乎肺而為咳。故曰五臟六腑皆令人咳。然其實無有不關於肺。況外必先中於皮毛。而內應於肺也。即內傷之咳。亦無有不關於肺。故以內經於五臟六腑

此論治咳
之因不一
大抵因風
寒勞損二
者居多宜
審因施治

分別咳狀之下。又申之曰。此皆聚於胃。關於肺。故使人多涕唾而面浮腫氣逆也。聚於胃者。胃為臟腑之根本也。關於肺者。肺為臟腑之華蓋也。嘗考無擇有三因。丹溪有六咳。名雖多種。總不出於外感內傷。而治咳之法。亦當知重肺胃二經。然於外感內傷之中。又惟風寒勞損二者。居其八九。景岳云。風寒者。責在陽實。治宜辛溫散邪。則肺清而咳愈。最忌寒涼收斂。如經所謂肺欲辛者是也。勞損者。責在陰虛。治宜甘以壯水。潤以養金。則肺寧而咳愈。最忌辛香燥熱。如經所謂心走氣。氣病無多食辛者是也。至若因火暑因濕因燥。各從本門以施治。其因痰飲者。滌其飲。因氣逆者。降其氣。因食積者。消之。因積熱者。清之。金虛則崇土。鬱甚則舒肝。隨其所見之症而理之。金匱論咳有肺痿肺癰肺脹之辨。所當詳究。趙氏云。水冷金寒而咳。當用八味丸。仲淳雖論氣虛陽虛喘咳者絕少。然此等治咳之法。亦宜留心。以盡病變之無窮。則治咳之能事畢矣。

疎邪利金湯

見傷風

如外感風寒。內傷飲冷。咳嗽者。

寒冷入胃。從胃脈上至於肺。則肺寒。外內合邪。故咳。

可加半夏。

此治風寒咳嗽之劑。果係形寒飲冷致咳。可加薑夏。否則肺熱壅陽。

清金膏

加減清寧膏

噙化丸

瓊玉膏

俱見虛勞

皆治陰虛咳嗽

鳳髓湯

牛髓

一觔

白蜜

半觔

濾去渣

同煎沸

以絹

杏

仁

兩

去皮

火

四

山藥

研

細

兩

胡

桃

仁

去

皮

四

研

如

泥

同入瓶內

油紙封口

隔湯煮一日

早晚白湯化服三四匙

一方用牛酥

同煎

法

同上

煎法

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

白蜜杏仁

名蜜酥煎

同上

煎法

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

八仙玉液

自製

治陰虛咳嗽

痰血最妙

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

藕汁

性寒帶滋

熱止血

二杯

梨汁

降火消痰

定喘止咳

痰漿

消痰

盧根汁

清胃止嘔

各一杯

茅根

涼金定喘

水煎

取濃汁一杯

再

同漿汁乳

頓滾

人乳

補陰

童便

引火下行

生雞子白

三枚

和勻

頻頻服之

余嘗

用米仁山藥

脾保

麥冬

液

再加貝母末

真柿霜

消痰

和勻

頻頻飲之

即垂絕者

尚可延生

此七方皆甘潤之劑

勞損之咳

擇而用之

一方但用枇杷葉去毛

蜜炙煎膏

白蜜

錫糖收之

亦有效驗

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

瀉白散

見火

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

瀉白散

見火

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

瀉白散

見火

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

瀉白散

見火

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

瀉白散

見火

同上

治肺脹實
清金

此治肺熱咳嗽之劑。虛火加甘寒。實火加苦寒。按金匱云。咳而上氣。其人喘。目如脫狀。此為肺脹。仲淳言肺脹乃係肺熱極所致。當清金降氣。本方宜加黃芩石羔知母花粉之屬。

順氣開痰飲

見中風

此治氣逆咳嗽之劑。

二陳湯

見中風

此治痰飲咳嗽之劑。虛者宜用四君子湯。

保和丸

見泄瀉

此治食積咳嗽之劑。加減用之。

百部膏

一味嗽膏蜜收

此治蟲啗肺咳之劑。必胸中饑時則痛。唇上白點如粟者。用之方效。

肺痿

金匱云。其人咳。口中有濁唾涎沫。脈數虛者。此為肺痿。或從汗出。或從嘔吐。或

咳嗽肺痿

潤燥清熱降氣消痰之劑煎膏時時噙化緩以圖之方可挽回於萬一若大驅涎沫欲求速效反速斃也

金匱甘草湯 治肺痿咳嗽唾涎沫不止

肺熱而痿清肅失令則上輸之精氣不能收攝進化故吐濁沫

甘草

一味水煎頻頻飲之熱自漸化但最難處半月後方得效

如二冬百合梨汁貝母蘇子枇杷葉皆可用

此治肺痿獨取陽明之義徐忠可云余妄病肺痿初時痰沫成碗服一味甘草湯半月始痰少而得愈

肺癰

肺癰症肺

初起急宜瀉肺

金匱云若口中辟辟燥咳則胸中隱隱痛脈實數者此為肺癰始萌可救膿成則死又云咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭此為肺癰久之吐膿如米粥者死嘉言云凡見逆咳上氣即宜防癰痿之症肺受火熱薰蒸即血為之凝血凝即痰為之裏遂成小癰若能初起即識當血結而膿未成之時急瀉其肺方為恰當迨至血化為膿瀉之無益肺葉朽壞傾囊吐出而死間有癰

小。氣壯胃強善食。其膿不從口出。或順趨肛門。或旁穿脇肋。仍可得生。然亦不過十中二三耳。

金匱葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得卧。

甜葶藶

瀉其肺實。下其敗濁。不致腐潰吐膿。二三錢。

大棗

固脾胃之元。數枚。

或合甘桔湯。亦治肺癰之劑。

如連翹

能散血氣衰。

牛旁

能散諸癰腫毒。

金銀花

解毒聖藥。

陳年芥酒

肺癰神丹。

貝母

散結消腫。

花粉清熱

消腫皆可採用。

此治肺癰喫緊之方也。隨症加減治之。

咳嗽之脈浮濡易治。

兼見細軟。病將退也。沈浮而緊者死。

與病相反。病必深矣。

久嗽肺弱者生。實大數者死。上氣喘嗽面腫息肩。浮大者死。

一人經年久嗽藥不絕口。而病反增劇。自謂必成虛勞。士材曰。脈不數不虛。惟寸口浮大而滑。是風痰未解。多服酸收。故久而彌甚。用二陳湯加麻黃前胡。

杏仁蘇子桔梗五劑知。十劑效。

一人三年久嗽。諸藥不效。士材診之曰。饑時胸中痛否。曰。大痛。視其上唇白點。

為粟者十餘處。此蟲啗其肺。用百部一味煎膏。加烏梅攪榔與服。下寸白蟲。

嗽脈生死

從散效案

久嗽因蟲
啗肺用百

血少津枯
復傷秋燥
肺癰將成
先用葶藶
湯通肺氣
之壅後用
活法治之
得效案

一婦患肺家火實。熱甚咳嗽久而不愈。身如火炎。肌瘦將成勞。用紫苑湯

紫苑桑皮

杏仁款冬花枇杷葉木通等分。大黃減半。蜜丸。櫻桃大。夜間嚥化三五丸。服之而愈。

一婦平日持齋。腸胃素苦。天癸絕後。經猶不止。似有崩漏之意。嘉言治已痊可。時至秋燥。人多病咳。而血虛津枯之體。受傷獨猛。胸脇緊脹。上氣喘急。臥寐不寧。咳動則大痛。痰中帶血。而腥。食不易入。聲不易出。寒熱交作。申酉二時。燥金用事。諸苦倍增。其脈時大時小。時弦緊。時牢伏。服清肺藥。如以勺水沃焦。無裨緩急。嘉言告以肺癰將成。高年難任。用葶藶大棗瀉肺湯。先通其肺氣之壅。即覺氣稍平。食少入。痰少易出。身少可側。大有生機。嘉言曰。未也。吾見來時太急。不得已而取快於一時。然暫開者易至復閉。復閉則前方不可再用。今乘其暫開。多方以圖。必在兩月後。交冬至節。方是愈期。蓋身中之燥。與時令之燥。膠結不解。必俟燥金退氣而肺乃得寧。此兩月間。屢危屢安。大率皆用活法。幹旋緣。肺病不能用補。而脾虛又不能生肺。肺燥喜於用潤。而脾滯又艱於運食。今日脾虛之極。食飲不思。則於清肺藥中。少加參朮以補。

示用清肺
補脾法之
巧

胎朽腹中
肺當生癰
用瀉白散
加苓桔開
上壅通下
閉治效案

脾。明日肺燥之極。熱盛咳頻。則於清肺藥中。少加阿膠以潤燥。扶至立冬之
午刻。病者忽云。內中大覺清爽。可得生矣。奇哉。天時之燥去。而肺金之燥。遂
下傳於大腸。五六日不大便。畧一潤腸即解。正以客邪易去耳。至小雪節。康
健加餐。倍於平日。蓋胃中空虛既久。勢必加食。復其水穀容受之常。方為全愈也。
一婦孕五月。偶下血。以人參阿膠。勉固其胎。又一月。身腫。復血逆上奔。結聚於
會厭胸膈間。食飲纔入。觸之痛處。轉下艱難。稍急則連粒嘔出。皆謂胎氣上
逼。脾虛作腫。成膈。用人參之補。五味之收為治。至白露節。孕期已八月。病勢
危篤。呼吸將絕。嘉言診視。其尺脈微瀋。難推。獨肺部洪大無倫。喘聲如曳鋸。
手臂青紫腫亮。如毆傷色。謂曰。胃脈洪大。合於會厭之結塞。知其肺當生癰。
尺脈微瀋。合於肉色之青腫。知其胎已久壞。宜瀉白散之善藥。加苓桔之苦。
以開其上之壅。通其下之閉。服一大劑。腹即弩痛。如欲產狀。此肺氣開而下
行。久閉惡穢得出也。再進一劑。身腫稍退。上氣稍平。下白汚如膿者數斗。裏
朽胎而出。旬餘尚去白汚。並無點血相雜。可知胎朽腹中。已近百日。陰胎之
血。和胎具化為膿也。病者當時胸膈即開。連進建中。神思漸清。然治法之難。

肺為主。旬餘乃瘳。

痰飲

此辨痰與飲之因

此論陰虛痰火治法

此論脾濕生痰治法

此論風寒已熱痰咳治法

痰飲雖為一症。而因則有二。稠濁者為痰。痰因於火。有熱無寒。宜分在肺在脾。稀清者為飲。飲因於濕。有熱無寒。此屬在脾。然脾土寄旺四時。三時主熱。一時主寒。故飲症亦究寒濕釀成者少。濕熱釀成者多。按仲淳云。痰之生也。其由非一。其治不同。如有陰虛火動。上炎燦肺。煎熬津液。凝結為痰。是為陰虛痰火。痰在乎肺。而本乎腎。宜壯水清金。降氣消痰為治。若由脾濕不能運化。積滯生痰。或因酒醪厚味生痰。濃厚膠固。甚至流於經絡。及皮裏膜外。或結為大塊。或不思議飲食。或徹夜不眠。或身重腹脹。不得行走。或卒然眩仆。不知人事。或發為癲癇。或叫呼異常。或昔肥今瘦。或泄瀉不止。及成癰瘰種種怪症。皆痰之所為。故昔人云。怪病多屬痰。暴病多屬火。良有以夫。此症在脾胃。無關肺腎。宜燥脾行氣。散結軟堅為治。若有風寒閉熱在肺。而痰嗽喘逆者。亦屬在肺。宜豁痰降氣。除肺熱藥中。加辛溫之劑。以散風寒。故利潤利燥利散。各有攸當。非可混施也。

此論飲症
治法

此論痰分
屬五臟

此論飲症
有四亦分
屬五臟

世以痰飲混稱。而不辨稠粘之為痰。清水之為飲。混同施治。豈中病情要知飲之色狀不同。或青或黃。或綠或黑。或酸或苦。或伏於腸胃。或攻於胸脇。則為心痛。為胃脘痛。為脇肋刺痛。或流於經絡四肢。則關節不利。或憎寒發熱自汗。或胸膈滿悶喘逆。或不思食。或不得眠。皆其候也。此症多因酒後過飲茶湯。與腸胃濕熱之氣凝而為飲。或因懷抱抑鬱。或因脾胃虛弱飲食之濕。不得消散。亦能成飲。總之必由脾胃有濕所致。宜健脾燥濕。消飲行水。降氣散鬱為治。效方書論痰有在肺經者。名為燥痰。其痰澁而難出。在脾經者。名為濕痰。其痰滑而易出。在心經者。名為熱痰。其痰堅而成塊。在肝經者。名為風痰。其痰青而多泡。在腎經者。名為寒痰。其痰有黑點而多稀之別。金匱論飲症有四。水走腸間。漚漚有聲者。曰痰飲。水流脇下。咳唾卧痛者。曰懸飲。水流行於四肢。汗不出而身重者。曰溢飲。咳逆倚息。氣短不得卧。其形如腫者。曰支飲。亦分在肺在脾。在心在肝在腎。此卷痰飲病變之無窮。有志深造者。所宜詳究焉。

疏邪利金湯

見傷風

清金散 清寧膏 噎化丸 虛勞 救命丹 風

此四方陰虛痰火者。擇而用之。以肺為燥金。喜涼潤而惡溫燥故也。如膠固者。加霞天膏。

順氣開痰飲。見中風 治氣逆火升。痰滯喉間。如有核上。

原方。順氣開痰 加麥冬。知母。黃柏。清火 白芍。五味。飲火下降

此順氣開痰降火之劑。

琥珀丸 治痰症如神。

真琥珀 硃砂。鎮心 人參。補氣 茯神 蓮肉。各二錢 山藥。一兩 甘草。補心 天竺黃。益脾

入心除熱痰 陳膽星。入肝去風痰 可加牛黃。清心涼肺除熱 蜜丸重三錢。硃砂為衣。小

兒每丸重一錢。

此鎮心安神。除熱化痰之劑。為幼科之聖藥。凡遇慢驚。所投輒應。兼治小兒一切虛症。

瓜萸橘紅丸 治胃中有痰欲吐。

瓜蒌仁 橘紅各四兩 竹瀝姜汁泛為丸。食後服。

此順氣開痰止嘔之劑。

加味瓜蒌半夏湯 痰嗽氣逆頻吐。胸膈如有冷物上塞。飲熱湯稍下者。方可

用者。

瓜蒌霜

蛤粉拌炒二錢

半夏

薑汁炒一錢五分。一潤一燥。原方只二味。下藥仲淳加入。

蘇子

橘紅

茯苓

皆清痰降

熱之品。各三錢。

白豆蔻

五分

吳茱萸

有溫中下氣之能。三五七分湯泡用。

加竹瀝

一小杯

薑汁

開痰止嘔五匙

此消痰降逆溫中下氣之劑。因熱者大忌之。

二陳湯

見中風

治濕痰及一切飲症之要藥。

此燥濕理氣化痰之劑。虛者加人參白朮補氣健脾。以運化其痰。名六君子

湯。先哲云。脾為生痰之原。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。若吐涎沫。不甚稠

粘。此脾虛不能約束津液故也。六君子加益智仁治之。益智辛熱。能攝涎唾。

非虛寒勿用。每見勞膈等症。多有吐白涎沫者。此係熱極所致。凡臨症最宜

細審。治始無悞。

當知有脾
胃熱而涎
唾多者非
益智所宜

示金匱治
飲諸方宜
參

厚朴

木香

降氣散鬱
各五錢

因酒濕者加黃連

一兩

因寒濕者加茅朮

二兩

因抑鬱者加紫蘇

四兩

薑汁稀米糊為丸如綠豆大淡薑湯下每三四五錢日

三服

此健脾燥濕消飲行水降氣散鬱之劑凡遇飲症投之輒效仲景用桂枝茯苓

苓白朮甘草湯四味通陽化氣滲水健脾勝濕消飲用八味腎氣丸補益真

陽使腎氣不虛水不上泛為痰用葶藶大棗湯以洩肺氣之閉使氣行而飲

自不聚載在金匱痰飲門其方非一所宜參究

神朮丸

治濕痰

肥人多患之

及一切飲症如神

茅朮

一斤黑芝朮一斤同水研漿拌之九蒸九曬

棗肉為丸秋月燥令可用天冬錢許煎湯送下

此治濕消飲之神劑並治濕痺及脾濕腫脹極效

茯苓丸

治痰停中脘脾氣壅滯不得下行上攻兩臂抽牽作痛手不能舉脾

四服故也服者立效

半夏

二兩茯苓

一只

殼風化硝

引消痰利氣之品同潤下歸大腸二錢五分

薑汁煮麵糊為丸桐

子大每服三五十丸淡姜湯下。

此導痰潤下之緩劑。

礞石滾痰丸

治一切積聚痰結百種怪症。

病而至於變異百出。症不可憑。脈不可據。莫測端倪者。大多屬痰。

青礞石

消積滯。墜痰涎之要藥。

火硝等分。煨金色。湯氏治小兒用一錢。宜有君藥反少之理。原方分兩疑誤。

製大黃

切積滯。

停痰留飲之神藥。

黃芩

芩之治痰。微以降其火也。各八兩。

真沉香

沉之治痰。惜以降其氣。一兩。木香亦可。

水泛為丸。白

湯下一二三錢。

此驅痰除熱泄結之聖劑。若因於脾濕。不能運化。積滯生痰。或因酒醪厚味。生痰濃厚膠固。咯唾難出者。此藥但取痰積。次第而下。並不大瀉。應如鼓桴。如陰虛痰火禁用。虛人亦禁。

痰得瀉脈者難治。

一人面赤作渴。痰盛頭暈。立齋曰。此腎虛水泛為痰。用六味而愈。

一閨女患痰症。累月不食。起居如常。每發厥逆。不省人事。良久而甦。諸藥不效。余曰。中焦有痰。胃氣亦賴以養。方能不食不餓。以琥珀丸服之而愈。廣筆記。

腎水虛泛為痰治案
痰狂不食不餓氣厥治案

礞石為君

伏痰以藥
用攻下效
藥

示分量宜
照此服丸
屬藥當少
用不應漸
減

寒熱不食
作飲症治
藥

飲症嘔不
思食加參

以此藥人參圓肉湯下數丸遂愈

一人患臂抽痛。手不能舉。或左右時復轉移。此由伏痰在內。中脘停滯。四肢屬脾。脾滯而氣不下。故上行攻臂作痛。以茯苓丸治之。得愈。方書云。累有人為痰所苦。夜間兩臂如人抽牽。兩手戰掉。不能舉動。服者遂愈。痰藥多。惟此立效。一人遍體如蟲蟄。口舌糜爛。朝起必見二鬼執盤殮以獻。士材診其脈。乍大乍小。疑其為鬼祟。細察兩關弦滑而大。遂作痰飲治。投滾痰丸三錢。雖微有所下。而患病如故。更以小胃丹與之。即十棗湯之芫花大戟甘遂各五錢加製大黃一兩五錢黃柏三兩白朮煎膏丸如藷子大臨卧白湯送下四五分取。隔上濕熱痰積欲利空心下一錢。復下痰積十餘碗。遍體之痛減半。至明早。鬼亦不見矣。更以人參三錢。白朮二錢。煎湯服小胃丹二錢。大瀉十餘行。約有二十碗。病若失矣。乃以六君子為丸。服四觔而痊。

一人患寒濕。不食久之。勢甚危。以治寒熱劑投之。不應。仲淳作飲症治之。立愈。蓋飲症原有作寒熱之條。故治飲。病自去矣。

一婦因作家勞。患飲症。每發嘔吐不已。腸如欲出。所吐俱清水盈盆。日夜不

止。不思飲食。醫以健脾消痰。行氣開鬱藥投之。愈劇。仲淳即以前方加人參三錢。一劑吐止。再劑霍然。隨食粥。脾氣漸復。至後每病作。檢方服之。即平。

喘

喘病無不本於肺。故經曰。諸痿喘嘔。皆屬於上。蓋肺主氣。氣逆則喘。肺為最高。故曰屬上也。巢氏嚴氏本內經。諸逆冲上。皆屬於火之說。止言實熱。獨王海藏辯華陀肺氣盛為喘。活人書。氣有餘則喘。二語云。氣盛則當氣衰。有餘當作不足。若肺氣果盛。果有餘。則清肅之令下行。豈復為喘。所謂盛與有餘者。乃肺中之火。而非肺之真氣也。斯言誠超出前人。然余觀昔賢之論。悉有所本。不可偏廢。審果實熱有餘所致者。則從巢氏之說治之。審果火燥肺金。真氣不足所致者。則從海藏之治。故因風寒者解其邪。因暑濕者滌其煩。火實者清之。氣鬱者疏之。痰壅者開之。食滯者消之。氣虛而火入於肺者。補氣為主。陰虛而火乘金者。壯水為急。腎虛氣不歸原。納氣為根。腎虛水邪泛濫。逐水下流。如上諸竅。皆其大綱。然治喘之因甚多。須一隅三反。方不愧為明通之醫矣。

此論喘病
當屬何因
處治