

名醫類案

第十

S28

1782

1p10



名醫類案卷第十

新都篁南江瓘集

後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇王橫
仁和沈烺敦會
歙鮑廷博以文

背癰疽瘡

宋戶部尚書沈誥爲人仁厚一兵卒患背疽乞假親爲合藥

治之時早蝗當致齋園邱猶丁寧料理藥內用酒恐市酤

不中用自取酒入藥服之即愈其法用瓜蒌子一枚乳香

沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九盞臨服嚼沒藥一塊飲

此酒極妙葦航紀談



羅謙甫治一人年踰六旬。冬至後數日。疽發背。五七日。腫勢約七寸許。痛甚。瘍醫曰。膿已成。可開發矣。病者恐不日。醫曰不開。恐生變症。遂以燔針開之。膿泄。痛減。以開遲之故。迨二日。變症果生。覺重如負石。熱如熛火。痛楚倍常。六脈沉數。按之有力。此膏粱積熱之變也。邪氣酷熱。固宜以寒藥治之。時月嚴寒。復有用寒遠寒之戒。乃思內經云。有假者反之。雖違其時。從證可也。琇按脈實症實必用涼解舍時從症夫復何疑急作清涼飲子。加川黃連一兩五錢。作一服服之。利下兩行。痛減七分。翌日復進前藥。其證悉除。月餘平復。

京師人司仲父患背瘡。若負火炭。晝夜呼叫。司仲泣於途。遇

道人曰子何憂之深也子當求不耕之地遇野人糞爲蟲
鳥所殘卽以杖去其糞取其下土篩而敷之乃如其言用
之立愈父曰豈以冰著吾背耶吾五臟俱寒矣

房州虞候張進本北方人因送郡守還逢道人飲之酒得其
治癰疽方文錄曹子病背瘡醫不能療聞進有此方索之
進元無手訣但以成藥敷之旬日而愈一兒五歲鬢邊生
瘡繼又發于腦後症候可憂亦以敷進凡所用皆一種不
過三夕二患皆平其方但擇阿膠透徹者一兩水半升煎
令消然後入虢丹一兩慢火再熬數數攪勻俟三五沸乃
取出攤令極冷貯磁餅中用時以毛掃布瘡四面而露其

口如瘡未成則遍塗腫處良久自消切勿犯手更無他法
一切惡瘡皆可敷不特癰疽也

類說

虞奕侍郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不癢又
不滋蔓疑之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥
一年來唯覺時時手脚心熱疾作不早治又誤服補藥何
可久也蓋發背無補法諺云背無好瘡但發于中正者爲

真發背

泊宅編

揚州名醫楊吉老其術甚著有一士人狀若有疾厭厭不聊
莫能名其爲何苦往謁之楊曰君熱症已極氣血消鑠且
盡自此三年當以疽死不可爲也士人不樂而退聞茅山



觀中一道士醫術通神、但不肯以技自名、未必爲人致力、士人心計交切、乃衣童僕之衣、詣山拜之、願執役左右、道士喜、留寘弟子中、誨以誦經、日夕祇事、頗旨如意、經兩月、餘覺其與常隸別、呼叩所從來、始再拜謝過、以實告之、道士笑曰、世豈有醫不得的病、當爲子脈之、又笑曰、汝便可下山、吾亦無藥與汝、但日日買好梨啖一顆、如生梨已盡、則取乾者、泡湯飲之、仍食其滓、此疾自當平、士人歸、謹如其戒、經一歲、復往揚州、楊醫見之、驚其顏貌腴澤、脈息和平、謂之曰、君必遇異人、不然何以至此、士人以告、楊立具衣冠、焚香望茅山設拜、蓋自咎其術之未至也。

類編

程明佑治槐克胡嫗年六十疽發背大如孟頭如蜂窠嘔逆
咽不下瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄程曰病必分陰陽虛
實胃傷於寒令人嘔逆溫補則榮衛充而氣血周貫則毒
隨膿出而肌肉漸生依方投藥四五劑咽遂下嘔止已癰
潰體漸平

陳斗崑治王主政福建人臂患一癰痛甚發咳逆十餘日水
穀不下脈伏如絕醫皆不治陳視之曰此寒涼過甚中氣
下陷以四珍加薑桂三進而病如失癰亦漸愈

丹溪治一人背癰徑尺穴深而黑急作參芪歸朮膏飲之三
日畧以艾芎湯洗之氣息奄奄然可飲食每日作多肉餽

飽大碗與之。盡藥膏五觔。餽飽三十碗。瘡漸合。肉與餽飽。補氣之有益者也。

一老人背發疽。徑尺。已與五香十宣散數十貼。嘔逆不睡。素有淋病。急以參芪歸朮膏。以牛膝湯入竹瀝飲之。淋止。思食。盡藥四觔。膿自湧出而愈。

一人發背癰疽。得內托十宣多矣。見膿。嘔逆發熱。發熱決非如熾火

又用嘉禾散加丁香。時天熱。脈洪數有力。此潰瘍尤所忌。然形氣實。只與參膏竹瀝飲之。盡藥十五六觔。竹百餘竿而安。後不戒口味。夏月醉坐水池中。經年餘。左脇旁生軟塊。二年後成疽。自見脈症。嘔逆如前。仍服參膏等而安。若

與十宣其能然乎

一婦因得子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脈散大而痛急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚易于收拔
一人形實色黑背生紅腫近髀骨下痛甚脈浮數而洪緊正冬月與麻黃桂枝湯加酒栝生附子瓜蒌子甘草人參羌活青皮黃芪半夏生薑六貼而消

一男子年五十餘形實色黑背生紅腫及胛骨下痛甚脈浮數而洪緊食亦嘔

琇按與前案同只多此三字

正冬月與麻黃桂枝湯

加酒黃栝生附子瓜蒌子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此亦內托之法也

周評事觀患背癰瘡口久不合召瘍醫徐廷禮療治恒以托裏十宣二散與服不效徐謂周曰更請盛用美來共事料理則可否則吾技窮矣既而盛至按脈用藥率與徐類但多加人參五錢附子稍行功耳服後兩足俱煖自下而上謂其子曰今之藥何神哉頓覺神爽快服之旬日而宿口平復俞子容曰國初吾吳中老醫多見其用附子往往治病如庖丁解牛近醫者多棄而不用何耶近日則以附子爲常服之品所謂過猶不及

一人患發背腸胃可窺百藥不差一醫教以楸葉膏敷其外又用雲母膏作小丸子服盡四兩不累日雲母透出膚外

與楸葉膏相黏著瘡口遂平功亦奇矣其方立秋日太陽

未升之時採楸葉熬爲膏敷瘡瘍一切惡瘡腫毒立愈

此方簡而神瘍醫罕用何也

謂之楸葉膏云

葛常之韻語陽秋

南史曰薛伯宗善徙癰公孫太患發背伯宗爲氣封之徙置

齋前柳樹上明日而癰消樹邊倏起一癰如拳大稍稍長

二十餘日癰大膿潰爛出黃赤汁升餘樹爲之痿損

此祝由法

一方士嘗貨藥淮西值兵變竄入深山遇老姥年二百許歲

自謂金亡避兵來此元完顏氏之醫姥也傳以背瘡方用

鮮射干一味每用三錢研細溫酒調服乾者爲末每服一

小錢許酒下在上卽微吐在下卽微利功效如神仍用膏

藥收口又傳壽星散治惡瘡痛莫當者。糝之不痛。不痛者知痛。大天南星一味爲末。養生主論

古朴翁治一人患背癰。有醫者已爲驅熱拔毒。痛腫已減。告技窮。翁診之曰。此易易耳。無用藥也。遂煎醋一碗。入鹽少許。以紙數重漬。場腫上。再以銅斗盛火熨之。不數易而病如失。

汪石山治一老人患背癰。請汪診視。脈洪緩而濡。癰腫如碗。皮肉不變。按之不甚痛。微發寒熱。乃語之曰。若在膊。胛經絡交錯。皮薄骨高之處。則難矣。今腫去胛骨下掌許。乃太陽經分。尚可治。遂用黃芪五錢。當歸羌活甘草節各一錢。

先令以被蓋煖藥熟熱服令微汗寢熟腫消一暈五服遂安

薛已治進士張德宏背疽微腫微赤飲食少思用托裏藥成而潰再用大補湯之類肉生而歛忽寒熱作嘔患處復腫其脈浮大按之若無形氣殊倦薛謂之曰此胃氣虛憊

非瘡毒也彼云侵晨登廁觸穢始作仍用補藥而歛

立齋名重

一時所治俱膏粱富貴之家故每以溫補取效若執此法以治背疽是癡人說夢

一人大背患疽年餘瘡口甚小色黯陷下形氣怯弱脈浮緩而瀉此氣血虛寒也用十全大補加附子少許數劑而元氣漸復卻去附子又三十餘劑全愈

一婦年五十餘。四月初背當心生疽如栗大。三日漸大根盤五寸許。不腫痛。不寒熱。薛診其脈微而沉。曰脈病而形不病者。忌也。實則痛虛則癢。陰症陽症之所由分也。不癢不治。潰而不斂亦不治。乃與大補陽氣之劑。色白而黯。瘡勢如故。至十二日。薛復診其脈沉。瘡勢不起。神疲食減小便淋瀝。乃與大補氣血加薑桂二劑。瘡亦不起。十五日因怒嘔瀉並作。復大補藥一劑。瘡仍不起。薛畱藥二劑而去。病者昏憤不服。或勸之省悟。依方連進七劑。十六日瘡起而潰。色紅而淡。膿亦如之。十九日薛至。喜曰瘡已踰險處。但元氣消鑠。尙可憂。連與大補二十餘劑。五月十一日病者

因勞自汗。口乾舌強。太陽髮際腦頂俱脹。復延薛至診之。
曰。此氣血俱虛。肝膽火上炎。用補中益氣湯。加山梔芍藥。
頓愈。但內熱少睡。手足發熱。不時霍熱。用逍遙散。加
熱退。復用歸脾湯。瘡乃愈。計瘡發及歛四十二日。

內翰楊皋湖。孟夏患背疽。服剋伐之劑。兼旬。漫腫堅硬。重如

負石。隔蒜灸五十餘壯。背遂輕快。

先服剋伐。又灸則毒盡矣。且無壯熱。故溫補而

愈。乃以六君子。加砂仁二劑。涎沫湧出。飲食愈少。此脾虛

陽氣脫陷。又用溫補。反嘔不食。仍用藥作大劑。加附子薑

桂。又不應。遂以參芪各一觔。歸朮陳皮各半觔。附子一兩。

煎膏服。三日而盡流涎頓止。腐肉頓潰。飲食頓進。再用薑

桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈。此等治法非明眼不能

儒者顧大有年幾六旬。仲冬背疽初起入房。患處黑死五寸。

許黯暈尺餘。漫腫堅硬。背如負石。發熱作渴。小便頻數。兩

耳重聽。揚手露體。神思昏憤。脈沉而細。右手為甚。以脈為主症屬

假陽便秘二十七日。計進飲食百餘碗。腹內如常。衆欲通


之。薛曰。所喜者此耳。急用大劑。六君子加薑附肉桂三劑。

瘡始熈痛。自後空心用前藥。午後以六味丸料加參芪歸

朮五劑。復用活命飲二劑。看他先溫補後解毒針出黑血甚多。瘀膿

少許。背即輕軟。仍用前藥。便亦通利。薛他往。四日神思復

昏。瘡仍黑陷。飲食不進。皆以為殞。薛以參芪歸朮各一兩。



炮附子五錢。薑桂各三錢服之。卽索飲食并鴨子二枚。自後日進前藥二劑。肉腐膿潰而愈。

少叅史南湖之內。夏患疽不起。發脈大而無力。發熱作渴。自

汗盜汗。用參芪大補之劑。益加手足逆冷。大便不實。喘促

時嘔。脈微細。按之如無。惟太衝不絕。太衝乃肝俞在足大指本節後二寸半或

一寸半

初大而無力用補而反見虛症并見細脈所謂

真虛若投涼解之劑。脈必愈大。搏指此中玄機。識者有幾

仍以參芪歸朮茯苓陳皮計。觔許加附子五錢煎膏作二

服。諸症頓退。脈息頓復。翌日瘡起而潰。前藥仍用四劑後

日用托裏藥調理兩月而愈。

操江都憲伍松月背瘡愈後大熱。誤爲實火。用苦寒藥一鍾。