

亥 23

37412

馮氏錦囊秘錄

卷十一



卷十一 兒科吐血

方脉吐血咳血咯血唾血合參

方脉癆瘵合參却病十法

病有十不治

十二段錦

清心說

玄北

方脈鼻衄齒衄舌衄肌衄合參
附呼吸靜功要訣任督二脈通和
衛生諸說

馮氏錦囊秘錄

卷十一 亨



馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十一

男 乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初全校

男 乾亨禮齋

吐血 兒科

經曰營者水穀之精也調和於五臟灑陳於六腑乃能入於脉也生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎濡潤宣通靡不由此夫吐血者是營衛氣逆也經曰坎則有血者陽脉傷也夫心者血之主肺者氣之主氣主嘘之血主濡之榮養百骸既濯筋脉榮衛相濟升降上下自



北京中医药大学图书馆版权所有

然順適不失常道。若有一所信。疾斯作矣。或外干六淫。內因七情。氣乃留而不行。血乃壅而不濡。內外抑鬱。不能流注。是以熱極湧泄。寧無妄動之虞。鬱久奔升。難禦猛銳。血猶水也。決諸東則東流。決諸西則西流。氣之使血。其勢相然者耶。是以氣逆而血亦逆矣。且氣有餘便是火。火乘於血。得熱妄行。流溢無拘。上奔而爲吐血也。有因飲食太飽。胃寒不能消化。故吐所食之物。氣血相衝。因傷脾胃。亦令吐血者有之。然陽明主乎多血。若爲熱鬱內逼。在令妄行。故小兒吐血。屬胃者十有七八。更有尚在襁褓而吐血者。多由重幃煖閣。火氣薰迫。或過啖辛辣。流於乳絡。兒



飲之後停滯不散積溫成熱熱極上崩是以或吐或衄下爲尿血者有矣若久嗽氣逆面目浮腫而嗽吐血者肺虛損也隨症治之

辰膠散 治小兒吐下血

阿膠

炒

蛤粉

各一錢

辰砂

飛水

爲末用藕汁白蜜調服

又方

消瘀止血用藕節

曬乾

爲末人參白蜜同煎湯調服

犀角地黄湯

治血虛火盛吐衄妄行溺血使血

犀角

鎊末

生地黃

白芍藥

牡丹皮

各一錢五分

水煎去渣入犀角末服之如忿怒致血者加山梔柴胡

凡稟陰氣至純者莫過於犀角得濁陰下降者莫過於地黃白芍酸收丹皮清降涼血止血之要品瀉南實北

馬氏醫案卷之二

力脈吐血衄血咯血唾血合參



之神方也。因於怒者，氣必逆上，故加山梔以屈曲下行。肝喜疎泄，故加柴胡以達其本鬱。木用四味，獨名犀角。地黃者，所重在二味。白芍、丹皮，不過佐助耳。

當歸補血湯

治氣血虛熱，面赤煩渴，脉大而虛。

黃耆 雨 災 一

當歸 二 酒炒 錢

水煎空心服之

東垣曰：經云「脉虛血虛」，又云「血虛發熱」。此多得於饑飽勞役，症類白虎，惟脉不長，實為辨耳。誤服白虎湯，必死。黃芪乃甘溫補氣之劑，此本血虛，何反用之？為君耶？經曰：治病必求於本。又曰：陽生陰長，故血虛補氣治其本也。佐以當歸之潤，正與陰血相投，二物並行，則上下表裏無處不到，故各補血湯。

雙荷散

治卒暴吐血

藕節 七

荷葉頂 七

同蜜搗細，水煎去滓，溫服。

天冬湯

治思慮傷心，吐血衄血。



人參

五錢

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心麥門冬

黃耆

藕節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

生地

黃芩

甘草

炙五錢

每服四錢姜水煎溫服

方脉吐血咳血咯血唾血合泰

經曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰大怒則形氣

絕而血菀於上又曰脾移熱於肝則為驚衄胞移熱於腸

脫則癃而尿血又曰結陰者便血一升再結二升三結三

升大血者生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄

於腎泄既一身自得之而能視耳得之而能聽手得之而

能握掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得

焉氏部實必象雜症卷十一



之而能氣出入升降濡潤宣通靡不由此也飲食日滋故
能陽生陰長取汁變化而赤爲血注之於脉充則眞少則
濟生旺則諸經恃此長養衰竭則百脉由此空虛而盛則
形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢故血者難成
而易虧失調則變生於反掌火載則上行挾溼則下行爲
病種種妄行於上則吐衄衰涸於中則虛勞枯槁於外則
消瘦忘反於下則便紅移熱膀胱則溺血滲透腸間爲腸
風陰虛陽搏則爲崩中溼蒸熱痰則爲滯下熱極腐化則
爲臟血火盛似水血多紫黑熱勝於陰則爲瘡瘍溼滯於
血則爲癰疹凝滯於皮膚則爲冷痺畜之在上則爲忘畜

之在下。則爲狂。跌撲損傷。則瘀血內聚。血行清道。出於鼻。血行濁道。出於口。咳血。衄血。出於肺。嘔血。出於肝。吐血。出於胃。痰涎血。出於脾。咯血。出於心。唾血。出於腎。耳血。出於二。鼻血。曰衄。膚血。曰血汗。口鼻俱出。曰腦衄。九竅俱出。曰大衄。便血清者。屬營虛。有熱濁者。屬熱。與溼。色鮮者。屬火。黑者。火極。血與泄物並下者。屬有積。或絡脉傷也。尿血。因房勞過度。陰虛火動。營血妄行。血色黑黯。面色枯白。尺脉沉遲者。此下元虛冷。所謂陽虛陰必走也。有嘔吐紫瘀血者。原病式云。此非冷凝。由熱甚銷煉。以爲稠濁。熱甚則水化制之。故赤兼黑而紫也。有汗血者。由大喜傷心。喜則氣

散血隨氣行也。下血先見血，後見便，爲近血。自大腸來，先有便，後見血，此遠血。自肺胃來，腸胃本無血，由氣虛腸熱，故血滲入而下出也。東垣曰：除傷寒家衄血外，凡雜病見血多貴其熱。血上行爲逆，其治難；下行爲順，其治易。故血上行，或唾或嘔，或吐忽變而下行，爲惡痢者，吉兆也。并下曰：口鼻出血，皆是陽盛陰衰，有升無降，血隨氣上，越出小竅。法當補陰抑陽，氣降則血自歸經矣。有陽氣本虛，復爲寒涼傷之，以致肅殺之氣，色脉並見沉而不浮，尺小於寸，右弱於左，色大而血黯者，用生脉散加肉桂一錢，熟附子一錢，甘草五分，繼以理中八味相須間服，喘嗽痰血皆爲。

平復故三因方云理中湯能止傷胃吐血以其方最理
腕分別陰陽安足氣血凡患人果身受寒氣口食冷物
入血分血得冷而凝不歸經絡而妄行者其血必黑其
色必白而大其脉必微遲其身必清涼不用姜桂而用
血之劑始矣

凡用藥者要認血來本原不可妄治以致變亂夫治血當
明血出何經不可槩曰吐血衄血多是火載血上錯經妄
行越出上竅過用寒涼夫火者無形之氣也非水可比安
能稱載蓋血隨氣行氣利則血循經氣逆則血亂氣有餘
即是火也實由氣逆而血妄行兼於火化因此爲甚經曰



怒則氣逆。甚則嘔血暴瘡。內逆肝肺相搏。血溢鼻口。是也。
又東垣曰。血妄行。上出於鼻口者。皆氣逆也。況血得寒。
凝得熱。則行。見黑則止。迹此觀之。治血若不兼之。調氣而
統以寒涼。是施則血不歸經。且爲寒所凝滯。雖暫止而復
來也。且脾統諸血。寒涼傷脾。脾虛尤不能約束諸血。其變
症可勝言哉。然調氣更莫如導火。火歸而氣自順矣。

吐血者。營氣溢入濁道。留聚膈間。滿則吐血。名曰內衄。然
先哲皆以爲熱。其因於寒者。理亦有之。何則。寒邪屬陰。榮
血亦屬陰。風傷衛。寒傷榮。各從其類。人果身受寒邪。口食
寒物。邪入血分。鬱遏內熱。無從發洩。血乃沸騰。在上則從

口而出。在下則從便而出。若此者實病機之所有焉。得爲盡無也。但其血色之黑。與吐血因熱極而反兼水化者。似茲則宜於脉證間求之。脉微遲而身清涼者。寒也。而身煩熱者。熱也。寒則溫之。熱則清之。治法大不同矣。若吐血發渴者。名爲血渴。宜四物湯或十全大補湯。凡內傷暴吐血不止。或勞力過度。其血妄行。出如湧泉。口鼻皆流。須臾不救。急用人參一兩。或二兩爲細末。入飛羅麩一錢。新汲水調如稀糊。不拘時服。或用獨參湯亦可。古方純用補氣不入血藥何也。蓋陽統乎陰。血隨乎氣。有形之血不能速生。無形之氣所當急固。令無形生出。有形



也。若有真陰失守，虛陽泛上，亦大吐血。又須入味地黃湯，固其真陰，以引火歸源。正不宜用人參及火，既引之而愈矣。人參又所不禁，陰陽不可不辨，而先後之分，神而明之，存乎其人。況人參雖謂補陽，乃陽中之陰藥。若與白朮黃耆同用，峻補後天元氣之陽，與附子鹿茸同用，大補先天元氣之陽，與當歸地黃同用，則補陽中之陰，率領羣陰，藥上至陽中之陰分，所佐一異，功用便殊矣。

凡失血之後，必大發熱，名曰血虛發熱。古方立當歸補血湯，用黃耆一兩，當歸二錢，名曰補血，而以黃耆爲君，陽旺能生陰血也。如丹溪於產後發熱，用參耆歸芎黑姜以佐。

之或問曰乾姜辛熱何以用之蓋姜味辛能引血藥入氣
分而生新血況炒黑則止而不走若不明此理見其大
六脉洪大而誤用發散之劑或以其象白虎湯症而誤用
白虎立見危殆慎之哉

曹氏云吐血須煎乾姜甘草作湯與服或四物理中湯亦

可如此無不愈者若服生地黃藕汁竹茹去生便遠仁齊

直指云血遇熱則宣流故止血多用涼藥然有氣虛挾寒

陰陽不相爲守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走耳

外必有虛冷之狀法當溫中中溫則血自歸經絡可用理

中湯加南木香或乾姜甘草湯其效甚著又有飲食傷胃

馬氏帛書必錄雜症卷十一
方脉吐血咳血咯血唾血合衆



或胃虛不能傳化其氣逆上亦能吐衄木香理中湯甘草
乾姜湯最宜出血諸證每以胃藥收功切不可投以苦寒
之劑故曰實火之血順氣爲先虛火之血養正爲先氣壯
自能攝血也

褚氏遺書云喉有竅咳血殺人腸有竅便血殺人便血猶
可治咳血不易醫喉不容物毫髮必咳血既滲入愈滲愈
咳愈咳愈滲飲溲溺者百不一死言之太過服寒涼者百不一
的確生之論血雖陰類運之者其陽和平翫陽和二字褚氏深
達陰陽之妙者矣時珍曰小便性溫不寒飲之入胃隨脾
之氣上歸於肺下通水道而入膀胱乃其舊路故能治肺

病引火下行其味鹹而走血故治血病但當乘熱卽飲則真氣尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性而已若煉成石則真元之氣漸失不及童便遠矣

海藏云胸中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下兩端

絡部分陰陽不通用苦熱以定於中使辛熱以行於外

以甘溫降以辛潤化嚴肅爲春溫變凜冽爲和氣汗而愈

也然餘毒土宜猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁

而思涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脉退而

小弦細而遲激而爲衄血吐血者有之心肺受邪也下而

爲便血溺血者有之腎肝受邪也三焦出血色紫不鮮此

馬氏醫案必錄雜症卷十一

方脈吐血咳血咯血唾血衄血

八



中國醫藥大學圖書館版權所有