

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許奉 教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也(仲景)○傷寒汗不解脈浮者蒼朮白虎湯主之吐下後口乾

腹中熱滿少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少與之常令不足勿極意也言飲之少尺與

五升若腹滿小便不利若喘者不可與之若小渴咽乾者少少啗潤之令胃氣和則愈(仲景)○

渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散主之(仲景)○厥陰病渴欲飲水者少少與之愈(治人)○

在表則不渴熱入裏則渴耗奪津液而然也然有渴必有煩者腎主水熱深則水竭而渴肝木挾心火

以生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴渴欲水為欲愈者傳經已盡也脈浮而渴屬大

陽宜白虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯(入門)○凡渴欲飲水常

令不足為善經云若還不飲非其治強飲須教別病主(醫鑒)○渴欲飲水而不能飲者丹田有

熱胸中有寒也(仲景)○陰盛陽陽之證口燥渴而漱水不嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥(入門)

五苓散 治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右為末每

飲水不飲而反吐出水逆證或飲水雖多而小便不利

者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散之藥也(入門)

竹葉石膏湯 治傷寒解後餘熱及陽明證口汗煩渴並差後虛煩證石膏四錢人參二錢麥門冬一錢

半半夏一錢甘草七分右剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服(入門)

傷寒潮熱 潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者即為發熱

非潮熱屬陽明若於日哺時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語(明理)○潮

熱者如潮水之有信一日一發謂之潮必日哺而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用下之或潮於

寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之(入門)○吐下後不大便

潮熱若劇則不識人脩衣摸床微喘

直視脈弦者生脈瀉者死(仲景)

傷寒發狂 發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上

屋不食不臥非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫語宜

辰砂五苓散(入門)如狂者但睡中忽欲起行錯言妄語非若發狂莫能制也(入門)○陽毒發狂宜

陽毒升麻湯陽毒梔子湯(方見上)○發狂宜用妙香丸(方見大熱)三白飲活龍散破棺散水清法

東醫寶鑑雜病篇 卷三

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 許 奉 教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也(仲景)○傷寒汗不解脈浮者蒼朮白虎湯主之吐下後口乾

腹中熱尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少與之常令不足勿極意也言能飲一斗只與

五升若腹滿小便不利若喘者不可與之若小渴咽乾者少少與之令胃氣和則愈(仲景)○

渴欲飲水水入即吐者名曰水逆五苓散主之(仲景)○厥陰病渴欲飲水者少少與之愈(若人)○

在表則不渴熱入裏則渴耗奪津液而然也然有渴必有煩者腎主水熱深則水竭而渴肝木挾心火

以生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴渴欲飲水為欲愈者傳經已盡也脈浮而渴屬太

陽宜白虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯(八門)○凡渴欲飲水常

令不足為善經云若還不敢非其治強欲須教別病主(醫鑒)○渴欲飲水而不能飲者丹田有

熱胸中有寒也(仲景)○陰盛陽陽之證口燥渴而漱水不飲蓄血之證亦漱水不欲嚥(八門)

五苓散治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右為末每

飲水不飲而反吐出水逆證或飲水雖多而小便不利

者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散的藥也(八門)

竹葉石膏湯治傷寒解後餘熱及陽明證口汗煩渴並差後虛煩暈證石膏四錢人參二錢麥門冬一錢

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者即為發熱

非潮熱屬陽明若於日哺時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語(明理)○潮

熱者如潮水之有信一日一發謂之潮必日哺而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用下之或潮於

寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之(八門)○吐下後不大便

潮熱若劇則不識人脩衣摸床微喘

直視脈弦者生脈湯者死(仲景)

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上

屋不食不臥非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫語宜

辰砂五苓散(八門)如狂者但睡中忽欲起行錯言妄語非若發狂莫能制也(八門)○陽毒發狂宜

陽毒升麻湯陽毒梔子湯(方見上)○發狂宜用妙香丸(方見大熱)三白飲活龍散破棺散水清法

卷三

東醫寶鑑雜病篇

火劫法○喜忘如狂蓄血證也(活人)○凡發狂見陽證陽脈者順見陰脈舌卷囊縮者死(入門)

三白飲 治傷寒熱證極狂走雞子清一個白蜜一大匙芒硝三錢右合併一處凉水調下(醫鑒)

活龍散 治傷寒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水(入門)

破棺散 治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人屎乾者燒成性水漬飲汁一二匙即甦或細研如麝新汲水調下三錢亦可俗名野人乾水(本草)

水漬法 見上陽毒下

大劫法 治發狂炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣沖入鼻內頃臾自定又將凉水噴面亦可(入門)

傷寒謔語鄭聲 實則謔語虛則鄭聲謔語者謂言語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重煩煩也只將一句舊言重疊頻言之也(明理)○陽明病胃實則謔語(仲景)○大小便利手足冷脈微者

必鄭聲宜用白通散大便秘小便赤手足溫脈洪數者必謔語宜用調胃承氣湯(活人)○謔語有實有虛實則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者腸胃自利也難治(入門)○傷寒大熱呻吟

錯語不得眠黃連解毒湯主之(活人)○晝日明了夜則謔語如見鬼乃婦人熱入血室證也(活人)○傷寒發熱謔語宜柴胡連翹湯(醫鑒)

黃連解毒湯 治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔子各一錢二分半右剉作一貼水煎服(活人)

柴胡連翹湯 治傷寒發熱謔語呻吟睡卧不得柴胡黃芩枳殼芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁連翹黃連黃柏甘草各八分右剉作一貼入薑三片水煎服(醫鑒)

傷寒結胸 傷寒若脈浮緊下之必結胸(海藏)○病發於陽而反下之熱入因作結胸(仲景)○傷寒表未解醫反下之病內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此為結胸宜大陷胸湯(仲景)○若按心

下硬痛手不可近燥渴謔語大便實脈沈實有力為大結胸急以陷胸湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者死(醫鑒)○小結胸者正在心下按之則痛脈沈滑宜小陷胸湯(醫鑒)○寒實結胸無熱證者

宜三物白湯小陷胸湯(醫鑒)○熱實結胸及寒實結胸活人書不拘寒熱但用陷胸湯不差用枳實理中丸應手而愈(綱目)○但結胸無大熱者此為水結在胸脇但頭汗出名曰水結胸小半夏湯加茯苓主之(方見胸部)○熱實結胸宜大陷胸湯(綱目)○結胸宜用灸法(變法)

未經下而胸滿非結胸也只以小柴胡合小陷胸加枳殼桔梗一服如神(醫鑒)

大陷胸湯 治大結胸大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一點先煎大黃至六分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服(仲景)



小陷胸湯 治小結胸半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌大者四分之一右剉作一貼水二盞煎取一盞至一盞乃入半夏黃連煎至半去滓溫服未利再服利下黃涎便安(仲景)○一方加枳實黃芩桔梗尤效(入門)○瓜蒌惟剉其殼勿剉其子剉其子者非也(丹心)

三物白散 治寒實結胸桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬煎如脂一錢右為末和勻白湯和服半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一碗利不止進冷粥一碗(入門)

大陷胸丸 治熱實結胸大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂一字右為末蜜丸彈子大每一丸水一盞煎半分溫服未利再服(丹心)

灸法 詳見胸部

熨法 詳見胸部

傷寒藏結 病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈細小沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治(仲景)○病人胸中

素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死(仲景)○歌曰飲食如常時下利而舌上白胎(活人)○病人時連臍痛引陰筋者藏結原來死不醫○米如結胸飲食如故時時下利而舌上白胎(活人)○病人素有痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生薑以和表裏關元以回陽解陰結危哉(入門)藏結與結胸相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胸者為結胸與陰相結結在臍者為藏結准其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飲食如常時時下利舌上白胎臍脇臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胸中有寒所以難治(入門)

傷寒痞氣 病發於陰而反下之因作痞(仲景)○心下痞硬按之濡其脈關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胸與痞關脈須沈若關脈浮者宜此湯(仲景)○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之(仲景)○下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃熱結下利者生薑瀉心湯主之(仲景)

氣通用枳殼桔梗湯 景○太陽病外證未除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解桂枝人參湯主之(仲景)○痞

氣通用枳殼桔梗湯

半夏瀉心湯 半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑一錢黃連五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(仲景)

三黃瀉心湯 大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分溫再服(丹心)



**附子瀉心湯** 大黃黃芩黃連各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯盞一入三味漬之良久去滓納附子汁分溫再服(仲景)

**甘草瀉心湯** 甘草二錢黃芩乾薑各一錢半半夏製人參各一錢黃連三分右剉作一貼入大棗三枚水煎服(仲景)

**生薑瀉心湯** 生薑半夏各一錢黃芩五分右剉作一貼入棗三枚水煎服(仲景)

**桂枝人參湯** 桂枝另剉甘草炙各一錢八分白朮人參乾薑各一錢半右剉作一貼水二盞煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二(仲景)

**傷寒筋肉瞤** 動氣在左而發汗則筋肉瞤(明理)○傷寒筋身瞤發汗太過所致也古人以真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸俱為之瞤動宜以四物湯去地黃加入參半夏茯苓甘草為劑以五

靈脂為佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主生血生血乃所以收汗也(直指)

**傷寒除中證** 厥而下利反能食者曰除中不治(得效)厥而利反能食曰除中其死也可立待也(附)○之胃氣既除豈可再復(入門)○厥利當不能食今反能食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也(入門)

**傷寒血證** 太陽病六七日表證因在脈微而沈反不納胸其人若狂者以熱在下焦小腹當滿小便不利者下血乃愈抵當湯主之(仲景)○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯(仲景)○傷寒小腹痛應小便不利今反利者有血也當下之宜抵當丸(仲景)○太陽病不解熱結勝於其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯(仲景)○衄忌發汗者為無

則犀角地黃湯主之(方見血門)○海藏○少陰病強發汗血出九數是名上厥下竭不治(仲景)○

**抵當湯** 治一切瘀血結胸諸證散水等證水蛭炒蠅虫炒去足翅桃仁留尖各十枚大黃蒸三錢右剉作一貼水煎服(入門)

**抵當丸** 治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭蠅虫各七個桃仁六個大黃三錢右為末蜜和分作二丸水一盞一丸至七分頓服未效再服(丹心)

**桃仁承氣湯** 治血結勝於小腹急結便黑譫語散水宜此攻之

大黃三錢桂心芒硝各二錢甘草一錢桃仁留尖十枚右剉為一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度(丹心)

**傷寒自利** 傷寒陰證身痛脈沈大便自利或嘔或咳宜玄武湯(方見上)○傷寒陽證身熱脈數煩渴引飲大便自利宜柴苓湯(丹心)益元散亦佳(方見醫門)○太陰證自利宜理中湯(丹心)

傷寒自利 傷寒陰證身痛脈沈大便自利或嘔或咳宜玄武湯(方見上)○傷寒陽證身熱脈數煩渴引飲大便自利宜柴苓湯(丹心)益元散亦佳(方見醫門)○太陰證自利宜理中湯(丹心)



柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮指苓赤茯苓各七分半夏七分黃芩人參甘草各六分桂心三分右剉作一貼入薑三片水煎溫服(丹心)

傷寒胸腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也胸腹痛少陰也小腹痛厥陰也(仲景)○心胸硬痛手不可近滿結胸若未經下者非結胸也乃邪氣填塞胸中只以小柴胡加枳桔治之如未效小柴胡合枳桔胸加枳桔一服如神(醫鑒)○若心下脹滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔(醫鑒)○若小腹痛硬痛小便利則為蓄血之證桃仁承氣湯下之若小便不利則為尿澀之證五苓散利之若小腹硬痛大便澀大便秘者有尿硬也(醫鑒)

傷寒吐衄

傷寒有吐衄者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則衄不安其所而上膈大山之兆也吐衄者手足冷胃虛空也(回春)

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨月而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死狂言者是失志失志者死(內經)○發汗後脈躁疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不可分別此死證也(入門)

壞證

傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫再感濕熱變為溫毒重感疫氣變為溫疫又太陽病經汗吐下溫針不解及過經不解皆為壞證或醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危急者奪命散諸藥不效者龍甲散(入門)

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱煩赤寒熱如瘧皆由汗下不盡毒汗即愈(入門)○一本去桂心代桂枝(入門)

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安卧不思飲食大便不決小便黃赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右剉作一貼煎服(入門)

奪命散

治傷寒壞證昏沈垂死或陰陽二經不明過經不解及或因誤服藥困重垂死一切危急之證好人參一兩剉作一服水二升於銀石器內煎至一升去滓以新水沈冷一服而盡汗自鼻梁上出煎服(入門)

涓涓如水是藥之效也  
一名獨參湯（丹心）

鼈甲飲

治一錢枳殼八分烏梅二錢犀角前胡黃芩生地黃各一錢

百合證

大病後未平復失調理餘證在陽醫反汗之以致百脈一宗悉致其病無復經絡故謂之百合傷寒其證當默然欲下之餘證在陰醫反汗之以致百脈一宗悉致其病無復

如寒無寒如熱無熱口苦小便赤時頭不痛漸然者四十日愈若尿時快然但頭眩者二十日愈

時輒頭痛者六十日乃愈治尿時頭不痛漸然者四十日愈若尿時快然但頭眩者二十日愈

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證鼈甲醋煮二錢柴胡百合知母生地黃陳皮人參黃芩甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服（入門）

百合知母湯

治汗後百合證百合七枝知母一兩右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞別煎知母取一盞去滓二汁和勻同煎取一盞半分溫再服（丹）

服（丹）

百合滑石代赭湯

治下後百合證百合七枝滑石三兩代赭石一兩右煎如上法服（仲景）

百合雞子湯

治吐後百合病百合七枝雞子黃一個右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二升煎取一盞去滓納雞子黃攪勻溫服（仲景）

百合地黃湯

治不經汗吐下百合證百合七枝生地黃汁一升右先煎百合如上法乃納地黃汁煎取一升五合分二服大便出如漆黑（仲景）

百合滑石散

治百合病變寒熱者百合一兩滑石二兩右為末每二錢白湯下日三服（仲景）

百合洗方

治百合病一月不差變成渴者百合一升水一斗漬一宿洗一身已宜淡食（仲景）

過經不解

傷寒六日傳經一遍七日當解而再傳至於十三日以上不愈謂之過經不解由汗下失宜邪氣留連故也或從輕再汗再下宜參胡芍藥湯小柴胡湯調之（方並見上）○治人○餘熱不退皆

宜小柴胡湯（治人）

勞復食復證

勞者動也動非一種有內外血氣之異若見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是已（海藏）○復者其病如初也傷寒新差津液未復血氣尚虛或梳洗言動太早或思為太過則

勞復虛者益氣養神湯○凡復證先病七日出汗而解今復舉亦必一日而解先病十四日出汗而解今復舉亦必十四日而解雖三四次復舉亦必三四次戰汗而解但勞復證久不愈忍成勞瘵○

門冬湯 治勞復氣欲絕能起死回生 麥門冬二錢 甘草炙三錢 粳米一合 右水二盞先煎粳米令熟去米入二藥及棗二枚 青竹葉十五片 煎至一盞 溫服 加人參尤妙 海藏

五錢右剉水煎服微汗之差（入門）

武犀豉湯 治同上 梔子七個 雄鼠屎七枚 枳殼一枚 炒 右剉水一盞 半入葱白二寸 香豉三十粒 同煎至一盞 分二服 勿令病人知 (活人)

**鼓枳黃湯**  
治食復發熱枳殼柴胡各一錢香豉五錢大黃三錢右  
劉水煎服腹脹加厚朴傷肉如山者傷飯粥如神麴(入門)

**味葱白散**  
治勞傷食復。蔥白連根三莖，乾葛、麥門冬、熟地黃各三錢，香豉半合。生薑切一合，右對以甘爛水四升煎之，三分去二分，去滓分二服。(活人)

氣養神湯 治勞傷宜養氣血人參當歸白芍藥酒炒麥門冬知母梔子炒各一錢白茯苓前胡各七分陳皮五分清麻生甘草各三分右剉作一貼入棗二枚水煎服（回春）

伯曰視其虛實調其從逆可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則

不禁也嘗見病後善飲食而大小便不禁故知之(活人)○當與食復參看

易證  
易也其男子病新差婦人與之交得病名曰陽易婦人病新差男子與之交得病名曰陰易若二

能寧眠中生大四肢拘急小腹絞痛手足拳即死亦有不能死者病若小腹痛裏急熱上衝胸頭重不能

方死（活人）○陰陽易宜燒視散赤衣散獼鼠糞湯青竹茹湯竹皮湯乾薑湯蠶縮痛氣欲絕宜竹皮  
通遙散（入門）○女勞復者不因易而自病復也治亦相同但多憎寒發熱虛弱者人參通遙散（入

門)○陰陽易病見舌吐出者必死(寶鑒)○顧子獻病傷寒新差華陀診脈曰尚虛未復陽氣不足

數寸而死活人○有婦人病傷寒賊來不能走其賊六七人姦之皆得婦人病而死此陰陽易也

(外)

燒視散

治陰陽易取近陰處視襦一片方圓四五寸燒成性溫水調服一錢日三小便即利陰頭微腫即愈男女互用之(入門)○又方人手足指爪甲二十片燒灰末末飲調下其效亦同(入門)

赤衣散

治陰陽易最效取室女月經布近陰處燒存性末末飲調下(入門)

猥鼠黃湯

治男子陰易病非白再服猥鼠黃十四個右以水二升煮取半升去滓溫服微汗未汗再服猥鼠黃也(海藏)

青竹茹湯

治勞復及陰陽易病瓜萸根五錢青竹茹二錢右剉作一貼水煎服(入門)○一名瓜竹湯治法服法同

竹皮湯

治陰陽易及勞復病剉取青竹皮一升水三升煮取一升分二服○一名竹茹湯(綱目)

乾薑湯

治陰陽易病速當汗之過四日不可瘳乾薑三錢剉水煎服得汗出手足伸即愈(得效)○一方乾薑為末一兩溫湯調服覆衣取汗得解(古方)

竹皮道遙散

治勞復及易病青竹皮(即縮腹痛倍入)生地黃人參知母滑石黃連韭白柴胡犀角甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚煎滿服入燒視襦末一錢半調服微汗之末汗再服

(入門)

人參道遙散

治女勞復虛弱者人參當歸各二錢柴胡一兩半白朮白芍藥白茯苓各一錢右剉作一貼水煎服(入門)

熱入血室證

婦人傷寒與男子無異惟熱入血室及妊娠傷寒則不同也(雲岐)○婦人以血為主血室即衝脉血海也婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無

犯胃氣及上二焦必自愈活人書云小柴胡湯及生地黃主之犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也(仲景)婦人傷寒寒熱如瘧晝夜躁如見鬼狀此謂熱入血室不實滿者小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡湯合

滿者桃仁承氣湯主之(雲岐)○熱入血室其血結而不行小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡湯合四物湯主之牛黃膏亦主之(方見婦人)(入門)○婦人傷寒發熱經水適來經行盡則熱隨血散不

治自愈如熱除而脈遲身涼胸脇下滿按之痛者謂之血結胸當刺期門(穴名)隨其實而瀉之宜服桂枝紅花湯(入門)

血結胸

或問熱入血室何為而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來通斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何

以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既姙則中蓄之以養胎及已產則上壅之以為乳汁皆此血也今邪氣蓄血併歸肝經聚於膈中結於乳下故手觸之則痛非湯



刺可及故當刺  
期門也(本事)

### 桂枝紅花湯

治熱入血室及血結胸桂枝芍藥甘草各一錢紅花一錢  
右剉作一貼入薑四片棗二枚水煎服汗出而解(入門)

### 傷寒無脈為欲汗

傷寒兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏○若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手無脈或一手無脈者必是有正汗也如天之欲雨六合昏昧多用綿衣裹手足令溫燥也

服五味子湯時必有大汗而解矣(活人)○傷寒病六七日來別無利克證忽昏迷不省脈靜或無此欲作正汗如久旱將雨之兆喘促無脈者加味生脈散陰躁無脈者迴陽返本湯下利脈不至白通加猪膽汁湯(三方見上)脈結者炙甘草湯(方見服部)寒熱鬱閉者兩手俱無脈並是好汗相逼汗出自愈宜麻黃附子細辛湯(方見上)加人參五味子以汗出脈續出則生服藥而仍無汗脈不至者死(入門)

### 五味子湯

治傷寒喘促脈伏而厥五味子三錢人參麥門冬陳皮杏仁各一錢右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服(活人)○一名加味生脈散(入門)

### 差後昏沈

傷寒差後或十數日或二十日終不惺惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱往來煩赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞間所致

知母麻黃湯主之(方見上)○得發陶氏導赤各半湯極效(入門)○傷寒後無寒熱雜證但漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嘔不與則不思心下無痞腹中不滿大小便如常形貌如醉人此熱傳手少陰心經也心火熏肺所以昏沈名曰越經證宜陶氏導赤各半湯(入門)

### 陶氏導赤各半湯

治差後昏沈黃芩黃連梔子知母麥門冬茯神犀角人參滑石各一錢甘草五分右剉作一貼入薑一片棗二枚燈草一握煎入生茅汁三匙服(入門)一名瀉心導赤散(春)

春

### 餘熱不退


傷寒餘熱不退通宜用小柴胡湯調之尿赤澀者紫苓湯(二方見上)○吐汗下三法之後別無異證者涼膈散(方見大門)調之(宣明)○餘熱盛或發狂言辰砂益元散最妙(方見下)(入門)

○發熱之後熱不解服尚浮者白虎湯加蒼朮再解之(方見上)○傷寒後虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如神汗止身涼此通神之法也如此則汗下後熱不退不問有汗無汗俱宜白虎加蒼朮

人參解之最妙(河間)○傷寒後六經餘熱不退宜加減涼膈散(方見大門)○正傳

### 狐惑證

虫證也如狐聽水猶豫不決之意其候四肢沈重默默欲眠目不得開惡聞食臭舌白齒晦面目赤赤乍白乍黑變異無常此因大病後腸胃空虛三虫求食食人五藏蝕其候則為惑其聲啞蝕其肛



則為狐其咽乾殺人甚急當看上唇有瘡虫蝕其臍下唇有瘡虫蝕其肛蝕上部者三黃瀉心湯主之  
(方見上) 蝕下部者苦參湯熏洗之 蝕肛門者生艾汁調雄黃末燒烟熏之通用黃連犀角湯治感桃  
仁湯雄黃銳  
散(入門)

**黃連犀角湯** 治感黃連犀角烏梅木香桃仁各一錢右剉作一貼水煎服空心(回春)

**治感桃仁湯** 治同上桃仁槐子碎艾葉各二錢右剉作一貼入薑三棗二水煎空心服(得效)

**雄黃銳散** 治下部感瘡雄黃青箱子苦參黃芩各二錢桃仁一錢右為末以生艾汁和如棗核大綿裹細下部(得效)

**傷寒差後雜證** 傷寒差後虛煩不得眠宜酸棗仁湯烏梅湯(活人) 〇差後不食宜參苓白朮散安神散  
(二方並見內傷) 〇差後有熱狂言宜辰砂五苓散辰砂益元散 〇差後虛煩欲嘔宜竹葉  
石膏湯(方見上)

石膏湯(方見上) 〇(入門)

**酸棗仁湯** 治傷寒後虛煩不得眠酸棗仁二錢麥門冬知母各一錢半茯苓一錢烏梅肉二個右剉作一貼入薑三片豉五十粒同煎服(活人)

**烏梅湯** 治傷寒後虛煩不得眠心內懊惱柴胡二錢梔子炮黃芩甘草炙各一錢烏梅肉二個右剉作一貼入薑三片豉五十粒同煎服(活人)

**辰砂五苓散** 傷寒發熱狂言譫語及差後熱不退虛煩等證澤瀉赤茯苓猪苓白朮各二錢半肉桂辰砂各五分右細末每二錢沸湯點服(丹心)

**辰砂益元散** 治傷寒熱不退狂言譫語滑石六兩甘草辰砂各一兩右細末二錢井水調下日二三(入門)

**傷寒治法** 張仲景傷寒論載三百九十七法一百一十有三方惜乎其書一變於王叔和之撰次再變於成無己之詮註傳之愈久而愈失其真也(正傳) 〇帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日

衰已矣其未滿三日者可汗而愈失其真也(內經) 〇陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死此陰陽指表裏而論之也(難經) 〇桂枝下咽陽盛則驚承氣入胃陰盛

乃亡(仲景) 〇傷寒五法者汗吐下溫解也各有不同汗有八門汗發微汗解肌之異下有急下少與微和滲利之殊溫有兼補者吐有宣瀉探引者和解則一而已(入門) 汗吐下三法毫釐不可差誤在表

宜汗在裏宜下在胸宜吐在表半裏宜和和表裏俱見隨證滲泄(得效) 傷寒之病太陽屬膀胱非利之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則能解矣太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮

則不能燥少陰屬腎注畏寒非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤(得效) 〇太



陽陽明大承氣少陽陽明小承氣止陽陽明調胃承氣是三陽已入於藏者泄之也太陰桂枝湯少陰  
麻黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三陽未入於藏者汗之也(東垣)○傷寒三日可汗○日復  
可下此大畧言之耳凡病人有虛實邪氣有淺深豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而發汗  
者俱宜發汗日數雖少有裏證而脈沈者即宜下之此活法也(活人)○九味羌活湯治濕熱三時之表  
春夏秋三六神通解散理晚發之邪香蘇散十神湯參蘇飲發表調中葛根湯解肌湯小柴胡湯  
表大柴胡三承氣攻熱邪傳裏理中湯四逆湯散寒中陰經柴苓湯益元散治泄瀉濕熱(丹)○  
寒宜用湯以湯滌邪熱  
不宜用丸藥也(本事)

### 傷寒欲解

傷食三日脈浮數而微身溫和者此謂欲解也脈浮而解者濇然汗出也脈浮而解者必能食也  
脈不浮而解必大汗出也(仲景)○六七日脈至皆大煩而口渴不能言躁擾者必欲解也

景)○必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也(脈經)○若脈平和其人大煩目重眩  
內際黃者皆欲解也(脈經)○脈浮數而微身溫和者欲解也(脈經)○凡病反能飲水者為欲愈  
脈經)○問曰脈病欲知愈未愈何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱  
不調者此脈為陰陽和平雖劇當愈(脈經)問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脈浮而人緊按  
之反孔此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰也若浮而數按之不孔此人本不虛故但出  
汗不發戰也(脈經)○問曰有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自微此以曾經發汗若吐若下若  
亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也(脈經)○太陽病無汗而蛆者自愈(仲  
景)○問曰凡病何時得何時愈答曰日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者  
以陰得陽則解也(脈經)○太陽知可解者頭不痛項不强肢節不痛則知表易解也陽明經  
知可解者為無發熱惡熱則知裏易解也少陽知可解者寒熱交作失其早晚知可解也(藏海)

### 傷寒可吐證

傷寒三四日邪氣未傳裏瓜蒂散吐之○六七  
胸煩懊憹梔子湯吐之(方並見吐門)(仲景)

### 可汗不可汗證

傷寒寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼皆發其  
汗(仲景)○傷寒前三日法當汗出而愈(丹心)○傷寒榮氣宜麻黃湯

風傷衛宜桂枝湯(方見上)○內經曰體若燔炭汗出則愈○非身熱惡寒不可汗○非脈浮不可汗○脈微弱或  
主之(八門)○太陽證非頭痛項強不可發汗○非身熱惡寒不可汗○非脈浮不可汗○脈微弱或  
尺脈遲者不可汗○血虛不可汗○汗出則必額上陷脈急緊直視不能瞬不得眠○諸亡血不可汗○汗  
出則寒慄而振○風溫濕溫皆不可汗○虛煩不可汗○臍間左右上下有氣動不可汗○太陽病者  
咽乾鼻衄小便淋並不可汗○咽乾乾燥者不可汗○婦人經來不可汗○當汗不汗則  
生黃當利小便而不利則亦生黃不當汗而汗則為蓄血當汗而過多則為亡陽(活人)  
發汗法凡發汗欲令手足皆周至熱然一時間許益佳不可令如水淋漓耳若病不解當重發汗汗多  
則亡陽亡陽不得重發汗也(仲景)○凡發汗腹以上則如常覆之腹以下則厚衣覆之腹以上

雖淋瀝而腰以下至足微潤則病終不解(活人)○凡發汗服湯其方雖言日一二服若病劇不解當促其服可半日間盡一二服連服三劑乃解若汗不出者死病也(仲景)○凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之周遍為度未汗可作熱粥投之粥內加葱白甚妙(仲景)○凡服藥發汗中病即止不必盡劑恐汗太過作亡陽證也吐下亦如之(仲景)

**亡陽證**凡發汗過多漏不止名曰亡陽溫經益元湯主之有陽虛服藥而不得汗亦名亡陽陶氏遺散主之兼用蒸法(詳見汗部)○太陽證惡寒脈當浮而緊今反脈浮而遲遲為亡陽不能作汗其

身必痒桂麻各半湯主之(方見上○八門)

**腎氣不足難得汗**太陽病脈浮緊身疼痛宜以汗解之假令尺脈遲者不可發汗何以知之以榮血不足傷寒發汗多驚悸目眩身戰孫曰太陽經病得汗早因太陽經欲解復作汗腎氣不足發汗不來所以心博目眩身戰遂作真武湯三服微汗而解蓋附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若恒素大陽能乾涸血液爾仲景云尺脈遲者禁血不足不可以汗以此知腎氣法則難得汗也(孫兆)

**汗促天壽**凡傷寒發汗須顧其表裏虛實待其時日若不循次第則暫時得安衝損五藏以促天壽貴哉昔南朝范雲為陳武帝屬官適得傷寒恐不得預九錫之慶召徐文伯懇求促汗文伯曰便差甚易只恐二年不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣何待二年遂以火燒地鋪桃葉設席置雲於其上須臾大汗撲以溫粉翌日便愈雲喜甚文伯曰不足喜也後二年果卒(本事)

**溫經益元湯**治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身漂筋惕肉瞤熟地黃人參白朮黃芪蜜炒白芍藥當歸生乾地黃白茯苓陳皮甘草炙各一錢桂皮附子炮各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚

**糯米一撮水煎服(八門)**

**陶氏再造散**治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪桂枝附子炮細辛羌活防風川芎甘草炙各一錢右剉作一貼入環釐三片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎二三沸溫服(八門)

**可下不可下證**不惡寒反惡熱手掌心並腋下濺濺汗出乃胃中乾燥結聚潮熱大便鞭小便利如常腹滿而喘或譫語脈沉而滑者裏證也裏證內熱是也內證屬陽明宜下(活人)○大小調胃三承

氣必須脈浮頭痛惡風惡寒表證已罷而反發熱熱極譫語不大便方可用之若脈浮緊下之必結胸若脈緩下之必痞氣(海藏)○傷寒後三日法當下下之太早則必變他證輕者必危危者必死當用

平和之藥小柴胡湯涼膈天水益元散也一合而服之(宣明)○若裏熱微者當微下大柴胡合解毒湯下之熱勢未退又以大柴胡三承氣下之而除裏之熱(宣明)○凡轉下之藥與裏證參差選

用(丹心)○脈浮不可下○脈虛不可下○惡寒不可下○嘔吐不可下○不轉矢氣者不可下○小便清不可下(活人)○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非脈沉實不可下○非發狂不

便清不可下(活人)○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非脈沉實不可下○非發狂不

便清不可下(活人)○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非脈沉實不可下○非發狂不

便清不可下(活人)○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非脈沉實不可下○非發狂不

可下  
(雲岐)

急下兩證

少陰主腎繫舌本熱氣入藏留於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴急下之若用

標咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明證發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之(活人)

脈不鼓擊不可下

一少年傷寒目赤煩渴脈六七至醫欲用承氣湯下之東垣偶來診之大發曰幾時

日脈至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛陽於外非熱也取量附來吾以熱因寒用之法治之藥未就而病者小甲已青逆順脈八兩汗漸出而愈(東垣)

下後熱不退宜再下

下後熱不退宜三下之熱愈盛脈微氣虛力弱不加以下法則無可生之理右脈沉不

者到此殺人活人一彈指間耳(河間)○經云三下而熱不退者死後人有三四次加至十數行而生者此乃偶然誤中耳後學切不可以為法但用解毒湯合涼膈散調之庶不失人命(河間)○汗下後

熱不退不問有汗無汗宜白虎湯加人參蒼朮解之砂(河間)

陰耗陽竭證

裏熱內盛陽厥極甚皆因失下而成此證以致身冷脈微皆將死殊不知此證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極盛謂之竭但進涼膈解毒合以服之以養陰退陽脈氣漸生得

大汗而愈若未愈解毒合承氣下之次以解毒涼膈水合而為一洗滌臟府則自愈矣(河間)

可和不可和證

傷寒熱邪半在表半在裏宜小柴胡湯和之(活人)○口苦咽乾目眩耳聾胸脇滿或往來

撮前名曰大邪湯(入門)○病若半在表半在裏法當和解小柴胡合涼膈散(方見大門)主之(河間)○非往來寒熱不可和○非胸脇急痛不可和○非胸滿而嘔不可和(雲岐)

傷寒凶證

傷寒病唇吻反青四肢多汗肝絕也○形如烟熏搖頭喘視心絕也○環口黧黑柔汗發黃脾絕也○汗出錢潤喘而不休肺絕也○狂言直視便遺失腎絕也○汗出如油喘息不休水漿不

入形體不出命絕也(仲景)

傷寒不治證

陰陽俱虛熱不止者死○脈陰陽俱盛大汗出不解者死○少陰病六七日息高者死○少

手足溫者生脈不還者死○發熱下利至甚厥不止者死○汗下後復熱脈躁疾下利不止者死○下利厥逆無脈灸之脈不還身不溫反微喘者死○直視譫語或喘滿或下利者死○服麻黃湯二三

劑汗不出者死○熱病脈躁盛而不得汗者死○發汗不至者逆○汗出如珠不流者死○忽冒昧  
無脈服藥後汗解則生若無汗脈不至者死○七八日以上發大熱難治○傷寒脈乍數乍疎者不治  
○脈代者不治○口乾舌黑不治○口張目陷不治○尋衣摸床者逆○厥陰證唇青舌卷耳聾囊縮  
不治○陰陽易過六七日不治○大發濕家汗則成痼熱而症難治○發風濕中濕汗並逆○發風濕  
汗必謬語不  
治(仲景)

傷寒十勸李子建所撰不可不察

傷寒頭痛身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒六經內太陰病頭痛不痛身不熱少陰病反發熱而無頭痛厥陰病有頭痛而無發熱即是陽證不可妄投熱藥(局方)

傷寒當直攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中當隨氣攻之或醫者却行補益使毒氣留藏多致殺人(局方)

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥

傷寒腹痛多是熱毒仲景方痛甚者加大黃則意可見也惟身冷厥逆腹痛方是陰證當消息之(局方)

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥

厥陰外具餘身熱下利皆是陽證不可服熱藥(局方)

方)

傷寒胸脇痛及腹痛不可用艾灸

傷寒胸脇痛屬少陽腹脹痛屬太陰切不可使用艾灸多致殺人(局方)

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證

傷寒有陰厥有陽厥當仔細分辨不可例用熱藥(局方)

傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中丸之類不可輕服熱氣增重或至不救(局方)

傷寒病已在裏切不可用藥發汗

傷寒須看表裏若一例發汗則邪氣未除真氣先涸死者多矣(局方)

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

病人若渴當與水以消熱氣然不可過多常令不足為善(局方)

傷寒病初差不可過飽及飲酒食羊肉行房事

病方愈飲食過飽病即再來謂之食復勞動太早病即再來謂之勞復犯房室者必死(局方)

傷寒戒忌

傷寒病新差後但少吃糜粥常令稍飢不得飽食反此則復○差後百日內氣體未復犯房室者死○忌食羊雞狗肉肥魚多言不得勞心費力反此則復○差後百日內氣體未復犯房室者死○忌食羊雞狗肉肥魚



油骨汁及鹹藏鮮脯油餅  
鈣等物病則再發(局方)

中寒證

仲景論傷寒矣未及乎中寒先哲治胃大寒而昏中者用附子理中湯其議藥則得之然曰傷寒中  
未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒感受  
其病即發而暴一身受邪難分經絡無熱可發溫補已解此氣太虛也不急治則死矣(東垣)○中寒  
者寒邪直中三陰卒然昏不知人口噤四肢強直拘急疼痛若不急治死在朝夕先因無酒酒可飲附  
子理中湯中冷浸水中冷服之方見上○附子理中湯方用附子炮人參白朮乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服  
蓋灌服次用回陽救急湯(方見上)○附子理中湯方用附子炮人參白朮乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服  
子理中湯中冷浸水中冷服之方見上○附子理中湯方用附子炮人參白朮乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服  
羊羹與法(方見上)並灸灸臍中與氣海關元各三五十壯而脈不出手足不溫者死(入門)○中寒則口噤四肢強直卒然昏倒(得效)

附子理中湯

治中寒口噤身強直附子炮人參白朮乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服  
(三因)○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴各等分煎服亦名附子理中湯(回春)

朮附湯

治中寒白朮三錢甘草炙一錢半附子炮一錢右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合丸三九服之(得效)

迴陽湯

治中寒益智仁青皮各二錢川烏生附子生各一錢乾薑  
炮五分右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服(得效)

寒厥暴亡

一婦人病傷寒暴亡脈絕有一道人見之曰是寒厥爾不死也令人速掘地作坑以  
新炭燒之坑極暖施薦覆坑昇病人卧其上厚被覆之少頃大汗沾衣即甦(類聚)

葱熨法

治中寒身冷脈微而青黑蔥白連根切小麥麩各三升鹽二升右以水和勻  
分二色炒令極熱細色之互熨臍上冷則用水拌溼更炒熨之(醫鑑)

感寒及四時傷寒

寒溫不節將理失宜乍暖脫衣甚熱飲冷坐卧當風居處暴露衝冒霜雪凌晨朝起呼吸  
冷氣久暗暴暖急變陰寒久雨積寒致生陰濕如此之候皆為邪厲侵傷肌膚入於腠理  
使人肢體沉重肢節痠疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重涕淚出氣壅胸膈凝滯飲食不入凡此之證若  
不便行解利伏留經絡傳變無已(得效)○尋常感冒有表證宜羌活湯和湯防風湯和湯皆正香蘇  
散(方見上)寒毒入裏吐利者霍香正氣快食停痰人參解胃湯(二方見上)時令感冒宜升麻葛根  
湯○大抵感冒古人不致輕發汗者正由麻黃能開腠理用或不得其宜則導泄真氣因而致虛變生  
他證此藥乃平和之劑(人參養胃湯也)止能溫中解表而已不致妄擾也(局方)○雜病與傷寒相  
類者極多凡有感冒輕證不可便認為傷寒而妄治之其或可者蓋亦因其不敢放肆多用和解平和  
之藥散之爾(丹心)○凡感冒風寒通謂之四時傷寒宜沖和散正氣散參蘇飲  
(二方見上)次雪散交加散十味芳蘇散(方見瘟疫)對金飲子(方見內傷)

羌活湯和湯

治春夏秋感冒風寒發熱惡寒頭痛項強或有汗或無汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治太  
陽經表熱之神藥也(丹心)○此藥非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜

病亦有神也(方見上)  
○一名九味羌活湯

**防風沖和湯** 治春夏秋感冒風寒頭身熱自汗惡寒脈浮緩防風羌活各一錢半白朮川芎白芍藥  
生地黃黃芩各一錢細辛甘草各五分右剉入薑三蔥二煎服○一名加減神和湯

**沖和散** 治四時感冒風寒蒼朮四錢荆芥二錢  
甘草一錢右剉作一貼水煎服(得效)

**沃雪湯** 解利四時傷寒以此溫表和裏通順陰陽蒼朮三錢厚朴一錢半川芎  
當歸防風白芍藥陳皮葛根甘草各七分右剉作一貼水煎服(類聚)

**升麻葛根湯** 治溫病及四時感冒葛根二錢白芍藥升麻甘  
草各一錢右剉作一貼薑三蔥二煎服(局方)

**交加散** 五積散性溫散毒散性涼凡人遇些少感冒取兩  
藥對半合和煎服則邪氣自散矣(二方見上)

**外感挾內傷證** 外感無內傷用仲景法(丹心)○傷寒挾內傷者十居八九蓋邪之所湊其氣必虛用補  
中益氣湯出入加減氣虛甚者少加附子以行參芪之功(方見內傷)(丹心)○傷寒丹溪

用補中益氣湯海藏用九味羌活湯皆是和解之意不使真氣散失也(綱目)○丹溪海藏諸賢治傷  
寒皆以補養兼發散之法此乃風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人之旨也俗醫謂傷寒無補法不分虛

實一例汗下而致天橫實醫門之罪人也(綱目)○傷寒一證頭疼身熱惡寒微渴微汗出沈困身  
痛脚痠脈浮虛無力名曰勞力感寒不可誤作正傷寒大發汗宜加味益氣湯(回春)○外感挾內傷

宜陶氏補中益氣  
湯十味和解散

**陶氏補中益氣湯** 治內傷氣血外感風寒頭身熱惡寒自汗沈困無力人參生地黃黃芪當歸川芎藥  
胡陳皮羌活白朮防風各七分細辛甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚葱白

三莖水煎服如元氣不  
足加升麻三分(入門)

**十味和解散** 治外感內傷頭身熱白朮四錢桔梗二錢當歸陳皮枳殼防風白芍藥  
厚朴人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服(丹心)

**加味益氣湯** 治勞力感寒證羌活一錢半人參黃芪防風柴胡各一錢白朮陳皮當歸各七分甘草五  
分升麻黃柏酒炒各二分右剉作一貼入薑三片水煎服甚加酒炒黃芩三分(回春)

**外感內傷虛證宜補** 一婦年七十患傷寒發熱惡寒諸醫以藥發散旬日不效飲食漸少昏沈不省口不  
能言眼不能開咽喉有微氣有欲絕之候六脈虛微若無以人參濃煎湯徐徐灌之

連用頓與入歷十四年而卒夫人參迴元氣於無何有之鄉果有起死迴生  
之功醫說載一人傷寒成壞證只服人參湯鼻梁出汗而愈與此同(回春)

