

花柳易知

卷四

烏棗肉燒灰一兩 膽礬七分 輕粉二錢 用豬膽汁調搽

又方 搽楊梅頑瘡久不愈者

升過鉛粉一錢 真輕粉二錢 杏仁七箇 三仙丹一分 右將鉛粉輕粉三仙丹

共爲細末。後搗杏仁極爛。似糝樣。更將草藥仙草葉搗爛作餅子貼此藥於瘡上。六七日取下卽愈。先將苦薺菜煎水洗去皮。方用此藥搽於瘡上。

加味遺糧丸 治楊梅初起。筋骨疼痛。及已成數月。延綿不已。并楊梅風毒。誤服輕粉。癱瘓骨疼。不能動履。

川芎 當歸 防風 薏苡仁 木瓜 金銀花 木通 白癰皮 茅山蒼朮 威

靈仙各一兩 甘草五分 皂莢子五個切片微炒 仙遺糧二兩 瘡久氣虛者加

人參水二碗。煎八分。量病上下食前後服。腿腳之下。加牛膝一錢。病淺者一月可退。病深者百日可痊。忌牛肉燒酒海腥煎炒。此瘡發時。多先起於下疳。若以此方預服之。可

以止其不發梅毒也。

解毒天漿散 治楊梅瘡。不問新久。遍身潰爛。及筋骨作痛者。

天花粉二錢 防風 防已 皂角針 白癬皮 連翹 川芎 當歸 風藤 木

瓜 金銀花 蟬蛻 薏苡仁各一錢 甘草五分 土茯苓二兩 下部加牛膝。水

二鍾。煎八分。臨服入酒一杯。量病上下服之。

升麻解毒湯 治楊梅瘡筋骨疼痛。久而不愈。及治遠年近日流注結毒。皮肉破爛。咽

喉損破者。並宜服之。

川升麻 新鮮皂角針各四錢 上白土茯苓一斤 右項以上加白芷。咽內加桔梗。

胸腹加白芍。肩背加羌活。下部加牛膝。各一錢。用水八碗。煎至四碗。作四次。一日服盡。

每次頓熱。加麻油三茶匙。和勻。量病上下食前後服之。瘡甚者不過十服。

歸靈湯 治楊梅瘡。不問新久。但元氣虛弱者。

川芎 當歸 白芍 熟地 薏苡仁 木瓜 防風 天花粉 金銀花 白蘇皮

人參 白朮各一錢 甘草五分 威靈仙六分 下部加牛膝五分。水三鍾。煎至二

鍾二次上下食前後服之。渣再煎八分服。

防風必效散 治楊梅瘡濕熱太盛。瘡高稠密。元氣素實者。

防風 防己 荊芥 白蘚皮 連翹 槐花 蒼朮 皂角刺 風藤 木通 白

芷 天花粉 木瓜 金銀花 翻白草各一錢 甘草五分 土茯苓四兩 初起

加大黃三錢。水三碗。煎二碗。二次服。渣再煎一碗。服後飲酒一大杯。卽靜睡一時。更妙。

翠雲散 治楊梅瘡已服內藥。根脚不紅。瘡勢已退者。

銅綠 膽礬各五錢 輕粉 右膏煨各一兩 共研細末。磁罐收貯。濕瘡乾。搽乾瘡

公豬膽汁調塗。三日點三次。其瘡自乾而愈。

鵝黃散 治楊梅瘡潰爛成片。膿穢多而疼甚者。

石膏煨 輕粉 黃蘗炒 右各等分爲細末。乾搽爛上。卽可生疤。再爛再搽。毒盡

愈。此解毒止痛收乾之效藥也。

單方

楊梅瘡用銅綠酢煮研。燒酒調搽。極痛出水。次日即乾。加白礬等分研搽。簡便方

又

方黑鉛廣錫各二錢半。結砂。蜈蚣二條爲末。紙捲作撚。油浸一夜。點燈。日照瘡二次。七日見效。集元方

楊梅瘡水銀黑鉛各一錢。結砂黃丹一錢。乳香沒藥各五分爲末。以

紙捲作小燃。染油。燈點。日照三次。七日見效。又方用水銀黑鉛。結砂銀硃。各二錢。白

花蛇一錢爲末。作紙燃七條。頭日用三條。自後日用一條。香油點燈於被內薰之。勿透風。上有瘡。連頭蓋之。又方水銀一錢二分。黑鉛白錫各八分。共結砂黃丹四分。硃

砂六分爲末。分作十二紙。撚以香油。浸燈盞內。點於小桶中。以被圍病人坐之。以鼻細

細吸咽。三日後。口吐出惡物爲效。楊梅瘡癰。輕粉大楓子肉等分爲末。塗之即愈。衛生方

同方下。又方用輕粉二錢。杏仁四十二個。去皮洗瘡。拭乾搽之。不過三日。即愈。乾則

以鵝膽汁調。楊梅瘡用輕粉一錢。雄黃丹砂各二錢半。槐花炒龜板炙。各一兩爲末。

糊丸梧子大。每服一錢。冷茶下。日二服。七日愈。統旨又方用輕粉。胡桃仁。槐花炒研。

紅棗肉各二錢。搗丸分作三服。初日鷄湯下。二日酒下。三日茶下。三日服盡。五日瘡乾。

七日痂落

輕驗方

又方用豬腎一對去膜批開各搽輕粉一錢紮定麻油二兩煨

熟頓食若口腫牙痛仍服金銀花藥

又方用大鷄卵一枚去黃留白入輕粉攪勻

紙糊飯上蒸熟食

又方銀硃輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和水以油紙攤

貼瘡痂自脫也

又方酢調礬末傅之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二日即乾

又方用冷飯團四兩皂角子七個煎代茶飲淺者二七深者四七見效

又方冷

飯團一兩五加皮皂角子苦參各三錢金銀花一錢好酒煎日一服

楊梅瘡瘡水

萍煎汁浸洗半日數日一作

集簡方下同

楊梅毒瘡乃陽明積熱所生槐花四兩略炒

入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿用

椰子瓢主治楊梅瘡筋骨痛燒存性臨時

炒熟以滾酒泡服二三錢暖覆收汁其痛即止

珍時

楊梅瘡爛古醫上螺螄殼辰砂

等分片腦少片爲末擦之

又方馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨滅

又方大楓子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之

衛生方

又天花粉芎藭各

四錢槐花一兩爲末米糊丸梧子大每空心淡薑湯下七八十丸

簡便方

又水銀一兩硃

砂雄黃各二錢半。白礬綠礬各二兩半。研勻罐盛。燈盡蓋定。鹽泥固濟。文武火煉。升罐口掃收。每以三錢入乳香沒藥各五分。灑太乙膏上貼之。絕效。名五寶霜。又方粉霜一味。搽之。^{集簡方}

又方龍掛香。孩兒茶。皂角子。各一錢。銀硃二錢爲末。紙捲作撚。點燈置桶中。以鼻吸煙。一日三次。三日止。內服解毒藥。瘡卽乾。^{集簡方}

又方不拘新

久輕重皆效。名金蟾蛻甲酒。用好酒五斤。大蝦蟆一箇。浸酒內。封瓶口。煮香二枝。取起。待次日隨量之大小。一醉爲度。冬夏蓋被出汗爲效。存酒次日只服量之一半。酒盡瘡愈。又治楊梅結毒筋骨疼痛。諸藥不妙者。更妙。服七日後。不許見風爲要。忌口及房事百日。絕根矣。

第三章 淋病總論

淋之爲病。小便痛澀。滴瀝欲去不去。欲止不止者是也。是亦便濁之類。而實濁之甚者。但濁出於暫。久而不已。則爲淋證。其證則或有流如膏液者。或出如砂石而痛不可當者。或有如筋條者。或時爲溺血。血條者。此淋之與濁。誠有不同。故嚴氏有五淋之辨。曰

氣石血膏勞是也。氣淋小便澀。常有餘瀝。石淋莖中痛。溺如砂石。不得卒出。膏淋溺如膏出。勞淋勞倦即發。痛引氣衝。血淋遇熱即發。甚則熱血候其鼻頭色黃者。小便難也。大抵此證多由心腎不交。積蘊熱毒。或酒後房勞。服食燥熱。七情鬱結所致。此嚴氏之說。固已盡之。然淋之初病。則無不由乎熱劇。無容辨矣。但有久服寒涼而不愈者。又有淋久不止及痛澀皆去而膏液不已如白濁者。此爲中氣下陷及命門不固之證。必以脈證而察其寒熱與虛。庶乎無誤。

第四章 淋濁治法

小便淋痛。用真定甕器煨研二兩。生熟地黃末各一兩。每用二錢。木通煎湯服。適用方

卒淋不通。好墨燒一兩爲末。每服一錢。溫水服。普濟方 小便氣淋。比輪錢三百文。水一

斗。煮取三升。候溫服之。千金方 沙石淋痛。古文錢煮汁服。普濟方 小便淋疾。溫水和雲

母粉服三錢。血淋沙淋。小便澀痛。用黃爛浮石爲末。每服二錢。生甘草煎湯調服。直指

方 石淋破血。浮石滿一手爲末。以酢一升。水三升。和煮二升。澄清。每服一升。愈。適用方

石淋取細白砂三升。炒熱。以酒三升。淋汁服一合。日再服。小便淋痛。石燕子七枚。

搗黍米大。新桑根白皮三兩。拌勻。分作七貼。每貼用水一盞。煎七分。空心午前各一服。

濟衆方 血淋心煩。石燕子。商陸。赤小豆。紅花等分爲末。每服一錢。葱白湯調下。漏精。

血濁。雪白鹽一兩。并築緊固濟煨一日。出火毒。白茯苓。山藥各一兩爲末。棗肉和蜜丸。

梧子大。每棗湯下三十丸。蓋甘以濟鹹。脾腎兩得也。五種淋。疾勞。淋氣。淋血。淋熱。淋。

石淋。及小便不通至甚者。用透格散。硝石一兩。不夾泥土。雪白者。生研爲末。每服二錢。

各依湯使。勞淋。勞倦虛損。小便不出。小腹急痛。葵子末煎湯下。通後便須服補虛丸散。

小便不出。時下血。疼痛滿急。血淋也。小便熱赤色。臍下急痛。熱淋也。并用冷水調下。氣。

淋。小腹滿急。尿後常有餘瀝。木通煎湯下。石淋。內痛。尿不能出。內引小腹膨脹。尿下。

砂石。令人悶絕。將藥末先入攪勻。隔紙炒至紙焦爲度。再研用溫水調下。小便不通。小。

麥湯下。卒患諸淋。只以冷水下。并空心調藥。使硝如水。乃服之。靈苑方 氣虛白濁。黃芪。

鹽炒半兩。茯苓一兩爲末。每服一錢。白湯下。沙淋。石淋。人參。焙黃芪。鹽水炙等分爲。

末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片煎炙令乾再炙勿令焦以蜜盡爲度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以瘕爲度三因方小便卒淋萎麤一兩芭

蕉根四兩水二大碗煎一碗半入滑石二錢分三服聖惠方小便卒淋紫草一兩爲散

每食前用井華水服二錢千金方血淋熱痛黃芩一兩水煎熱服千金方小便血淋澹

痛山慈姑花同地蘂花陰乾每用二錢水煎服聖惠方小便熱淋白茅根四升水一斗

五升煮取五升適冷暖飲之日三服肘后方血淋熱淋白薇芍藥各一兩爲末酒服方

寸七日三服千金方小便氣淋結澀不通白芷酢浸焙乾二兩爲末煎木通甘草酒調

下一錢連進二服普濟方小便五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麴裏煨爲末每服一錢水

一盞煎七分空心服博濟方小便渾濁如精木香當歸沒藥等分爲末以刺棘心自然

汁和丸梧子大每食前鹽湯下三十丸普濟方白濁腹滿不拘男婦用益智仁鹽水浸

炒厚朴薑汁炒等分薑三片棗一枚水煎服永類方小便淋瀝生續斷搗絞汁服卽馬

薊根也古今錄驗小便血淋苧根煎湯頻服大妙亦治諸淋聖惠方五種淋疾苧麻根兩

莖打碎。以水一碗半煎半碗頓服。卽通。斗門

砂石熱淋。馬蘭花七枚。燒故筆頭二七

枚。燒粟米一合炒爲末。每服三錢。酒下。日二服。名通神散。男婦血淋。亦治五淋。多年

煮酒瓶頭箬葉。三五年至十年者。尤佳。每用七箇。燒存性。入麝香少許。陳米飲下。日三

服。有人患此。二服愈。百一尿白如注。小腹氣痛。茶籠內箬葉燒存性。入麝香少許。米

飲下。經驗方

血淋澀痛。芭蕉根。旱蓮草。各等分。水煎服。聖惠方

小便血淋。生地黃汁。

車前葉汁。各三合。和煎服。小便淋痛。或尿血。或砂石脹痛。用川牛膝一兩。水二盞。煎

一盞。溫服。杜牛膝亦可。或入麝香乳香爲良。小便血淋。葵子一升。水三升。煮汁。日三

服。千金方

小便淋痛。葵花根洗剉水煎五七沸服。實錄

小便血淋。蜀葵花根二錢。車前

子一錢。用水煮。日服之。簡便方

石淋破血。五月五日收葵子炒研。食前溫酒下一錢。當

下石出。外臺秘要

小便血淋作痛。車前子曬乾爲末。每服二錢。車前葉煎湯下。普濟方

淋作痛。車前子一升。以絹袋盛水八升。煮取三升服之。須臾石下。肘后方

體熱甚。車前子五合。綿裹煮汁。入青粱米四合。煮粥食。常服明目。老親養

小便五淋。

苦杖爲末。每服二錢。用飯飲下。

集驗方

熱淋瀝痛。扁竹煎湯頻飲。

生生編

男婦諸般淋

疾。苦杖根洗淨。剉一合。以水五合。煎一盞。去渣。入乳香。麝香少許。服之。

熱淋急痛。海

金沙草陰乾爲末。煎生甘草調服二錢。一方加滑石。

夷堅志

膏淋如油。海金沙滑石各

一兩。甘草梢二錢半爲末。每服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。

仁存方

血淋痛澀。海金沙

末。新汲水。或砂糖水。服一錢。

普濟方

赤白濁淋。好大黃爲末。每服六分。以雞子一箇破

頂。入藥。攪勻。蒸熟。空心食之。不過三服愈。

簡便方

洩數白濁。熟附子爲末。每服二錢。薑

三片。水一盞。煎六分。溫服。

普濟方

白濁夢遺。半夏一兩。洗十次。切破。以木豬苓二兩同

炒黃。出火毒。去豬苓。入煨過牡蠣一兩。以山藥糊丸。梧子大。每服三十丸。茯苓湯送下。

腎氣閉而一身精氣無所管攝。妄行而遺者。宜用此方。蓋半夏有利性。豬苓導水。使腎

氣通也。與下元虛憊者不同。

本事方

小便淋瀝。菟絲子煮汁飲。

范汪方

小便血淋。牽牛

二兩。半生半炒爲末。每服二錢。薑湯下。良久。熱茶服之。沙石淋疾。重者取去根本之

菝葜二兩爲末。每米飲服二錢。後以地椒煎湯浴腰腹。須臾即通。

聖濟總錄

小便淋瀝。木

防己防風葵子各二兩咬咀。水五升。煮二升半。分三服。千金方 小便膏淋。葶草搗生汁。

三升。酢二合。合和頓服。當尿下白汁。小便石淋。葛葦掘出根。挽斷。以杯於坎中承取。

汁服一升。石當出。不出更服。范汪方 五淋滲痛。赤藤即做草鞋者。白茯苓。苧麻根等分。

爲末。百沸湯下。每服一錢。究原方 小便淋痛。石葦滑石等分爲末。每飲服刀圭最驗。惠聖方

小便血淋。酸草搗汁煎五苓散服之。俗名酢嗽嗽是也。百一還方 諸淋赤痛。三葉酸。

漿草洗研。取自然汁一合。酒一合。和勻。空心溫服。立通。靈苑方 小便血淋。血風草并水。

搗服。三度即愈。經驗方 又方。乳汁發動。小便淋瀝。心神悶亂。船底青苔。半雞子大。煎汁。

溫服。日三四次。聖惠方 小便沙淋。屋上瓦松。煎濃湯。乘熱熏洗小腹。約兩時即通。經驗方

熱淋莖痛。馬麻子。蔓菁子各五合。炒黃。緋袋盛。以并華水三升浸之。每食前服一錢。

聖惠方 五淋澀痛。冬麻子半斤。研碎。水瀹取汁。入粳米二合。煮稀粥。下葱椒鹽豉。空心。

食。銳心方 熱淋脹痛。麻皮一兩。炙甘草三分。水二盞。煎一盞服。日二取效。聖惠方 老人五。

淋。身熱腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升。煮一升。飲之即愈。本草方 男子白濁。蕎麥炒。

焦爲末。雞子白和丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。名濟生丹。夜小便脚停白。

濁。老人虛人多此證。令人卒死。大能耗人精液。主頭昏。重用糯米五升。炒赤黑。白芷一

兩。爲末。糯米糊丸。梧子大。每服五十丸。木饅頭煎湯下。無此用局方補腎湯下。若後生

稟賦怯弱。房室太過。小便太多。水管塞澀。小便如膏脂。入石菖蒲牡蠣粉甚效。名白糯米

丸。經驗方。小便白濁。糯米草煎濃汁。露一夜。服之。補元方。五淋澀痛。青粱米四合。入漿

水煮粥。下土蘇木三兩。每日空心服之。沙石熱淋。痛不可忍。用薤苡仁或子葉根皆

可。用水煎熱飲。夏月冷飲。以通爲度。楊氏經方。小便血淋。大豆葉一把。水四升。煮二升

服。聖惠方。熱淋血淋。不拘男女。用赤小豆三合。慢炒爲末。煨葱一葉。薑酒熱調三錢

服。秘旨。老人淋痛。青豆二升。橘皮二兩。煮豆粥。下麻子汁一升。空心漸食之。并飲其

汁。甚驗。養老書。急淋陰腫。泥葱半斤。煨熟杵爛。貼臍上。外臺。小便淋澀。或有白者。以赤

根樓葱近根截一寸許。安臍中。以艾灸七壯。經驗方。小便淋澀。或有或無。用大蒜一箇

紙包煨熟。露一夜。空心新水送下。集驗方。小便白濁。生蘿蔔剉空留蓋。入吳茱萸填滿。

蓋定簽住糯米飯上蒸熟。取去茱萸。以蘿蔔焙研末。糊丸梧子大。每服五十丸。鹽湯下。

日三服。

丹濟方下同

沙石諸淋。疼不可忍。用蘿蔔切片密浸少時。炙乾數次。不可過焦。細

嚼。鹽湯下。日三服。

名眼眩膏。

小便淋痛。水芹菜白根者。去葉搗汁。井水和服。聖惠方

小便卒淋。繁縷草滿兩手。水煮。常常飲之。東陽方

氣淋脹痛。雞腸草三兩。石葦去毛一

兩。每用三錢。水一盞煎服。

小便熱淋。馬齒莧汁服之。聖惠方

血淋疼痛。茄葉薰乾爲

末。每服二錢。溫酒或鹽湯下。隔年者尤佳。經驗方 男子白濁。陳冬瓜仁炒爲末。每空心

米飲服五錢。即愈。救急易方

血淋疼痛。桑黃柳白皮。各二錢。水煎服。日一次。聖惠方 石淋作

痛。桃木膠如棗大。夏以冷水三合。冬以湯三合和服。日三服。聖惠方 石盡即止。千金 血

淋作痛。桃膠炒木通石膏各一錢。水一盞。煎七分。食後服。家藏方 小便血淋。用乾柿三枚。

燒存性研末。陳米飲服。藥氏方

又方用白柿烏豆鹽花煎湯。人墨汁服之。聖惠方 熱淋澀

痛。乾柿燈心等分水煎。日服。朱氏方 小便白濁。生白果仁十粒。搗水飲。日一服。取效止。

石淋痛楚。便中有石子者。胡桃肉一升。細米煮漿粥一升。和頓服。即愈。海上方 冷

淋莖痛。榭葉研末。每服三錢。水一盞。葱白七寸。煎六分。去渣。食前溫服。日二。孫真小

便淋痛。麵煨檳榔。赤芍藥各半兩。爲末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。良十方便

血淋作痛。檳榔一枚。以麥門冬煎湯。磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。沙石淋痛。胡

椒。礞石等分。爲末。每服用二錢。白湯下。日二。名二拗散。普五淋血淋。用野葡萄藤竹

芫荽。淡竹葉。麥門冬。連根苗。紅棗。肉。燈心草。烏梅。當歸。各等分。煎湯代茶飲之。白一

男婦熱淋。野葡萄七錢。葛根三錢。水一鍾。煎七分。入童子小便二分。空心溫服。乾秘

小便熱淋。生藕汁。生地黃汁。葡萄汁。各等分。每服一盞。入蜜溫服。小便血淋。蓮房燒

存性。爲末。人麝香少許。每服二錢半。米飲調下。日二。良方淋瘕溺血。取乳香中夾石

者。研細。米飲服一錢。得效尿渾白濁。用厚朴。薑汁炙一兩。白茯苓一錢。水酒各一碗。

煎一碗。溫服。經方腎消膏淋。病在下焦。苦楝子。茴香等分。炒爲末。每溫酒服一錢。惠

小便淋閉。皂角刺燒存性。破故紙等分。爲末。無灰酒服。聖錄虛勞白濁。楡白皮二

升。水二斗。煮取五升。分五服。金五淋澀痛。楡白皮二升。水二斗。煮取五升。分五服。金

小便氣淋。榆枝石燕子煎水日服。普濟方

五淋澀痛。榆白皮陰乾焙研。每以二錢

水五合煎如膠。日二服。血淋不止。櫻欄皮半燒半炒爲末。每服三錢。衛生家小便

白濁。構葉爲末。蒸餅丸梧子大。每服三十丸。白湯下。經良方血淋瀝痛。生山梔子末

滑石等分。葱湯下。五淋白濁。螺螄一碗。連殼炒熟。入白酒三碗。煮至一碗。挑肉食之。

以此酒下。數次即效。扶壽精方氣結淋病不通。用好綿四兩。燒灰。麝香半分。每服二錢。溫

葱酒連進三服。沙石淋痛。用九肋鼈甲酢炙研末。酒服。方寸七。日三服。石出瘥。附后

小便血淋。蜣螂研水服。施氏方小便五淋。用石決明。去粗皮研爲末。飛過熟水服二

錢。每日二服。如淋中有軟硬物。即加朽木末五分。勝方小便淋痛。多年木梳燒存性

空心冷水服。男用女。女用男。救急方石淋疼痛。雞矢白曬半乾。炒香爲末。以酸漿飲服

方寸七。日二。當下石出。古今錄驗虛勞白濁。羊骨爲末。酒服。方寸七。日三。千金小便膏淋。

羊骨燒研。榆白皮煎湯。服二錢。惠理治石淋。用鯉魚齒一斤。研末。以三年酢和分三服。

一日服盡。外臺治卒淋。用酒服。脾虛白濁。過慮傷脾。脾不能攝精。遂成此疾。以羊脰