

華園醫學六種第二冊

十藥神書 地霍亂吐瀉方論
官藥局示諭 夏令施診歌訣

光緒甲申季春

江西書局開雕

付梓以廣其傳庶不負先生壽世壽人之意云
爾咸豐歲次彊圉大荒落季冬後學林壽萱謹
跋

姑蘇葛可久先生精通方術與丹溪朱彥修齊
名所著十藥神書專治虛損雖編中僅列十方
而用藥之次第逐一條陳吳航陳修園謂其奇
而不離於正誠哉是言也顧前此流傳皆爲贋
本修園解組後始得原書重加注解將刊附於
傷寒論金匱要略之後而未果乙卯歲萱從舊
書坊中得一鈔本於今三年矣遍詢方家俱無
是書萱不敢私自秘藏因並作湯方俚訝亟謀

五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

此葉天士家藏秘書也前此流傳皆爲贋本余
歸田後始得原書重爲訂注附於傷寒論金匱
要略之後蓋以傷寒論金匱要略爲萬古不易
之準繩而此書則奇以取勝也然奇而不離於
正故可取焉閩長樂陳念祖識

十藥神書

姑蘇葛可久編

古吳潘爵韓園重校增注

甲字十灰散

治嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薊 小薊 荷葉 扁柏葉 茅根

茜根 山梔 大黃 牡丹皮 櫻櫚皮

各等分

右各燒灰存性。研極細末。用紙包。碗蓋於

辛字潤肺膏

壬字白鳳膏

癸字補髓丹

平胃散方

附

四君子湯

附

十藥神書目錄

甲字十灰散

乙字花蕊石散

丙字獨參湯

丁字保和湯

戊字保真湯

己字太平丸

又名甯嗽金丹

庚字沉香消化丸

十藥不申書

付霍亂吐
瀉方論

論治。審其脉洪面赤。傷於酗醉惱怒者。爲火載血而上行症。余製有惜紅丸。日夜三四服。但須以麻沸湯泡服。不可煮服爲囑。審其素能保養。脉沈而細面赤淡白。血來時外有寒冷之狀者。爲陽虛陰必走症。余製有惜紅散。加鮮竹茹。日夜服三劑。其藥之配合。散見於拙刻各種中。茲因集隘不能備登。

乙字花蕊石散

潘按一治產後
敗血不盡血迷
血暈胎衣不下
脈急不省人事
但心頭溫者急
用一服灌下瘀
血化水而出其
人卽甦效驗如
神

五藏崩損湧噴血成升斗用此止之

花蕊石

火煨存性
研爲末

右用童便一鍾。炖溫調末三錢。甚者五錢。

食後服下。男子用酒一半。女人用醋一半。

與童便和藥服。使瘀血化爲黃水。服此以

後藥補之。

每服只可
壹錢潘注

花蕊石須火煨研。炖分酒醋和童便。功能化瘀

爲黃水。輕用三錢重五錢。

舊注

程瘦樵云係周氏所注然余以未得名號爲憾

治吐血者競推

葛可久而先生首以二方止血明明劫劑毫無顧忌細玩始知先生意之所到理之精也人生於陽根於陰陰氣虧則陽自勝上氣爲之喘促咳吐痰沫發熱面紅無不相因而致故留得一分自家之血卽減得一分上升之火易爲收拾何今日之醫動以引血歸經爲談不可概用止血之味甚至有吐出亦美壅

潘耒金匱治虛
癆症以補虛祛
風逐瘀爲三大
綱此不易之準

反爲害。遂令遷延時日。陰虛陽旺。煎熬不止。
至於不救。果誰之咎。執引經而緩時日。冀復
元神。吾恐有形之血。豈能使之速生。而無偶
之陽。何法使之速降。此先生所以急於止血
之大旨也。

陳脩園按虛癆症。金匱以桂枝加龍骨牡蠣
湯。從腎虛以立法。建中湯。從脾虛以立法。黃
耆建中湯。從氣血兩虛以立法。八味地黃丸。

天雄散溫其下元。從脾腎氣血之總根處以立法。是以補虛爲一大綱也。以薯蕷丸治風氣百疾。虛羸諸不足。是以祛風爲一大綱也。以大黃廔蟲丸治乾血成癆。是以逐瘀爲一大綱也。三綱鼎足。爲此症不易之準繩。今葛仙翁以花蕊石散繼於十灰散之後。雖云止血。實欲使瘀血化爲黃水而不見血也。然自余思之。吐血旣止。而離經之血蓄而不行。不

潘按薯蕷丸治
虛癆諸不足風
氣百疾
廬蟲丸治五癆
諸傷內有乾血

可不用此散化之。若血來勢如湧泉相續不絕。竟用此散。令其盡化爲水。是令一身之血俱歸烏有。尙有生理乎。讀書不可死於句下。此其一也。且三大綱因虛而成癆。醫書恆有治法。而因風而致者。言之頗罕。而因瘀血而致者。除仲景金匱大黃廬蟲丸。仲景小品百癆丸外。未有發明其旨。且金匱以薯蕷丸與大黃廬蟲丸並舉。意以風氣不去。則足以賊