

醫學秘奧上



分四服姜七片煎

柿蒂湯

發喊連聲不絕神思疲倦至七八聲相連收氣不

回者難治

丁香

柿蒂

山梔

人參

茯苓

陳皮

半夏

良姜

甘草

竹茹

黃連

姜七片煎

虛人加知母黃柏

發喊者怒氣滿

胸常欲叫此肝經之症正難療者

健脾散

潰後痞滿不食

蓮肉

砂仁

四夕

香附

藿香

茯苓

三夕

陳皮

山藥

蒼朮

木香

一夕

炙草

二夕

生薑

棗子

去核

右剉分作六服

加味四君子湯

嘔吐心悶

人參

一夕

炙草

五夕

白朮

一五夕

茯苓

白朮

厚朴

各八夕

陳皮

一夕

砂仁

一夕

姜三棗二去核煎

加味治中湯

瀆後泄瀉不止

青皮

炒三夕

阿子

五夕

乾姜

炒

白朮

土炒



茯苓 各五錢 人參

砂仁 各三錢 半夏 二錢

甘草 一錢

右作六服姜五片煎

三和湯 潰後手足浮腫

羌活

紫蘇

木瓜

沉香 各一錢

木香

白朮

檳榔 各七錢

川芎 三錢

甘草

陳皮 各七錢

大腹皮 二錢

每用水煎服

大麥門冬湯 潰後小便淋瀝不通

麥門冬 一錢

人參 四錢

甘草 一錢

澤瀉 五錢



天門冬 二冬
木通 三冬

滑石 二冬

右作四次水煎服

黃芪六一湯
潰後虛汗如雨不止

黃芪 六冬
粉草 一冬

水煎服

六神散

諸瘡血出過多而心煩不安不得睡卧此忘心也

生地
熟地 各三冬
當歸
黃芪

人參 各五冬
川芎 三冬
水煎服

托裡溫中湯



一人年六十七歲五月左臂膊上至肩下至手指
色不變皮膚涼六脉沉細而微脉症俱寒醫曰此
附骨瘰也開已不遲燔針破之膿清稀次日肘下
再開加吃逆與丁香柿蒂湯二服稍緩此日吃逆
尤甚自痢臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏瞶於
左乳下黑處灸十四壯用托裏溫中湯內有姜附
丁沉或曰瘡瘍屬火當盛暑姜附可乎予曰經云
脉細皮寒瀉痢前後飲食不進此爲五虛况吃逆
胃中虛冷之極諸瘡痛痒屬火是言其常此症內
外相反當捨時從症非大方辛熱劑急治不能救

遂按之諸症悉去飲食進瘡勢溫膿色正又與五
香湯數服月餘而安

丁香

沉香

益智仁

茴香

陳皮

各一分

乾薑

羌活 三分

香附

四分

小香

一分五厘

炙草 三分

附子 一分

右十味作一服姜五片煎至一盞無時溫服內經

曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故用乾姜附子

大辛熱溫中外發陽氣自裏之表爲君羌活苦辛

溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脉爲

臣益智丁香沉香

本大

辛熱以散胃寒嘔逆不下食

爲佐內攻聚而爲滿木香茴香陳皮苦辛去痞散
滿爲使已上方夏月脉症俱寒用之甚宜

黃連清涼飲子

一人年六十歲冬至後發背疽五七日腫勢約七
寸開遲故爾變症果生覺瘡重如負石熱如火痛
非常六脉沉數按之有力此膏梁積熱之變邪氣
酷熱寒藥治之時冬月嚴寒復有用寒遠寒之戒
乃思內經有假者反之違其時從其症可也

黃連

當歸

炙草

大黃

酒煎

赤芍



右五味各等分每服一兩五錢水煎服之利下其
痛減七八明日再進前症悉除已上邪氣酷熱
實用力者宜用

癰疽疔腫發渴惡心胃滿

茯苓

甘草

陳皮

半夏

連翹

黃連炒

鼠粘子

天花粉

羌活

香附

砂仁

枳殼

姜汁竹瀝和服

替針透膿散

服此頭卽透出

此方有在前



復元通氣散

諸氣澁閉耳聾耳痛腹癰便毒無頭腫毒婦人乳

癰

青皮

陳皮

各四兩

甘草

二兩半
生半炒

山甲

瓜蒌仁

各二兩

金銀花

連翹

各一兩

末之每二錢酒下無頭津液調塗此方活血止痛

消腫

酒製大黃散

婦人七十形實性急好酒生腦疽五日脉緊急而
澁急用大黃酒浸紙裏煨切細拌炒爲末再以酒

拌炒熟用人參加姜煎調服一錢兩時刻再進一服睡少頃有汗覺來病已去矣

消毒散

年七十生項疽脉實而稍大因憂悶生熱所致作

大陽經療之

歸頭

熟地

酒洗

黃芩

酒炒

黃連

酒洗

各一

黃栢

酒洗

黃芪

羌活

桔梗

人參

生地

陳皮

防己

防風

澤瀉

甘草

連翹

水二鍾煎服



丁附五香湯

一人年七十冬至後生腦疽腫痛而大醫士候瘡
熟針出膿因怒笞侍妾瘡輒內陷凹一韭葉許面
色青黃不澤四肢逆冷汗出身涼嘔吐脉極沉細
而遲蓋衰老嚴寒時病苦楚飲食淡薄瘦瘁加怒
精神損耗故此有寒變也病與時同乃製五香湯
一劑加丁香附子五錢瘡後大發隨症調治而安
內經言凡治病察其下謂察時下之宜也

托裏溫經湯

寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中聚爲赤腫痛不可

忍惡寒發熱四肢疼痛

麻黃 四月

防風

升麻

葛根 各

白芷

當歸

蒼朮 各三

人參

白芍 各二

甘草 二

柴胡 一

陳皮

十二味每一兩水二碗先煎麻黃湯去沫方下

餘藥煎至八分溫服卧煖處綿衣覆之得汗而散

內經云冬月閉藏用藥多而少鍼石宜以苦溫之

劑溫經散寒為要而腠理當以苦散之但辛發散

之用麻黃苦溫發之為君防風辛溫散之升麻苦

平葛根甘平解肌出汗專治陽明經邪為臣血留



不行則痛以白芷辛溫當歸身和血散滯溫熱腫
則蒼朮苦甘溫行經壯力能泄膚腠間濕熱人參
甘草甘溫白芍酸寒調中益氣使托裏為佐以衣
覆首厚被蓋身卧煖處使經絡血溫腠理開寒邪
散湯氣升汗出腫減八九第二服去麻黃防風加
連翹粘子腫毒悉去內經云汗之則瘡已信然

內托榮衛湯

黃芪

五錢

防風

連翹

柴胡

各二錢

羌活

甘草

黃芩

人參

蒼朮

各一錢

當歸

一錢五分

桂枝

八分

紅花

二錢

右十二味剉分二服水酒各二盞煎八分溫服內
經曰天空西北左寒而右涼地不滿東南右溫而
左濕東南方陽也陽精降於下故右熱而左濕西
北方陰也陰精奉於上故左寒而右涼適寒涼者
以之而濕熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已夫東
南二方在人則丙小腸熱甲膽風皆俱下性炎上
其瘡外有六經形症內無便溺阻隔飲食如故小
便自調知不在裏非疽也癰癰小爲癰大爲癰其
邪受風濕地氣自外而來侵內經云榮氣不足逆
於肉理乃生癰腫諸瘡痛痒皆屬心火此瘡自外

而入是丙小腸左遷入膽作痛而非痒此二方皆
主血爲病必痛此元氣不足榮氣逆行其初出來
有傳變在於肌肉之上皮膚之間只於風熱六經
所行經絡地分出也宜瀉風濕熱醫者只知陰覆
其陽則宜汗此宜汗者乃濕熱鬱手足少陽致血
凝逆榮衛不能週身元氣消弱也其風濕熱滯
於下故面赤腫微黯風水惟上衝顏色多怒其瘡
色腫微黯瘡熱高起結硬作痛其脉止在左手右
屬表左寸外洪緩而陰是客邪在血脉之上皮膚
之間宜急發汗通榮衛則邪去矣以內托榮衛湯

發之

癰疽夜卧不睡名安神散

辰砂

乳香

各二

人參

酸棗仁

各一

分

末之棗肉丸人參湯下

柞木飲

發背癰疽未成者已成者並收奇功

乾柞木葉

四

萱草根

五

甘草節

金銀花

乾荷葉蒂

地榆

各一

分

右爲末每五錢水二鍾煎八分作二次早晚各進

一服粗再煎

