

金匱方歌括



序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱為鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐正冰更名為靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱為鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其意不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟與交之旨不愚解者遂至貽誤後來此修園先生節要淺註之所由也先生以名孝廉為賢有司活人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所列傷寒金匱若干種海內已不脛而走奉為主臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學異以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是為序

同治乙丑六月侯官楊浚雪滄

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治岐黃之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱庵張令韶為最餘子皆不及之及以至今窺其微者益少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔退公之餘擢藝術以救世咸活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也者傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣家嗣古愚得其傳著長沙歌括六卷所以使傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業益有聲真所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無一當者跡其名往訪之一劑而愈益以歎先生之神也先生繼父志既為梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫大於救人先生以繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同為可敬者誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之

道光十六年歲次丙申春正月愚弟汪鴻升拜撰

上海中医药大学图书馆藏

金匱方歌括凡例

一方中分兩者法服法俱遵原本但古今之權量不同漢之一兩今止二錢零予遵程氏活法每方取古方三分之一以作一劑又從二劑中取三分之一為一服每劑分為三服如桂枝湯此方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑此數味用各九錢分而三之是每服此數味各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而三之是此味每服二錢是也大枣全料用十二枚今照數不減者以秤則隨時不同而聚之分枚則一也是分而三之此味每服四枚是也啜粥溫覆禁食俱依古法餘倣此

一每方歌括之後必加方解間有治法方法意義既詳於歌中者不復於方後再解

一前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中或於註中採集不遺間有本愜於心者取原文細釋其旨求其合於內經又與難經之言相為表裏參之千金外臺之說相發明者而後補註之當閱吳醫常講以獨開生面不襲老生常談為高而予正與之相反覽斯集者必以剿說病之然而甘受而不辭也

一傷寒金匱諸方皆出伊聖湯液經說見藝文志其方通造化之微不可以尋常寒溫補瀉之說以窺測之且其用法俱本神農本草經若執宋元後之本草及李時珍綱目汪詡卷備要等對藥性失之遠矣家君刻有神農本草經讀行世凡讀傷寒金匱者不可一日離之

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦不凡今低一字以別之

小引

辛未秋孟元犀趨保陽承膝下歡竊見家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四註者而又更易其稿傷寒論淺

註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦元犀欲以高年節勞為請然而不敢遽請也一日命元犀取金匱方按

分兩並煮服等法韻註之倣傷寒一百一十三方歌括體裁元犀退而遵訓擬作六卷家君見而樂之遂即改正命

繕附於金匱淺註之後

嘉慶十六年重九前一日次男元犀識於保陽旅寓

上海中医药大学图书馆藏

金匱方歌括目錄

卷一

痼濕腸病方

括葉桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

桂枝湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括葉牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻湯去雄黃蜀椒

卷二

瘧病方

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括葉根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節方

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

血痹虛勞方

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯



黃耆建中湯

八味腎氣丸仿觀癖

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廣蟲丸

附子金翼炙甘草湯

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附子金桂枝皂莢湯

附子金生薑甘草湯

附子金甘草湯

附外臺桂枝白散

附子金葶藶湯

附子金葶藶大棗瀉肺湯仿見

奔豚氣病方

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食方

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方親

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯仿見

附外臺走馬湯

附外臺走馬湯

大承氣湯仿見

瓜蒂散

卷四

附外臺走馬湯

附外臺走馬湯

大承氣湯仿見

瓜蒂散



金匱方歌括

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人難病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

小柴胡湯
附方芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

已椒瀝黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見

小青龍湯方見

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草湯
附方小半夏加茯苓湯

苓甘加薑辛夏湯

苓甘五味加仁湯
辛夏半夏加仁湯

苓甘五味加薑辛夏半夏加仁湯

小半夏加茯苓湯方見

五苓散方見

消渴小便不利淋病方

五苓散方見

文蛤散

括葉瞿麥丸

腎氣丸方見

五苓散方見

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病方

五苓散方見

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯方見中

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散方見

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍藥附子湯

枳朮湯

附外臺已湯方見

卷五

黃疸方

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯方見水

猪膏蜜煎

茵陳五苓湯

大黃硝石湯

小半夏湯方見痰

柴胡湯方見

小建中湯方見

附瓜蒂湯方見

附千金麻黃酒湯



驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散見狐惑

瀉心湯

嘔吐噦下利方

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯見痰

猪苓湯

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶黎勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

卷六

蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲方

葶藶甘草湯財未

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠方

桂枝湯規下

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

男 詩古愚參訂孫男 心與藏菴 元靈石韻註 蘭芝亭同校字

瘧濕暈病方

括蕒桂枝湯 治太陽病其症備身體強八然脈反沈遲此為瘧病此湯主之

括蕒根 三兩 桂枝 三兩 生薑 切 芍藥 各三兩 甘草 二兩 大棗 枚十二 右六味咬咀以水九升微火煮取

三升溫分三服微汗汗不出食頃啜粥發

嘔太陽症備脈反沈遲身體八八欲瘧時三兩蕒根薑桂芍二甘十二棗枚宜

元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣挾風而鬱成內熱也本條云太陽症備脈反沈遲者此沈遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂枝湯和榮衛以祛風加括蕒根則清氣分之熱而大潤太陽既耗之液則經氣流通風邪自解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣 又按方中薑桂合甘棗為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘化陰陰陽和則得微汗而邪解矣嘔粥則又資陽明之穀氣以勝邪更深一層立法但項背八八脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脈沈遲者為風淫於外而內之津液已傷故加括蕒根以滋內以括蕒根苦寒潤燥之功大也 內經云肺移熱於腎傳為柔瘧龐安常謂此方括蕒根不主項強八八其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯 治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧此湯主之 元犀按無汗例用麻黃湯

然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗君葛根以清經絡之熱是發表中寓養陰之意也又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥以陽明主宗筋也

大承氣湯 治瘧病胸滿口噤卧不著席腳攣急必齟齬可與此湯 元犀按胸滿口噤腳攣急齟齬等證皆熱甚灼

筋筋急而甚之象以此湯急下而救陰 齟牙藥不能進以此湯從鼻中灌之 傷寒長沙方歌括

麻黃加朮湯 治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以火攻之宜此湯主之

麻黃 三兩 桂枝 二兩 甘草 炙 一兩 白朮 四兩 杏仁 去皮尖 右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

瘧濕暈病方



納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

嘔煩疼濕氣裏寒中發汗為宜忌火攻莫訝麻黃湯走表未加四兩裏相融

元犀按身煩疼者寒濕之邪著於膚表也膚表實故無汗無汗則邪無從出矣方用麻黃湯發膚表之汗以散寒

又恐大汗傷陰寒去而濕反不去如白朮補土生液而助除濕氣此發汗中寓緩汗之法也又白朮補脾驅濕之功甚

大且能助脾之轉輸而利水觀仲祖用朮各方可知今人炒燥炒黑上蒸水漂等製皆失經旨

麻黃杏仁薤白甘草湯 治病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取令所致也

微汗避風

嘔風濕身疼日晡時上濕無去來風濕分兩此 當風汗出取冷取傷病之基意麻半兩十枚杏仁炙甘草扶中濕之劑一兩

宜參 以上二方為濕家立法也又有風濕之證其痛輕掣不可屈伸非如濕家之痛重著不能轉側且濕家發

熱日暮不分風濕發熱日晡增甚晡時也陽明旺於申酉戌土惡濕今為風濕所干當其旺時邪正相搏則反劇也

濕無去來風有休作故名風濕然言風寒亦在其中觀原文云汗出當風或久傷取冷意可知矣蓋痙病非風不成

濕痺無寒不作方中麻黃散寒意以除濕杏仁利氣助麻黃驅寒之力甘草補中予薤白勝濕之權制方之精密如

此 防已黃耆湯 治風濕脈浮身重汗出惡風者主之

防已一兩 甘草半兩 白朮半兩 黃耆一兩 右剉麻豆大每服五錢匕生薑四片大棗一枚水盪

半煎八分去滓溫服 喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝加桂枝三分 下有陳寒者加細

辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

嗽身重脈浮汗止此節汗出止用防已驅之惡風七錢半朮五錢甘草通已者一兩磨分服每服五錢四片生薑一棗充

潮喘喘者再入五錢麻黃不和芍藥加三分分字去聲讀七錢五分今不差寒取細辛氣衝桂枝俱照三分效可誇

服後如蟲行皮裏腰下如水取被遮遮繞腰得微汗伊岐秘法聞長沙 合參 上方治實邪無汗即桂枝麻黃

二湯例也虛汗自出故不用麻黃以散之只用防已以驅之服後如蟲行及腰下如冰云云皆濕氣下行之徵也然非耆朮甘草烏能使衛陽復振而驅濕下行哉 元犀按張隱菴本草經注云防已生於漢中者破之紋如車輻然滕空通主通氣行水以防已土之藥故有防已之名金匱治水治痰諸方蓋取氣運於上而水能就下也李東垣謂防已乃下焦血分之藥上焦氣分者禁用等論張隱菴歷歷指駁使東垣聞之當亦俯首無詞噫不讀神農本草經而妄為臆說甘為伊岐之罪人復何責焉防已功用余先君注有神農本草經議論甚詳毋庸再贅

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯 以上三方歌解證治俱見傷寒

白虎如人參湯 傷寒 太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴者主之 元犀按白虎西方神名也其名為秋其政清肅涼風至白露降則溽暑潛消以此湯有微暑熱之功行清肅之政故以白虎名之

瓜蒂湯 治太陽中喝身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之

瓜蒂散

右剉以水一升煮取五合去滓溫服

喝病陰陽認要真熱疼身重得其因暑為濕鬱名陰暑二七甜瓜蒂可珍

元犀按此物能去水氣水去則暑無所依而自愈矣 尤在涇云暑雖陽邪而氣恒與濕相合陽求陰之義也暑因濕入而暑反居濕之中陰包陽之象也 又云暑之中人也陰虛而多大者暑即寓於火之中為汗出而煩渴陽虛而多濕者暑即伏於濕之內為身熱而疼重故暑病恒以濕為病而治濕即所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑解此治中暑兼濕者之法也

百合狐惑陰陽毒方

總歌百合肺云兩脉朝於病從百脉成起居胃味各難名藥投吐利如神附頭痛參觀溺更明脉以溺時頭痛為辨蓋百以太陽統六經之氣其經上循顛頂下通水道氣化不行乃下瀦而上頭痛少陰為生水之源開閉澀乃瀦而漸熱

百合知母湯 百合病發汗後者此方主之

百合十枚

知母 三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水別以泉水二升煮取一升去滓別以泉水

二升煎知母取一升後合煎取一升五合分溫再服



嗽病非應汗汗傷陰知母當遵三兩歲漬去沫涎七枚百合別煎泉水是金鍼諸方煎法俱同

元犀按百脈俱朝於肺百脈俱病病形錯雜不能悉治只於肺治之肺主氣氣之為病非實而不順即虛而不足百合能治邪氣之實而補正氣之虛知母入肺金益其水源下通膀胱使天水之氣合而所傷之陰轉則其邪從小便

出矣若誤汗傷陰者汗為陰液陰液傷故以此湯維其陽維陽即所以救陰也 王晉三本文云百脈一宗明言病

歸於肺君以百合甘草清肺即此可療此疾再佐以各經清解絡熱之藥治其病所從來當用先後煮法使不悖於

手足經各行之理若誤汗傷太陽者溺時頭痛以知母救肺之陰使膀胱水府知有母氣救肺即所以救膀胱是陽

病救陰之法也

百合滑石代赭石湯 百合病下之後者此湯主之

百合七枚 滑石三兩碎 代赭石半斤

去滓後合和重煎取一升五合分溫服五合

嗽不應議下下之差既下還當竭舊邪百合七枚赭石大滑須三兩效堪誇

元犀按誤下者其熱必陷熱陷必傷下焦之陰故以百合清補肺金引動水源以代赭石鎮離火而不使其上騰以

滑石導熱氣而能通水府則所陷之邪從小便而出自無灼陰之患矣此即見陽救陰法也 王晉三云誤下傷少

陰者溺時漸然以滑石上通肺下通太陽之陽恐滑石通府利竅仍蹈出汗之弊乃復代赭石重鎮心經之氣使無

汗泄之虞是陰病救陽之法也

百合雞子黃湯 百合病吐之後者此方主之

百合七枚 雞子黃一枚 右先煎百合如前法取一升去滓納雞子黃攪勻煎五分溫服

嗽不應議吐吐傷中中者陰也必伏陰精上奉功內經云陰精上奉其人壽百合七枚洗去沫雞子黃後入攪渾融

元犀按吐後傷中者病在陰也陰傷故用雞子黃養心胃之陰百合滋肺氣下潤其燥胃為肺母胃安則肺氣和而

令行此亦用陰和陽無犯攻陽之戒 王晉三云誤吐傷陽明者以雞子黃救厥陰之陰以安胃氣救厥陰即所以

鎮陽明救肺之母氣是亦陽病救陰之法也

百合地黄湯 百合病不經吐下發汗病形如初者此湯主之

百合七枚 生地黃汁一升 右洗煎百合如前法取一升去滓納地黃汁煎取一升三合溫分再服中病勿更

服大便當如漆

嗽不經汗下吐諸傷形但如初守太陽遷延日久始終不變者在地汁一升百合七陰柔最是化陽剛

元犀按病久不經吐下發汗病形如初者是鬱久生熱耗傷氣血矣主之百合地黄湯者以百合苦寒清氣分之熱

地黃汁甘潤洩血分之熱皆取陰柔之品以化陽剛為洩熱救陰法也中病者熱邪下洩由大便而出矣故曰如漆色

百合洗方 百合病一月不解變成渴者此方主之 右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以

鹹豉也

嗽月週不解渴因成邪熱流連肺不清百合一升水一斗洗身食餅不和羹勿以鹽豉

〔合參〕皮毛為肺之合洗其外亦所以通其內也又食煮餅者假麥氣穀氣以輸津勿以鹹豉者恐鹹味耗水以增

渴也

括蕒牡蠣散 百合病渴不差者此散主之

括蕒根 牡蠣熟等分 右為細末飲服方寸匕日三服

嗽洗而仍渴屬浮陽牡蠣蕒根並等量研末飲調方寸匕寒氣鹹苦結寒效逾常

元犀按洗後而渴不差是內之陰氣未復陰氣未復由於陽氣之亢故用牡蠣以潛其陽括蕒根以生其津津生陽

降而渴愈矣

百合滑石散 百合病變發熱者此散主之

百合炙一兩 滑石三兩 右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

嗽前此寒無熱亦無首章言如寒無寒言熱無熱變成發熱熱堪虞清疎滑石宜三兩百合烘篩一兩需

元犀按百合病原無偏熱之證變發熱者內熱充滿淫於肌膚非如熱之比主以百合滑石散者百合清金瀉火降



逆氣從高源以導之滑石退表裏之熱利小便二味合為散者取散以散之之義散調絡脉於週身引内外之熱氣悉從小便出矣

甘草瀉心湯

治狐惑病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目赤下黑下白蝕於上部則聲啞宜此湯蝕於下部則咽乾宜苦參湯洗之蝕於肛者雄黃熏之

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

人參

三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取

六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

噉傷寒喘甘草瀉心湯却妙增參三兩匡彼治瘥成下利甚此醫狐惑探源方

元犀按蟲有情識故能亂有情識之心臟而生疑惑矣蟲為血化之物故仍歸於生血之心方且類聚羣分若有妖妄憑藉而然其實不外本身之血氣以為祟耳此方補虛而化濕熱雜以辛苦之味名曰瀉心意深哉

苦參湯

治狐惑病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目赤下黑下白蝕於上部則聲啞宜此湯蝕於下部則咽乾宜苦參湯洗之蝕於肛者雄黃熏之

雄黃熏法

雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之

噉苦參湯是洗前陰下蝕從下而咽乾熱更深尚有雄黃熏法在肛門蟲蝕亦良箴

元犀按蝕於喉為惑蝕於陰為狐狐惑病乃感風木濕熱之氣而生寒極而死也苦參苦寒氣清屬陽洗之以通陽

道雄黃苦寒氣濁屬陰熏之以通濁道但雄黃稟純陽之色取其陽能勝陰之義也熏洗二法按陰陽分配前後二

陰此又別其陰中之陰陽也二味俱苦寒而燥者苦以瀉火寒以退熱燥以除濕濕熱退而蟲不生矣

赤小豆當歸散

治脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四皆黑若能食者膿已成也此方主之并治先便後血

赤小豆

三升

當歸

十分

右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

噉眼皆赤黑變多般小豆生芽曝令乾豆取三升歸十分杵調漿水日三餐

元犀按此治濕熱侵陰之病大抵濕變為熱則偏重於熱少陰主君火厥陰主風木中見少陰相火病入少陰故見微煩默默但欲卧等證病入厥陰故目赤現出火色目昔黑現出火極似水之色主以赤豆去濕清熱解毒治少陰

微煩默默但欲卧等證病入厥陰故目赤現出火色目昔黑現出火極似水之色主以赤豆去濕清熱解毒治少陰

之病當歸導熱養血治厥陰之病下以漿水以和胃氣與少陰和則為火土合德胃氣與厥陰和則為土木無忤微乎微乎 又按或謂是狐惑病或謂是陰陽毒病然二者皆濕熱蘊毒之病金匱列於二證交界處即是承上起下

升麻驚風湯 治陽毒病面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治此湯主之

升麻二兩 當歸一兩 甘草一兩 蜀椒炒去汗 驚風一兩 雄黃研兩 右六味以水四升煮取一升

頻服之老少再服取汗陰毒去蜀椒雄黃

嗽面赤斑斑咽喉痛毒為陽驚風週圍一指量半兩雄黃升二兩椒歸一兩草同行

元犀按非常災癘之氣從口鼻而入咽喉故陰陽二毒皆咽喉痛也陰陽二證不以寒熱臟腑分之但以面赤斑斑吐膿血其邪著於表者謂之陽面青身痛如被杖其邪隱於表中之裏者為陰

升麻驚風湯去蜀椒雄黃 治陰毒病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治此湯主之

身疼咽痛面皮青陰毒奇邪隸在經別之毒以面不赤而身青不斑紋而痛如被杖即用前方如法服 蜀椒雄黃二物陽毒用之者以陽從陽欲其速散也陰毒去之者恐陰邪不可剋而陰氣反受損也

王晉三云升麻入陽明太陽二經升清逐穢辟百邪解百毒統治溫厲陰陽二病如陽毒為病面赤斑斑如錦紋陰毒為病面青身如被杖咽喉痛無論陰陽二毒皆已入營矣但升麻僅走二經氣分故必佐當歸通絡中之血甘草解

絡中之毒微加驚風守護營神俾椒黃猛劣之品攻毒透表不能亂其神明陰毒去椒黃者太陰主內不能透表恐反動厲毒也肘後千金方陽毒無驚風者不欲其守亦恐留戀厲毒也

金匱方歌括卷二

瘡病方

驚風煎丸 治瘡病以月一日發當十五日愈設不差當月盡解如其不差結為癰瘡名曰瘡母其治法宜此丸主之

驚風分二

烏扇粉散

黃芩三分

柴胡六分

鼠婦三分

乾薑

大黃

桂枝

石膏去毛

厚朴

紫葳散

半夏

金匱方歌括

卷二

瘡病方

四

阿膠

益藥

牡丹皮

蟾蜍五

葶藶

人參路一

瞿麥仁

蜂窠四分

赤硝十二

蛭蟬六分

桃仁二分

右二十三味為末取煨

下灰一斗清酒一斛五升浸灰俟酒盡一半著蠶甲於中者令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心

服七九日三服附千金方用蠶甲十二片又有海藻三分大戟一分無鼠婦赤硝二味

嗽寒熱虛實相來往全憑陰陽為消長天氣半月而更人身之氣亦相仿不則天人氣再更邪行月表可復瘧病

一月不能瘥瘧母結成癥瘕象金匱急治特垂訓蠶甲赤硝十二分方中三分請詳言薑苓扇婦朴葉附威膠桂黃

亦相均相均端令各相奮君不見十二減半六分數紫胡蛭蟬表裏部一分參慈二瞿麥桃仁牡蠣芍藥各五

方中四分獨蜂窠體本輕清質水土另取灶下一斗灰一斛半酒浸另服納蠶甲酒內煮如膠絞汁煎藥丸連古

空心七九日服每服七九一劑加一十一丸老瘧得此效得鼓

尤在逕云天氣十五日一更人之氣亦十五日一更氣更則邪當解也否則三十日天人之氣再更而邪自不能留

矣設更不愈其邪必假血依痰結為癥瘕僻處脇下將成負固不服之勢故宜急治蠶甲煎丸行氣逐血之藥頗多

而不嫌其峻一日三服不嫌其急所謂乘其未集而擊之也王晉三云蠶甲煎丸都用異類靈動之物若水陸若

飛潛升者降者走者伏者咸備焉但恐諸蟲擾亂神明取蠶甲為君守之其泄厥陰破癥瘕之功有非草木所能比

者阿膠達表熄風蠶甲入裏守神蛭蟬動而性升蜂房毒可引下蟻蟲破血鼠婦走氣葶藶泄氣開大黃泄血閉赤

硝軟堅桃仁破結烏扇厥陰相火紫葳破厥陰血結乾薑和陽退寒黃芩和陰退熱和表裏則有柴胡桂枝調榮

衛則有人參白芍厚朴達原却去其邪丹皮入陰提出其熱石膏開上焦之水瞿麥滌下焦之水半夏和胃而通陰

陽灶炆性溫走氣清酒性煖走血統而言之不越厥陰陽明二經之藥故久瘧邪去營衛而著臟腑者即非瘧母亦

可借以截之按金匱惟此丸及薯蕷丸藥言最多皆治正虛邪著久而不去之病非集血氣之藥攻補兼施未易奏

功

白虎加桂枝湯

治溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔此湯主之

知母六兩

石膏一斤

甘草二兩

粳米六合

桂枝三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升

日三服

歌白虎原湯論已詳桂加三兩另名方無寒但熱為溫瘧骨節煩疼嘔又妨白虎湯歌見傷寒歌括

王晉三云內經瘧以先熱後寒邪藏於骨髓者為溫痺二瘧仲景以但熱不寒邪藏於心者為溫瘧論三瘧內經所言是邪之深者仲景所言是邪之淺者也其始補內經之未逮歟治以白虎加桂枝湯方義原在心榮肺衛白虎湯清榮分熱邪加桂枝引領石膏知母上行至肺從衛分泄熱使邪之鬱於表者頃刻致和而瘧已至於內經溫瘧雖未有方然同是少陰之伏邪在手經者為實邪在足經者為虛邪實邪尚不發表而用清降何況虛邪有不顧慮其亡陰者耶臨證之際化而裁之是所望於用之者矣

蜀漆散 治瘧多寒者名曰牡瘧此散主之

蜀漆曉去 雲母曉去 龍骨各等 右三味杵為散未發前以漿水服半錢匕

歌陽為疾阻伏心間牡瘧陰邪自往還蜀漆靈龍平等杵先時漿服不踰開

王晉三云邪氣結伏於心下心陽鬱遏不舒瘧發寒多熱少不可謂其陰寒也主之以蜀漆散通心經之陽開發伏氣而使榮衛調和蜀漆常山苗也苗性輕揚生用能吐雲母在土中蒸地氣上升而為雲故能入陰分逐邪外出於表然邪氣久留心主之宮城恐逐邪涌吐內亂神明故以龍骨鎮心安神則吐法轉為和法矣

附外臺秘要三方

牡蠣湯治牡瘧

牡蠣 麻黃各四 甘草二兩 蜀漆三兩 右四味以水八升先煮麻黃蜀漆去上沫得六升內諸藥煮取

二升溫服一升若吐則勿更服

歌先煮三兩漆四兩麻黃四兩牡蠣二甘後煮良邪鬱胸中須吐越驅寒散結並通陽

犀按瘧多寒者名牡瘧是痰飲填塞胸中阻心陽之氣不得外通故也趙氏云牡蠣與堅消結麻黃非獨散寒且能發越陽氣使通於外結散陽通其病自愈

柴胡去半夏加栝蒌根湯 治瘧病發渴者亦治勞瘧

中風歷節方



柴胡八兩 人參 黃芩 甘草 枳實 芍藥 桂枝 乾薑 細辛 附子 大棗 甘草 枳實 芍藥 桂枝 乾薑 細辛 附子 大棗

者取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

嗽柴胡去夏為傷陰加入薑根四兩珍瘧病渴因邪灼液薑根潤燥可生津

王晉三云正瘧寒熱相間邪發於少陽與傷寒邪發於少陽者稍異內經言夏傷於暑秋傷於風病發時作名曰

寒瘧金匱云瘧脈多弦弦數者風發正於淒愴之水寒久伏於腠理皮膚之間榮先傷而後風傷衛故仲景用柴胡

去半夏而加括萎根其義深且切矣蓋少陽瘧病發渴者由風火內淫劫奪津液而然矣堪半夏性滑利乾薑傷陰

液故去之而加天花粉生津潤燥豈非與正傷寒半表半裏之邪當用半夏和胃而通陰陽者有別乎

柴胡桂薑湯傷寒見治瘧寒多微有熱或但寒不熱一劑如神

者取六升去滓再煎取三升溫服一升日三初服微煩復服汗出便愈 王晉三云夏月暑邪先傷在內之伏陰至

秋復感涼風更傷衛陽其瘧寒多微有熱顯然陰陽互爭故瘧邪從衛氣行陰二十五度內無捍格之狀是榮衛俱

病矣故和其陽即當和其陰用柴胡和少陽之陽即用黃芩和裏用桂枝和太陽之陽即用牡蠣和裏用乾薑和陽

明之陽即用天花粉和裏使以甘草調和陰陽其分兩陽藥獨重柴胡者以正瘧不離乎少陽也陰藥獨重於花粉

者陰虧之瘧以救液為急務也和之得其當故一劑如神 元犀按先賢云瘧病不離少陽少陽居半表半裏之間

邪入與陰爭則寒出與陽爭則熱爭則病作息則病止後其邪仍居於少陽之經愚意外為陽內為陰先寒者邪

欲出其氣干於太陽沖動寒水之氣而作也後熱者以胃為燥土脾為濕土濕從燥化則木亦從其化故為熱為汗

也汗後木邪仍伏於陽明之中應期而發者土主信也蓋久瘧胃虛得補可愈故先君用白朮生薑湯多效

中風歷節方

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者 白朮 防風 桂枝 黃芩 細辛 乾薑 人參 茯苓 當歸

川芎 牡蠣 礬石 桂枝 石十四味枳為散酒服方寸七日一服初服二十日溫酒調服