

胎脉 十八

平人氣象論曰婦人手少陰動甚者任子也○陰陽別論曰陰搏陽別謂之有子○腹中論曰何以知懷子之且生也曰身有病而無邪脉也○脉經曰尺中之脉按之不絕法妊娠也○滑伯仁曰三部脉浮沉正等無他病而不月者妊也

凡婦人懷孕者其血留氣聚胞宮內實故脉必滑數倍常此當然也然有中年受胎及血氣羸弱之婦則脉見細小不數者亦有之但於微弱之中亦必有隱隱滑動之象此正陰搏陽別之謂是卽妊娠之脉有可辨也○又胎孕之脉數勞損之

脉亦數大有相似然損脉之數多兼弦澁胎孕之數必兼和滑此當於幾微中辨其邪氣胃氣之異而再審以證自有顯然可見者

凡辨男女之法自古及今無不以陰陽二字爲綱領然言多矛盾悉屬疑似茲余以坎離之象定之庶得其要蓋坎爲天一之卦坎中滿陽在內也離爲地二之卦離中虛陰在內也得坎象者爲男得離象者爲女所以男脉多沉實沉實者中滿之象女脉多浮虛浮虛者中虛之象無論人之老少強弱脉之部位大小但因象察象無不如響之應然尤於兩尺爲最

也足稱捷法

脉訣云欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分旦來日日午定知生○質疑謂離經之脉卽歇至者是也

啓蒙曰欲產之婦脉離經離經之脉認分明其來小大不調勻或如雀啄屋漏應腰疼腹痛眼生花產在須臾却非病

胎候
十九

巫方氏顱顱經云一月爲胞胎精血凝也二月爲胎形始成胎也三月陽神爲三魂四月陰靈爲七魄五月五形分五臟也六月六律定六腑也七月晴開竅通光明也八月元神具降

真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也
五臟論有耆婆論曰一月如珠露二月如桃花三月男女分四
月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂男能動左
手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足

孫真人曰凡兒在胎一月胚二月胎三月有血脉四月形體成
五月能動六月諸骨具七月毛髮生八月臟腑具九月穀入
胃十月百神備則生矣○生後六十日瞳子成能咳笑應和
人百五十日任脉成能自反覆百八十日髓骨成能獨坐二
百一十日掌骨成能扶伏三百日顛骨成能行也若不能依

期者必有不平之處

巢氏病源論曰妊娠一月名胎胚足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎手心主脉養之當此之時血不流行形象始化未有定儀因感而變欲子端正莊嚴常口談正言身行正事欲子美好宜佩白玉欲子賢能宜看詩書是謂外象而內感者也四月始成其血脉手少陽脉養之五月始成其氣足太陰脉養之六月始成其筋足陽明脉養之七月始成其骨手太陰脉養之八月始成膚革手陽明脉養之九月始成毛髮足少陰脉養之十月五臟六腑關節人神皆

備此其大畧也

陳陰川嘗試推巢氏所論云妊娠脉養之理若足厥陰肝脉也足少陽胆脉也爲一臟一腑表裡之經餘皆如此且四時之令必始於春木故十二經之養始於肝胆所以養胎在一月二月手心主心胞絡脉也手少陽三焦脉也屬火而夏旺所以養胎在三月四月手少陰手太陽乃心脉也以君主之官無爲而尊也足太陰脾脉也足陽明胃脉也屬土而旺長夏所以養胎在五月六月手太陰肺脉也手陽明大腸脉也屬金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脉也屬水而

旺冬所以養胎在九月又况母之腎藏繫於胎是母之真氣
子之所賴也至十月兒於母復之中受足諸臟氣脉所養然
後待時而生此論誠有至理世更有明之者亦未有過於巢
氏之論矣余因述其說

一胎有男女之辨易曰乾道成男坤道成女顓顓經曰三陽所
會則生男三陰所會則生女葛仙翁曰男從父氣女從母氣
聖濟經曰天之德地之氣陰陽之至和流薄於一體因氣而
左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資之則
成女是以胎有男女則成有遲速體有陰陽則懷有向背故

男動在三月陽性早也女動在五月陰性遲也女胎背母而懷故母之腹軟男胎面母而懷故母之腹鞭此皆得理之談所當察也至若褚氏以精血之先後言男女道藏經以二日三日五日得者爲男等說總屬億度渺茫非有確見也余不敢遵信故別有微論列于嗣類

安胎 二十

凡妊娠胎氣不安者證本非一治亦不同蓋胎氣不安必有所因或虛或實或寒或熱皆能爲胎氣之病去其所病便是安胎之法故安胎之方不可執亦不可泥其月數但當隨證隨

經因其病而藥之乃爲至善若謂白朮黃芩乃安胎之聖藥
執而用之鮮不誤矣

胎氣有寒而不安者其證或吞酸吐酸或嘔惡脹滿或喜熱
畏涼或下寒泄瀉或脉多沉細或絕無火證而胎有不安者
皆屬陽虛寒證但溫其中而胎自安矣宜用溫胃飲理陰煎
之類加減主之亦當以平素之藏氣察其何如酌而用之

胎氣有熱而不安者其證必多煩熱或渴或躁或上下不清
或漏血溺赤或六脉滑數等證宜涼胎飲保陰煎之類主之
○若但熱無虛者如枳壳湯一母丸黃芩散之類皆可擇用

之類主之○若脾腎氣虛而兼帶濁者宜秘元煎兔絲煎之類主之○若多嘔惡者當隨前證前方各加二陳湯之類以和之○凡治虛證貴在隨機應變誠有不可以鑿執言者

胎氣有實滯氣滯凡爲惡阻爲脹滿而不安者惟其素本不虛而或多鬱滯者乃有之但察其所由而開之導之諸治實者固無難也○嘔吐不止者二陳湯加枳壳砂仁主之或用人參橘皮湯亦妙○食滯脹滿不安者小和中飲加減主之○肝氣滯逆脹滿不安者解肝煎主之○怒動肝氣兼火者化肝煎主之○脾肺氣滯上攻作痛者紫蘇飲主之○氣滯

兼痰者四七湯二陳湯加當歸主之○氣滯兼火爲脹爲煩者枳殼湯束胎丸之類主之

一王節齋曰調理妊婦在於清熱養血白朮補脾爲安胎君藥條實黃芩爲安胎聖藥清熱故也暑月宜加用之此一說者雖若有理而實有大病不可不辨也夫孕之胎氣必隨母之藏氣大都陰虛者多熱氣陽虛者多寒氣寒之則寒熱之則熱者是爲平氣今以十人言之則寒者居其三熱者居其三平者居其四此大較也若謂受胎之後必增內熱白與常人不同則何以治惡阻者必用二陳六君生薑半夏之屬而後

效其果增熱否乎故治熱宜黃芩寒則不宜也非惟寒者不
宜卽平氣者亦不宜蓋凡今之胎婦氣實者少氣虛者多氣
虛則陽虛而再用黃芩有卽受其損而病者有用時雖或未
覺而陰損胎元暗殘母氣以致產婦羸困或兒多脾病者多
由乎此奈今人不能察理但以聖藥二字認爲胎家必用之
藥無論人之陰陽強弱凡屬安胎無不用之其害蓋不少矣
至若白朮雖善安胎然或用不得善則其性燥而氣閉故凡
陰虛者非可獨用氣滯者亦當權宜是以用藥之難當如盤
珠有不可膠柱而鼓瑟也

立齋曰妊娠若元氣不實發熱倦怠或胎氣不安用當歸散因
氣惱加枳壳胸膈痞悶再加蘇梗或作痛加柴胡○若飲食
不甘或欲嘔吐用六君加紫蘇枳壳○若惡阻嘔逆頭眩體
倦用參橘散未應用六君子湯○若惡阻嘔吐不食煩悶亦
用參橘散之類○若頓仆胎動腹痛下血用膠艾湯未應用
八珍加膠艾○若頓仆毒藥腰痛短氣用阿膠散未應煎送
知母丸○若頓仆胎傷下血腹痛用佛手散未應用八珍送
知母丸○若心驚胆怯煩悶不安名子煩用竹葉湯未應血
虛佐以四物氣虛佐以四君○若下血不止名胎漏血虛用

一黃散血去多用八珍湯未應用補中益氣湯○若因事而

動下血用枳壳湯加生熟地黃未應或作瘰更加當歸血不

止八珍加膠艾○若不時作痛或小腹重墜名胎痛用地黃

當歸湯未應加參朮陳皮或因脾氣虛用四君加歸地中氣

虛用補中益氣湯○若面目虛浮肢體如水氣名子腫則全

生白朮散未應用六君子湯下部腫甚用補中益氣倍加茯苓

苓○或因飲食失宜嘔吐泄瀉此是脾胃虧損用六君子湯

○若足指發腫漸至腿膝喘悶不安或足指縫出水名水氣

用天仙藤散脾胃虛弱兼以四君子未應用補中益氣兼以

逍遙散○若胎氣上攻心腹脹滿作痛名子懸用紫蘇飲飲
食不甘兼四君子內熱晡熱兼逍遙散○若小便澀少或成
淋瀝名子淋用安營散不應兼八珍湯腿足轉筋而小便不
利急用八味丸緩則不救○若項強筋攣語澹痰盛名子癇
用羚羊角散○或飲食停滯腹脹嘔吐此是脾胃虛弱而不
能消化用六君子湯不應用平胃散加參苓○或胎作脹或
脹作痛此是脾胃氣虛不能承載用安胎飲加升麻白朮不
應用補中益氣湯○或臍腹作脹或小便淋閉此是脾胃氣
虛胎壓尿胞用四物加二陳參朮空心服後探吐藥出氣定

又服又吐數次必安○或因勞役所傷或食煎炒小便帶血
此是血得熱而流於胞中宜清膀胱用逍遙散○或遺尿不
禁或爲頻數此是肝火血熱用加味逍遙散○若胸滿腹脹
小便不通遍身浮腫名胎水不利用鯉魚湯脾胃虛佐以四
君子○病名同而形證異形證異而病名同聊見本方凡用
見證之藥不應常分月經治之

徐東臯曰胎有不安而腰疼腹痛甚則至於下墜者未必不由
氣血虛無所營養而使之然也夫胎之在腹如果之在枝枝
枯則果落固理之自然婦人性偏恣慾火動於中亦能致胎

不安而有墮者大抵不外乎屬虛屬火二者之間清熱養血
之治盡之矣此外有二因動胎者又不可不知也有因母病
動胎者但療母病則胎自穩有因觸傷動胎者當以安胎藥
二三劑而胎自安

安胎論外方

茯苓丸

婦三九
溫胃安胎

黃芪湯

婦九
氣虛胎動

七味阿膠散

婦入
胎動腹痛

太山磐石散

婦三

千金保孕丸

婦三六

良方白朮散

婦十一
胎熱

三味白朮湯

婦十二
胎熱心痛

益母地黃湯

婦十七
墮胎腹痛