

5294

46-3<10

陳修園醫書五十種
十



醫學從衆錄卷五

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石參訂

隔症反胃

膈者。阻隔不通。不能納穀之謂也。又謂之隔食。病在胸膈之間也。上焦出胃上口主納。中焦並胃中主腐化。下焦別迴腸主濟泌。此症三焦失職。百無一生。丹溪指爲胃脘乾枯。以四物湯入牛羊乳竹瀝韭汁之類主之。薛氏指爲怫鬱傷肝。肝木尅土。以左金丸逍遙散。六君子湯。歸脾湯。六味丸。八味丸之類。隨症間服。易思蘭本此法以治氣膈。晨吞八味丸百粒。暮服暢衛湯。開導其上。滋補其下。多效。趙氏以此病多得之五旬以上。腎水既乾。陽火偏盛。煎熬津液。三陽熱結。則前後閉澇。下既不通。必反於上。直犯清道。上冲吸門。須以六味丸料大劑煎飲。久服可挽十中之一二。然以余觀之。隔症既成。終無治法。問曰。既無治法。豈真坐視其亡耶。

修園曰。卽欲服藥。亦不過盡人事而已。吾鄉老醫某。只守程氏啓膈飲一湯。始服頗效。久亦增病。然而痰火鬱氣阻逆於上者。亦藉爲引導也。己任篇專取陽明。以左歸飲加生地當歸。亦所以開賁門。此門開則能納食幽門。此門開則小便利闌門。此門開則大便潤之法也。此數方之意。皆仿於仲景大半夏湯用甘瀾蜜水之法。而不知仲景取半夏以升降陰陽。藉人參以重生津液。復得蜜之滋潤。灌溉流通。而阻隔之患乃免。程氏以半夏耗液爲禁。豈知

仲景麥門冬湯及此方之微旨哉。

張石頑云。古人指噎膈爲津液乾枯。故水液可行。乾物梗塞。爲枯在上焦。余竊疑之。若果津液枯槁。何以食纔下咽。涎隨上湧乎。故知膈咽之間。交通之氣。不得降者。皆衝脈上行逆氣所作也。惟氣逆。故水液不得居潤下之常。隨氣逆湧耳。若以津枯而用潤下之劑。豈不反益其邪乎。宜六君子湯加減。挾寒脈遲細者。加肉桂附子。挾熱脈數滑者。加枳實黃連。若噎而聲不出者。加五味子竹茹。喉中有一塊食物不下者。痰氣也。加海石訶子。膈間作痛。多是瘀血。加歸尾桃仁韭汁童便。甚者加大黃微利之。千金五噎丸。五膈丸。亦可擇用。

按張石頑主於衝脈上逆。誠千古灼見。亦從仲景大半夏湯悟出。然必謂潤下之劑。反益其邪。是因其涎沫之多。而狃於見症之陋習也。衝脈不治。取之陽明。故仲景以半夏降衝脈之逆。卽以白蜜潤陽明之燥。加人參以生旣亡之津液。石頑此論。得其半而遺其半也。蓋人之胃中。疊積如膏脂者。謂之胃陰。今因衝氣上逆。口嘔出粘涎。卽日亡其胃陰。尙得謂滋潤之劑。宜屏絕乎。余所以不敢阿好也。

人鏡經曰。內經云。三陽結謂之隔。蓋足太陽膀胱經水道不行。手太陽小腸經津液枯涸。足陽明胃經燥糞結聚。所以飲食拒而不入。縱入太倉。還出喉嚨。人之腸胃。一日一便。乃常度也。今隔食之人。五七日不便。陳物不去。新物不納。俗醫強分爲五膈十噎。支

按此法雖偏。而百無一生之症。急用之。尙有餘望。否則逡巡觀望。何濟於事。

血張在石
膈頑阻云
滯有氣陽
道虛而不
成能者統
用運抵嘔
當逆丸便
作祕芥用
子人大參
吞大二黃
錢附但子
飲攻熱之
湯卽及通
食椒療

有蠱
癰輒
血呃
也者

陽虛與
血虛亦
能反胃
也

診脈

浮緩而滑。

沉緩而長。

治皆可

弦濇短小。

治為難

大半夏湯

方見金匱

啓膈飲

方見易實

三一承氣湯

方見時方

按久病與羸敗之人。前方未免太峻。余用麻仁丸。及高鼓峯新方代之。高鼓峯悟王損菴治隔用大黃之妙。融會一方。頗為穩當。方用熟地五錢。當歸白芍桃仁麻仁各三錢。微微潤之。其形體如常。即以前方內加大黃一二錢。以助血藥。

加減左歸飲。

經云腎乃胃之關。關門不利。升降息矣。關門即氣交。中天之樞也。故腎旺則胃陰充。胃陰充則能食。

己任篇曰。隔症。一陽明盡之。予治荆溪潘爾修之隔。用左歸飲去茯苓加生地當歸。兩大劑而便潤。食進。又十劑而兩便如常。飲食復舊。蓋以有左歸飲中甘草。則直走陽明。以和其中。且當歸生地合用。則能清胃火以生其陰。胃陰上濟。則賁門寬展。故飲食能進。胃陰下達。則幽門闌門皆滋潤。故二便如常。去茯苓者。恐其分流入坎。不若專顧陽明之效速也。

和中暢衛湯。

紫蘇梗

五分

香附

醋炒

神麴

炒

沙參

錢各一

桔梗

連翹

去各六分

木香

四分

蒼朮

撫

芎

貝母

各八分

砂仁

三分

生薑

三片

水煎服。

易思蘭自註云。香附蘇梗。開竅行氣。蒼朮健中。貝母開鬱痰。連翹散六經之火。撫芎



發肝木之困。神麴行脾之鬱。木香逐氣流行。桔梗升提肺氣。沙參助正氣而不助火。此方提上焦之火邪。乃火鬱發之之義也。然徒用此方。而不兼補下之藥。雖能解散於一時。其火無水制。必然復生。而痞滿噎隔之疾。恐尤甚於前也。

愚按。內經云。隔塞閉絕。上下不通。則暴憂之病也。可見此病多起於鬱結不舒。胃氣不能敷布所致。張雞峰所謂神思間病是也。方中雖是解鬱套藥。而分兩多寡。氣味配合。似有獨得之妙。又與八味丸間服。所以多效。喻嘉言資液救焚湯。與八味丸間服。亦是此意。但救焚湯大涼大降。流於奇險。不如此湯之平易近人也。

五噎丸。金千

治胸中久寒。嘔逆妨食。結氣不消。

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

北細辛

各一兩

人參

白朮

各二兩

橘皮

茯苓

各五兩

錢附子

一枚

右為細末。

煉蜜丸。桐子大。酒服十五丸。日三服。漸加至三十丸。

五膈丸。金千

治飲食不得下。手足冷。上氣喘息。

麥門冬

三兩

甘草

二兩

蜀椒

炒去汗

遠志肉

桂心

細辛

乾薑

炮各一兩


附子

一枚人

參

二兩

右為細末。煉白蜜丸。彈子大。先食噙一丸。細細嚥之。喉中胸尚熱。藥丸稍盡。再噙一丸。日三夜二服。七日愈。



張石頑曰。二丸同用。參附椒辛薑桂之類。一以肝氣上逆。胃氣不下而嘔噎。故用黃橘以疎肝降逆。苓朮以健脾通津。一以腎氣不蒸。肺胃枯槁而不納。故用冬草以滋肺和胃。遠志以補火生土。又嘔噎而藥食可進者。頻與小丸調之。膈塞而飲食不納者。時用大丸噙之。其立法之詳若此。可不辨而忽諸。

吳茱萸湯

傷方見寒

理中湯丸

傷方見寒

連理丸

加理中丸黃連

八味丸

時方見

又攷隔食反胃及嘔吐粒米不入之症。多係七情不遂。激動其氣。氣亂載血上逆。菴積於中。胃氣阻隔。用生鵝血乘熱飲之。取其生氣未離。以血攻血。直透關鑰。引宿積之瘀一涌而出。而胸脅豁然。此法詳於蘇東坡瑣錄。前輩金淳還公。卽韓慕廬東坦。俱已驗效。推之生鴨血生黃牛血亦可用。

西洋藥酒方

錦囊秘授

治隔食翻胃。一切痢疾水瀉等症。立驗。

紅荳蔻

去殼

肉荳蔻

麵紙包

裹煨用粗

鹽去油

白荳蔻

去殼

高良薑

切片

甜肉桂

去皮

公丁香

各研

末淨

戲淨

准分五

先用上白冰糖四兩。水一飯碗。入銅鍋內煎化。再入雞子清二個。煎十餘沸。入好燒酒一觔。離火置穩便處。將藥末入銅鍋內打勻。以火點著燒酒片刻。隨卽蓋鍋火滅。用紗羅濾去渣。入磁瓶內。用冷水去火氣。隨量少飲之。
繆仲淳祕傳膈噎膏。

人參濃汁 人乳 牛乳 梨汁 蔗汁 蘆根汁 龍眼濃汁
右七味各等分。加薑汁少許。隔湯熬成膏子。下煉蜜徐徐頻服之。其效如仙丹。
貝母糖酒方。

好陳酒 一觔 冰糖 十兩 貝母 去心 砂仁 木香 陳皮 錢各二

右咀片入磁瓶內。箬葉紮緊。上放米一撮。煮以米熟爲度。每日清晨服一大杯。
糖薑餅。

用糖坊內上好糖糟 一觔 生薑 四兩 先將糖糟打爛。和薑再搗做小餅。晒乾放磁

瓶內。置竈烟櫃上。每日清晨將餅一枚泡滾水內。少停飲湯。

八汁湯。治噎食。

生藕汁 生薑汁 雪梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁 白菓汁 蜂蜜 竹瀝

右各一盞和勻。飯上蒸熟。任意食。

牛羊人乳汁。治翻胃膈氣。此證必起於腸枯血燥。大便三四日一次。糞如馬栗。若如

羊屎者不治。口常吐白沫者不治。

牛乳 羊乳 人乳 不拘分兩。總宜常服。爲生血潤腸之妙藥。

瘧症

瘧疾不離少陽。少陽爲半表半裏。邪居表裏之界。入與陰爭則寒。出與陽爭則熱。爭則

病作。息則病止。止後其邪仍據於少陽之經。淺則一日一作。深則二日一作。更深則三日一作。雖有別經。總以少陽爲主。故仲景以弦字該本症之脈。蓋於治法只一小柴胡湯。熱多煩渴。加知母花粉。寒多身疼。加乾薑桂枝治之。得法一二服可愈。朱丹溪云。無汗要有汗。散邪爲主。帶補正有汗要無汗。補正爲主。帶散邪。大抵於小柴胡湯中無汗。麻黃可加二錢。卽三解湯意也。有汗桂枝酒芍可各加二錢。卽柴胡桂枝湯意也。如三五作不休。卽於前方加常山三錢。一服卽愈。俗謂常山截瘧。用之太早。則截住邪氣。而成他病。不知常山祛痰涌吐。從陰達陽之藥。正所以鼓邪氣外出。何截之有。余每合川山甲金銀花三味。取其通達經絡。又以人參當歸白朮何首烏之類。擇用一二兩爲君。於瘧未出時服之多愈。至於方書分定名色。多歧反惑。而所應別者。如單寒無熱爲牡瘧。宜理中湯理陰煎加柴胡主之。單熱無寒爲瘧瘧。或先熱後寒爲熱瘧。宜白虎湯加桂枝主之。勞役肌飽過度爲勞瘧。宜補中益氣湯加柴胡主之。受山嵐瘴氣爲瘧瘧。宜霍香正氣散平胃散加柴胡主之。久瘧心腹有塊者。名瘧母。以鼈甲飲主之。只此數症。略宜分別。究亦不離少陽一經也。若瘧痢交作。只以小柴胡湯疎少陽之氣。則陷者自舉。加花粉三錢。滋陽明之液。則滯者自通。或卽以此湯送香連丸一錢五分。挾虛者以補中益氣湯倍柴胡。煎送香連丸二錢。此薛立齋先生之心法也。

小柴胡湯。

方見傷寒

男元厚

按凡服治瘧藥宜瘧未至前三時服或煎兩服一服於瘧期五鼓時服留一

服於瘧未至前二時服最妙凡治瘧藥古法必露一宿以瘧爲暑邪暑氣得露而

消也又近醫以初瘧忌用人參白朮茯苓此說本之嵩崖尊生余雖不滿亦當從

衆今卽照嵩崖去人參加青皮一錢五分寒多加乾薑桂枝各二錢熱多加知

母花粉各二錢或加黃連石膏本方去人參加常山草果知母檳榔川貝母各二

錢名清中驅瘧飲大意以無痰不成瘧此方爲治瘧之總方也然亦多效

鼈甲飲

鼈甲三錢 醋炙 白朮炒 黃耆 川芎 酒白芍 檳榔 草果煨 厚朴 陳皮 甘草各

生薑三片 棗肉三枚 烏梅一枚 水煎服

又有久瘧流連不愈及三陰瘧三日一作者當分五藏之虛而施溫補宜以景岳何人

飲休瘧飲常服瘧作之期或加少陽藥一二味及常山川山甲附子金銀花之類以通

經絡或用人參一兩生薑一兩濃煎服之此不截之截法也家貧者以冬白朮一二兩

代之血虛者以當歸一兩代之

瘧雖有五藏之分而久瘧證治法只以補脾爲主蓋以土爲萬物之母五藏六府皆受

蔭焉況瘧爲少陽之邪戊己之土久受甲木之尅扶弱抑強之法權實操於醫者宜於

六君子湯四君子湯補中益氣湯諸方加之意焉



何人飲。

何首烏

鐵一兩 或兩生用

人參

或二三錢

陳皮

者一二錢 虛

煨生薑

錢二三

水煎服。

休癰飲。

何首烏

四兩 或二兩

人參

錢二三

白朮

炒三錢

當歸

三錢

炙甘草

一錢

陰陽水煎服。

又久癰不愈。

必求之腎。

如腎水不足。

熱多者。

以六味丸。

加味主之。

腎火不足。

寒多者。

以

八味丸。

加味主之。

高鼓峰醫案云。

余治一人。

三陰癰。

不愈。

令吞八味丸。

服人參養榮湯。

冬至日。

再加附子一錢。

至半夜汗出而愈。

汗出者陽回之兆亦邪解之徵也

瘡疾脈象

瘡脈自弦。

浮弦表邪。

沉弦裏邪。

洪弦屬熱。

遲弦屬寒。

滑弦食積。

久瘡

之脈。

微細虛弱。

漸緩則愈。

瘡疾脈象

瘡脈自弦。

浮弦表邪。

沉弦裏邪。

洪弦屬熱。

遲弦屬寒。

滑弦食積。

久瘡

之脈。

微細虛弱。

漸緩則愈。

雄黃龜酒方。

治三日久瘡神妙。

用活大烏龜一箇。

連殼左右肩各攢一孔。

以明雄黃六錢。

研細末。

每孔糝入三錢。

外以磁黃泥包固。

勿令泄氣。

炭火上煨存性。

研細末。

服即止。

香圓雄黃散。

種福堂

陳香圓一個。

去頂皮。

大者。

每隻加透明雄黃三錢。

研細末。

糝入香圓內。

炭火中煨存

性。

研細末。

每服一錢。

空心陳酒送下。

二三

服。

即止。

香圓雄黃散。

種福堂

陳香圓一個。

去頂皮。

大者。

每隻加透明雄黃三錢。

研細末。

糝入香圓內。

炭火中煨存

性。

研細末。

每服一錢。

空心陳酒送下。

二三

服。

即止。

香圓雄黃散。

種福堂

陳香圓一個。

去頂皮。

大者。

每隻加透明雄黃三錢。

研細末。

糝入香圓內。

炭火中煨存

性。

研細末。

服即止。

香圓雄黃散。

種福堂

陳香圓一個。

去頂皮。

大者。

每隻加透明雄黃三錢。

研細末。

糝入香圓內。

炭火中煨存

性。

研細末。

每服一錢。

空心陳酒送下。

二三

服。

即止。

香圓雄黃散。

種福堂

陳香圓一個。

去頂皮。

大者。

性。再研極細末。每服七分。用軟腐衣作六七包好咽下。此日不可喫湯水。任其嘔去頑痰。

斑猫截瘡丹。種福堂

斑猫 巴豆肉 硃砂各一錢 麝香 二分 雄黃五錢 蟾酥 五分

右用黑棗三枚。搗丸如菉豆大。貼眉心一周時。揭下投長流水中。

常山草菓散。種福堂

常山 草菓 川烏 草烏 陳皮 甘草各一錢

用絹袋盛貯。聞於鼻間。瘡即

止。不必煎服。

椒雄貼臍丸。種福堂

胡椒 雄精

右二味等分研末。將飯研爛爲丸。如桐子大。外以硃砂爲衣。將一丸放在臍中。外以

膏藥貼上。瘡即止。

尤薑烏棗丸。種福堂

白朮 一斤 生薑 一斤搗出汁并白朮渣晒乾

右爲細末。將黑棗一斤。煮爛去皮核爲丸。

桂麝椒雄膏。種福堂

治虛寒瘡。孕婦忌貼。



桂心 一分 麝香 三釐 雄黃 七釐 川椒 七枚

共研極細末納臍中外以膏藥貼之。

葶薺燒酒。堂種福

治不論雙單瘡。

用大葶薺將好燒酒自春浸至秋間。如瘡至不貪飲食。食則脹滿不下者。每日服葶薺兩個。三日即愈。

痢症

王損菴云。痢症不外溼熱二字。所受不外陽明一經。陽明爲多氣多血之府。溼陰邪也。溼勝於熱。則傷陽明氣分。而爲白痢。熱陽邪也。熱勝於溼。則傷陽明血分。而爲赤痢。溼熱俱盛。則爲赤白俱見。初病即以芍藥湯主之。大意以行血則膿血自愈。調氣則後重自除。眞百發百中之奇方也。若發熱頭痛。脈浮而緊。是風寒鬱而不解。內陷而爲痢。宜以人參敗毒散。鼓之外出。苟得微汗。其痢自鬆。若徒用痢門套藥。殺人不少。大抵痢症漸久漸虛。而用藥亦宜漸補漸調。四君子湯。六君子湯。四物湯。補中益氣湯之類。煎送香連丸。是薛立齋先生治法。余遵用甚效。

芍藥湯。

時方見

治痢初起。腹痛裏急後重者。

小便短澀者。加滑石二錢。澤瀉錢半。腹痛者。加砂仁一錢。

滯澀難出者。加當歸

白芍各錢半。甚者加大黃一錢。若食積者。加山楂三枚。

白痢者。加陳皮砂仁茯苓各一錢。紅痢者。加川芎桃仁各一錢。

紅白相雜者。加川芎桃仁以理血滑石

陳皮蒼朮以理氣。如嘔吐食不下者。加黑梔蓮子去殼三錢。倉米三錢。入生薑汁一滴。緩緩呷之。以瀉胃口之熱濕。

人參敗毒散 時方見

加味平胃散。

蒼朮 二錢

陳皮

甘草 各一錢

厚朴 五分

猪苓

黃芩

澤瀉 各一錢

乾薑 五分

白芍

三錢

陳倉米 錢五

水煎服。

色紅去乾薑。加當歸三錢。黃連一錢。

香連丸 時方見

張景岳謂痢症是夏月畏熱貪涼。過傷生冷。至大火西流。新涼得氣。則伏陰內動。應時而為下痢。初起宜抑扶煎。佐關煎。溫藥以調之。導之久痢。用胃關煎。溫補命門真火。以扶脾土。則痢自止。景岳此說雖偏。不可盡信。而陰藏之人。素多寒病。一有不慎。即患此症。不可不知。余每於此症初起。察其脈遲而細。手足俱冷。腹痛而裏急後重者。以乾薑二錢。附子一錢。吳萸一錢。當歸三錢。炙甘草一錢。大黃白芍各一錢。五分溫通之久痢。每以八味丸與補中益氣湯間服收功。粟殼訶子赤石脂肉豆蔻兜瀉之藥。不可早服。久痢亦不可廢。又噤口痢。乃胃中濕熱之毒。薰蒸清道而上。以致胃口閉塞。而成噤口之證。亦有誤服



瀉熱之藥。而邪氣停於胃口者。用人參石蓮子等分。煎服強呷。但得一口下咽。虛熱即開。更以二味爲末。頻頻服之。種福堂用五穀蟲三錢。微炒研末。以米湯送下。又休息痢。流連年餘不愈。愈而又作。是兜瀉太早。餘邪未淨。宜巴豆仁一錢。研去油淨。當歸一兩。萊菔子五錢。炒。同研爲末。以冬蜜爲丸。如桐子大。每空心以開水送下。三九至七丸。以竭其餘邪。自愈。

張石頑曰。血色鮮紫濃厚者。屬熱。若瘀晦稀淡如瑪瑙色者。爲陽虛不能制陰而下。非溫理其氣。則血不清。理氣如爐冶分金。最爲捷法。設不知此。概行疎利之法。使五液盡隨寒降而下。安望有甯止之日哉。

以伏龍肝二兩。取其溫煖土臟。煎湯代水。黃參朮苓草薑桂等藥。多取奇效。

五色痢。是精氣受傷。五液不守之患。宜益火消陰。實脾隄水。兼分理其精氣。卽噤口不食者。亦不出此法。

又曰。丹溪治噤口痢。多用石蓮子。今此物眞者絕無。余常用藕汁煮熟。稍加糖霜頻服。兼進多年陳米稀糜。調其胃氣取效。此卽石蓮子之意也。

又曰。休息痢。服補中益氣數劑不應。反下鮮紫血塊者。此久風成飧泄。風氣通於肝。肝傷不能藏血也。三奇散倍防風。加羌葛升麻。其一切利水破氣藥。皆爲切禁。

三奇散。治痢後下重。

枳殼生防風各一兩黃耆二兩為散。每服二錢。米飲下。

伏龍肝湯丸。治胎前下痢。產後不止。

炮黑山查肉一兩熬焦黑糖二兩二味一半為丸。一半為末。用伏龍肝二兩。煎湯

代水。煎末二錢。送前丸二錢。日三夜二服。一晝夜令盡。氣虛。加人參二三錢。以駕馭之。虛熱。加炮薑肉桂茯苓甘草。兼感風寒。加葱白香豉。膈氣不舒。磨沉香汁數匙調服。

羊脂煎。金治久痢不痊。

羊脂子一大蠟子二黃連升末一酢取七合煎蜜取七合烏梅肉二兩亂髮燒炭末洗去垢

右七味。合內沙鍋中湯上煎之。攪可丸。飲服如桐子大三十丸。日三服。

張石頑曰。羊脂性滑利。千金方用治久痢不瘥。專取滑利。以通虛中留滯也。其後且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥方。深得炎帝本經補中寓瀉之意。

生死症及脉法

身不熱者輕。身熱者重。發熱不休者死。能食者輕。不能食者重。絕食者死。

發嘔者死。直腸自下者死。久痢忽大下結糞者死。小兒出痘後即發痢者死。

婦人新產即發痢者死。瀦為血少。尺微厥逆。滑大主積。浮弦急死。沉細無

害。



痢疾續論

次男

元厚

按近傳治痢有三禁。一曰發汗。蓋以下利一傷其津液。發汗再傷其津液。

津液去則胃氣空。而下出之濁氣。隨汗勢而上入胃中。遂成脹滿難治。二曰利水。蓋

以痢疾裏急後重。滯痛難忍。若前陰過利。而後陰愈瀉。而積滯之物欲下甚難。三曰

溫補。蓋以痢為濕熱所傷。得溫則以火濟火。恐致腐腸莫救。得補則截住邪氣。多致

流連難愈。此三者時醫傳受之心法也。然亦有不可泥者。醫學真傳曰。凡痢疾初起。

發熱不休。非肌表有邪。即經絡不和。溫散而調營衛。外邪一解。其痢自鬆。若概以為

熱。開手即用寒涼。多有陷入變劇者不少。故喻嘉言所謂下痢必從汗。先解其外。後

調其內。首用辛涼以解其表。次用苦寒以清其裏。一二劑愈矣。用治痢之方再

表者。外邪但從裏出。不死不休。故雖百日之遠。仍用逆流挽舟之法。引其邪而出之。

於外。則死症可活。危症可安。人參敗毒散主之。服後逼其暫時燥熱頓此可見發汗

是治痢之要法也。又喻嘉言有急開支河一法。謂熱邪之在裏者。奔逼於大腸。必鬱

於膀胱。膀胱結熱。則氣不化而小便短赤。不可用逆挽。宜從其小便而順導之。然而

水出高原。尤宜用辛涼之藥。清肺之化源。金匱有下利肺痛者。紫參湯主之。通因氣

利。訶黎勒散主之。通以下瀉液消宿食破結氣亦見利水非古人之所忌也。至於

溫補法。詳於景岳全書。如佐關抑扶二煎。非溫劑乎。胃關煎非補劑乎。雖矯枉之說。