

亥23  
17-24

王氏潛齋醫書五種

三



南京中医药大学图书馆版权所有

## 小引

余承世業幼讀醫書而閱歷三十年愈覺斯道之難精竊謂宋元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齋張會卿趙養葵李士材之派則其尤甚者也國朝一切著述莫不邁越前古醫林自喻氏崛起之後羣賢迭出於斯爲盛然張路玉精於論溫而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡以治瘧雖尺有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好爲穿鑿黃坤載陳修園之博而偏於溫燥坐而言則可起而行則礙以吳鞠通之明而混疫於溫致招章虛谷之議更不知霍亂有寒熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由述也余讀其書神交數載幸一葷復蒙寄示回春醫案二卷展繹之餘益信其抱有誠有爲有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言可以起而行不愧爲一代之名家今春來越視櫛里王姓之證始得把臂快慰平生賞奇析疑別昞妙悟翻恨相見太遲致余聞道之晚也且知尙有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶未梓行余不敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎

王氏醫案續編卷四

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

山陰陳

坤載安續編

丁未春。金朗然令堂。陡吐狂血。肢冷自汗。孟英切脈弦澀。察血紫黯。乃肝鬱凝瘀也。證雖可愈。復發難瘳。予丹參丹皮茺蔚旋覆苓梔柏葉鬱金海蛇之方。覆杯果愈。然不能懲。忿踰二年。復吐竟不起。張孟臯少府令堂。年踰古稀。患氣逆。殿屎煩躁不寐。孟英切脈滑實。且便闊面赤。舌絳痰多。以承氣湯下之霍然。踰年以他疾終。

王致青。齡尹令正。患痰喘。胡某進補腎納氣及二陳三子諸方。證瀕於危。顧昇庵參軍令延孟英診之。脈沈而澀。體冷自汗。宛似虛脫之證。惟二便不通。脘悶苔膩。是痰熱爲補藥所遏。一身之氣機。窒痹而不行也。與蔓荊旋赭杏貝梔蔻兜鈴海蛤竹瀝等以開降。覆杯卽減。再服而安。

王匯涵。室年踰六旬。久患痰嗽。食減形消。夜不能眠。寢汗舌絳。廣服補劑。病日以增。孟英視之曰。固虛證之當補者。想未分經辨證。而囫圠顛預。翻與證悖。是以無功。投以熟地。蓴蓉。坎板。胡桃。百合。石英。茯苓。冬蟲夏草等藥。一劑知。旬日愈。以其左脈弦細而虛。右尺寸皆數爲陰虧。氣不潛納之候。及閱前服方。果雜用者尤以助氣。二陳故紙附桂等以劫陰也。宜乎愈補而愈劇矣。

張篤百之室患感。連服溫散。繼邀顧聽泉診之。云有驟變。須延孟英商治。渠不之信。旬日後。倏然昏厥。當寅正至辰初。不甦。病者之兄吳次歐。速孟英視之。脈伏而弦滑。與大劑犀羚姑貝知母花粉元參銀花調局方。至寶丹灌下。卽安。

趙子循患喉癆。叔笛樓用大劑生軍下之。而藥不能入。孟英以錫類散吹之。卽開。與白虎法而瘥。王雪山令媳患心悸眩暈。廣服補劑。初若甚效。繼乃日劇。時時出汗。肢冷息微。氣逆欲脫。灌以參湯。稍有把握。延踰半載。大費不貲。莊芝階舍人令延孟英診。視脈沈弦且滑。舌絳而有黃膩之苔。口苦溲熱。汎事仍行。病屬痰熱。轉輶誤補。則氣機壅塞。與大劑清熱滌痰藥吞。當歸龍鬚丸服之。漸以向安。仲夏卽受孕。次年二月誕一子。惜其娠後停藥。去疾未盡。娩後復患悸暈不眠。氣短不饑。或作產後血虛治不效。仍請孟英視之。脈極滑數。曰病根未刈也。與蠲痰清氣法果應。

許子雙令堂梁宜人。仲春之杪。偶患微感。醫與溫散。熱已漸退。孟英偶過診。右寸脈促數不調。因謂子雙曰。此風溫證。其誤表乎。恐有驟變。渠復質之前醫。以爲妄論。仍用溫燥。越二日。卽見鼾睡。再延孟英診之。此證雖經仲景指出。而人多不識。往往囁嚅亂投卒。要斬睡而死。醫家病家兩俱茫然。孟英此案可爲仲景之功臣矣。

吸食鴉片之  
人津液素虧  
感受溫邪較  
平入倍重非  
此標本并治  
之劑必不救  
矣

姚某年未三旬。煙癮甚大。適伊母溫病而歿。勞瘵悲哀之際。吸受溫邪。脇痛筋掣。氣逆痰多。熱壯神昏。縮自汗。醫皆束手。所親徐麗生囑其速孟英診之。脈見芤數。舌絳無津。有陰虛陽越。熱熾液枯之隙。況初發卽爾。其根蒂之不堅可知。與犀羚元參知母壯水息風。蔻蓉棟實鼠矢石英潛陽鎮逆沙參麥冬石斛。歲麌益氣充津花粉梔子銀花絲瓜絡蠲痰清熱一劑知四劑安。隨以大劑養陰而愈。

周光遠無疾而逝。其母夫人年踰七旬。遭此慘痛。漸生欬嗽。氣逆痰鹹。夜多旋溺。口苦不饑。孟英曰。根尋虛而兼怫鬱也。與沙參甘草麥冬熟地龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安。迨夏間吸暑而患腹痛滯下。小溲熱澀。其嗽復作。脈仍虛弦略加更數。但於前方增滑石。吞香連丸而瘳。因平昔畏藥。既愈卽停。至仲秋。嗽又作。惟口不苦而能食。因於前方去沙參。加高麗參五味石英牛膝熬膏。頻服而痊。十月下旬。天氣驟冷。陡患吐瀉腹痛。肢冷音嘶。急邀孟英視之。脈微爲寒邪直中。亟與大劑理中。加吳萸橘皮杜仲故紙石脂餘糧而瘥。其夫人亦因悲鬱而患崩漏。面黃腹脹。寢食皆廢。孟英用龜板海螵蛸女貞旱蓮貝母柏葉青蒿白薇小麥茯苓藕肉蓮子心而康。次年夏。其母夫人患溫邪。嗽。脘悶汗多。孟英投石膏竹茹知母花粉旋覆貝母蔓仁紫苑等藥三十劑而愈。聞者無不歎異。

胡季權令正許子雙之女弟也。初於乙巳患乳房結核。外科雜投溫補。核漸增而疼脹日甚。馴致形消汎

此因不兼外邪故加五味牛膝等藥徑固其本若少兼外邪者斷不可用

憇。夜熱減餐。骨瘻於牀。孟英診曰。鬱損情懷。徒補奚益。初以蠲痰開鬱之劑。吞當歸龍鬚丸。痛脹遞減。熱退能餐。月事乃行。改投虎潛加減法。服半年餘而起。凡前後計用川貝母七八斤。他藥稱是。今春因哭母悲哀。陡然發厥。與甘麥大棗加龍牡龜鼈磁硃金箔龍眼而安。

脈至細數則陰竭陽亢不拘何病均忌此脉而虛勞為尤甚

王小谷體厚善飲。偶患氣逆。多醫咸從虛治。漸至一身盡腫。酷肖回春錄所載康副轉之證。因懇治於孟英。脈甚細數。舌絳無津。間有譏語。乃真陰欲匱外候。雖較輕於康。然不能收續矣。再四求疏方。與西洋參元參二地二冬。知母花粉姑貝竹瀝慈鬚等藥。三劑而囊腫全消。舉家忻幸。孟英以脈象依然堅辭不肯承手。尋果不起。

溫散惟宜於傷寒。何可亂投。且既已見於肺胃之熱。則肺胃之熱已現於外矣。與柴胡湯。直是不通。何干涉此。

朱敦書令愛患病。醫授溫散。服二劑遍身麻痺。汎事適來。醫進小柴胡湯。遂狂妄莫制。乞援於孟英。脈至洪滑弦數。目赤苔黃。大渴不寐。是瘻因溫邪而發。所以起病至今。時時大汗。何必再攻其表。汎行為熱迫於營。胡反以薑棗溫之。參柴升之。宜其燎原而不可遏也。與大劑犀角元參生地石膏知母花粉銀花竹葉貝母白薇以清衛涼營。服後卽眠。久而未醒。或疑為昏沈也。屢為呼喚。病者驚寤。卽令家人啟籩易服。穿鞋梳髮。告別父母。云欲往花神廟歸位。人莫能攔。舉家痛哭。急迓孟英復視。脈象依然。囑其家靜守勿哭。仍以前方加重。和以竹瀝童。灌下卽安。繼用養陰清熱而愈。

瞿穎山仲媳許培之妹也。患舌糜。沈悅亭知其素稟陰虧。虛火之上炎也。與清涼滋降之法。及硃黃等敷藥而不愈。乃兄延孟英往視。舌心糜腐黃厚。邊尖俱已無皮。湯飲入口。痛不可當。此服藥所不能愈者。令將錫類散摻之。果卽霍然。或疑喉藥治舌。何以敏捷如斯。孟英曰。此散擅生肌蝕腐之長。不但喉舌之相近者可以借用。苟能隅反。未可言聲。責用者之善悟耳。且糜腐厚膩不僅陰虛。要須識此。自知其故。

高祿卿室吳濂仲之妹也。孟夏分婉發熱。初疑蒸乳。數日不退。產科治之。知挾溫邪。進以清解。而大便溏泄。遂改溫燥。其泄不減。另招張某視之。因謂專科誤用薑仁所致。與參耆薑朮鹿角肉果等藥。泄瀉愈甚。連服之。熱壯神昏。汗出不止。勢瀕於危。醞香孝廉徐夫人病者之從母也。心慈似佛。有子十人。皆已出聞其殆。夤夜命四郎季眉。請援於孟英。按脈洪數七至。口渴苔黃。洞漏如火。小溲不行。因謂季眉曰。病猶可治。第藥太驚人。未必敢服。季眉堅欲求方。且云在此監服。乃疏白頭翁湯加石膏犀角銀花。知母花粉竹葉。梔棟桑葉。與之次日復診。脈證較減。仍用前方。而病家羣譁。以爲產後最忌寒涼。況洞泄數日乎。仍招張某商之。張謂幸我屢投溫補在前。否則昨藥下。嘔頃刻亡陽。復定者尤之。方業已煎矣。所親張芷舟孝廉聞之。飛告於醞香處。汾伯昆季卽馳至病家。幸未入口。奪盞傾之。索孟英方。煎而督灌。且囑羣季輪流守視。免致再投別藥。孟英感其情誼。快舒所長。大劑涼解。服至七劑。漏全止。熱盡退。乃去。白頭翁湯加生

方達古法並  
不驚人特體  
立齋景岳書  
手狃於溫補  
如此真不能  
不歸咎於景  
岳立齋諸公  
者見之未免  
吃驚耳  
不意浙省  
立齋景岳書  
手狃於溫補  
如此真不能  
不歸咎於景  
岳立齋諸公

地元參姑貝服半月始解黑色燥矢而眠食漸安第府藏之邪雖已清滌而從前溫補將熱邪壅滯於膜絡之間者復發數癰於胸乳之間孟英令其恪守前法復入蒲公英絲瓜絡橘葉菊葉等藥服至百劑始告全愈而天癸亦至孟英曰世俗泥於產後宜溫之謬說況兼泄瀉即使溫補而死病家不怨醫者無憾也或具雙眼誰其信之此證苟非汾伯昆仲篤信於平時而力排衆論於危難之間余雖見到不疑亦惡能有濟耶余嘗曰病不易識尤不易患醫不易薦尤不易任藥不易用尤不易服誠宇宙間第一難事也而世人淡視之可不悲哉

趙秋船進士去秋患左半不遂伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才主清熱蠲痰治之未能速效邀孟英診之脈甚遲緩苔極黃膩便祕多言令於藥中和入竹瀝一椀且以龍蒼滾痰二丸相間而投二丸各用斤許證始向愈今春出房眠食已復而素嗜厚味不戒肥甘孟夏其病陡發孟英診之脈形滑駛如蛇斷其不起秋初果歿

吳澤門年踰花甲素患脘痛以爲虛寒輒服溫補久而益劇孟英診曰肝火宜清彼不之信延至仲夏形已消瘦倏然浮腫脇背刺痛氣逆不眠心辣如焚善噴畏熱大便時瀉飲食下嚥卽吐諸醫束手乃懇治於孟英脈弦軟而數與竹茹黃連枇杷葉知母梔棟旋赭等藥而吐止飲食雖進各恙未已投大劑沙參

雖之體相合  
但與附根攝  
不點切方乃  
急則治標之  
法次方乃順  
及根本亦不  
論之次第也

生地。龜板。鱉甲。女貞。旱蓮。桑葉。丹皮。銀花。茅根。姑貝。知柏。枇杷葉。菊花等藥。出入爲方。二三十劑後。周身發疥瘡而腫漸消。右耳出粘稠膿水而漏止。此諸經之伏熱。得以宣泄也。仍以此藥令其久服。迨秋始愈。冬間能出門矣。

比邱尼心能體厚踰蹠。偶患眩悸。醫以爲虛。久服溫補。漸至發腫不饑。仲夏延孟英視之。脈甚絃滑。舌色光絳。主清痰熱。盡撤補藥。彼不之信。仍服八味等方。至季夏再屈孟英診之。脈數七至。眠食虧廢。不可救藥矣。果及秋而茶毗。

金葉仙大令病。其媳割股以進。因無效也。悲哀欲絕。遂發熱。胡某治以傷寒藥。而神迷自汗。驚惕畏冷。改換補藥。乃氣逆不進水穀矣。孟英視之。七情有傷。痰因火迫。堵塞空靈之所也。與沙參元參丹參丹皮茯苓麥冬連翹竹茹竹葉蓮心小麥。加以川貝母一兩。投之數劑而瘥。

李竹虛令郎。初秋患感。醫聞便泄而止之。乃至目赤。譫妄舌絳苔黃。洩澀善嘔。粒米不能下咽。孟英先與犀角石膏。竹葉。竹茹。枇杷葉。茅根。知母。花粉。梔子。以清之。嘔止神清。熱亦漸緩。繼以承氣湯加減。三下黑矢。黃苔始退。卽能啜粥。以其右關尺遲緩有力。故知有燥矢也。續投甘涼調理而痊。

宋養之令弟。媳初患目赤。服藥後漸至滿面紅腫壯熱。神昏。醫者束手。孟英切脈。洪實滑數。舌絳大渴。腹

微脹以酒洗大黃犀角元參滑石甘草知母花粉銀花黃芩連翹薄荷菊花丹皮兩下之徑愈。

都城售透土長壽丹極言其功之大能治諸疾而價甚廉人皆喜之孟英謂勿論其所用何藥哉一方以療百病無此治法況以稟賦不齊證因有別勸人切勿輕嘗況以綠豆湯爲引必有熱毒之品在內不可不慎也繼而張孟阜少府餌之患疽廣寧亭司馬服之咽爛孟英投多劑甘寒而愈王雪山久患下部畏冷吞未百丸齒痛目赤諸恙蜂起孟英察脈絃滑與多劑石膏藥兼以當歸龍鬚丸頻服新疾既瘳腿亦漸溫令其常飲柿餅湯以杜將來之恙伊弟患腹脹而喜服溫補久而不效孟英曰濕熱也宜清化彼不信因服透土丹初頗應已而血大溢始得悔悟志此數則以爲世之好服奇藥者戒。

廣孔愚司馬之公子仲秋患閒瘡寒少熱多面目甚黃苔膩大渴腹脹溺赤仍能納穀且素嗜肥甘不能撙節孟英按其脈滑實而數與承氣加知芩半貝翹連滑石石膏大腹花粉之類二十餘劑而始愈是膏梁挾暑濕熱之治也。

王瘦石稟屬陰虧卒聞驚嚇之聲而氣逆肢冷自汗息微速孟英視之身面皆青綠之色脈沉絃而細乃素傷憂慮而風陽陡動也與牡蠣四兩鼈甲二兩蛤殼一兩石英五錢龍齒小麥辰砂麥冬茯神貝母竹茹爲方一劑知二劑已續以滋養而瘳

凡陰虛之體不足以養肝則肝陽易逆養陰開鬱入治法無錄入治法乎應手

體證雖多不  
外肺胃二經  
權熱得其主  
腦尚非難愈  
之體

陳書伯庶常令弟保和年未冠患失音咽痛孟英與犀羚石膏元參豆根牛蒡射干等大劑清肅之藥音開而咽糜吹以錫類散糜愈而疹點滿布左目及耳後皆腫方中加以鮮菊葉二兩疹愈瘍痏不已仍去心悸谷嘔壯熱煩躁脈弦濶微急舌苔白厚脉沉滑而緩此身寒虛也乃以真武湯加玄参芍藥桂枝甘草半夏白朮白芍葛根白朮投之外吹錫類散咽愈熱退續用二至一冬生地石英蔻蓉龜板茯苓滋陰潛陽而瘳又其二女亦患喉疹汎事適行四肢痠痛略難舉動氣塞於咽孟英診脈絃滑以犀羚旋赭茹貝兜鈴牛蒡射干豆根花粉銀花海蛇竹瀝絲瓜絡等出入爲方兼吹錫類散而瘥

吳爾純八月下旬患滯下腹痛異常伊外祖許仲廉延孟英往診形瘦脈數而絃口渴音微渴澀乃陰分極虛肝陽熾盛伏暑爲痢治法不但與寒痢迥異卽與他人之伏暑成痢者亦當分別用藥也與白頭翁湯加知母花粉銀花丹皮金鉛延胡沙參芩連服之次日復視痢減音開而右腹疼痛拒按爲加冬瓜子烏藥鼠矢三劑而消滯下亦愈惟薄暮火升面赤自汗重加介類潛陽而瘳

此溫勝於熱  
其傷勝故不以  
之是溫也

先與清營通胃藥二劑。熱退舌淡而脈證依然。加以酒洗大黃。省頭草。卽下堅黑燥矢甚多。而睡減啜粥。繼以涼潤。旬日而痊。

陳春湖令郎子莊。體素弱。季秋患腹痛。自汗肢冷。息微。咸謂元虛欲脫。孟英診之。脈雖沉伏難尋。而苔色黃膩。口乾渴。赤當從證也。與連朴棟梔元胡蠶砂。省頭草等藥而康。次年患感。復誤死於補。又夏醯泉延孟英視錢姫腹痛欲絕。證因見絃滑之脈。與當歸龍鬚丸而安。

朱湘槎令媳。患小溲澀痛。醫與滻利反發。熱頭疼。不飢口渴。夜不成眠。孟英診之。脈細數。乃陰虛肝鬱化熱。生風津液已爍。豈容再利。與白薇梔子金鈴知母花粉紫苑麥冬石斛菊花服之卽愈。其姪新泉之室懷娠患病。醫投溫燥止澀。腹痛甚。而發偏身黃。飲食不思。孟英視之。暑濕也。與芩連銀花芽根桑葉梔桔竹葉茵陳冬瓜皮而愈。

吳醞香大令仲媳。汎愆而崩之後。脫痛發厥。自汗肢冷。孟英診之。細而絃滑。口苦便澀。乃素體多痰。風陽內鼓。雖當崩後。病不在血。與旋赭羚姑枳貝薤蛤殼爲方。痛乃漸下。厥亦止。再加金鈴延胡。旋蘆。鼠矢。葉蟬甲。竹瀝。吞當歸龍鬚丸。息風陽以滌痰。熟果數劑而安。然平時喜服補藥。或有眩暉。不知爲風痰內

凡藥中用碌  
砂者宜另研  
入煎劑不可同

動益疑爲元氣大虛。孟英嘗諫阻之。而彼不能從。至次年季春。因傷感而狂證陡發。毀器登高。更甚於昔。孟英視之。苔黑大渴。與前方加真珠牛黃服之。苔色轉黃。絃滑之脈略減。而狂莫可制。改以石膏朱砂。入煎劑。落菖蒲青黛。知母。膽星。鼈甲。金鉛。旋覆。元參。竹瀝。爲大劑。送礞石滾痰丸四服而平。繼而脚氣大發。腹痛便祕。上衝於心。肢冷汗出。昏暈欲厥。與連棟梔茹小麥百合旋貝元胡烏藥雪羹石英鼠矢草柏稊等藥。而安。

徐氏婦懷妊患痢。醫投溫補。胸腹痛極。昏厥。咽糜。水飲礙下。孟英診之。脈洪數。舌絳燥。亟吹錫類散灌以犀角。元參。海蛇姑。貝梔。苑知斛。豆根。射干。銀花。棟實。諸藥胎下已朽。咽腹之疾隨愈。續用甘涼清熱存津調之。

許培之令祖母。年踰七旬。久患淋漏。屢發風斑。孟英持其脈。絃而滑。舌絳口乾。每以犀角生地。二至芩蒿白薇。元參。龜板。海螵之類。息其暴。甘露飲增損調其常。人皆疑藥過涼。孟英曰。量體裁衣。稟屬陽旺。氣血有餘。察其脈色。治當如是。病者乃云。十餘年前偶患崩而廣服溫補。遂成此恙。始知先天陽氣雖充。亦由藥釀爲病。秋杪患寒熱如瘧。善怒不眠。苦渴易飢。不能納食。孟英察脈。絃數倍常。與清肺蠲痰柔肝充液之法漸以向安。今冬有薦吳古年診治者。詢知病原。作高年脫營論。而以血脫益氣裁方。初服三四劑。飲

食驟增。舉家忻幸。已而血漏甚多。眠食欲廢。復延孟英視之。仍主前議。果得漸康。

王天成牙行一婦。年五十餘初。患左目赤。漸至發熱。醫投溫散。便泄而厥。進以補劑。少腹宿瘕攻痛。勢極危殆。丐孟英診之。脈甚絃。舌絳而渴。與蔻蔻橘核當歸元胡龜板石英螺蛸茯苓梔棟萸連數服而安。踰年以他病卒。

何新之令愛適湯氏。孟冬分娩。次日便漏一次。卽發熱痙厥。譖語昏狂。舉家惶惶。乃翁邀孟英審之。脈絃滑。惡露仍行。曰此胎前伏暑。乘新產血虛。瘀滯而發也。與大劑犀羚元參竹葉知母花粉梔棟銀花。投偏身得赤疹。而逕止神清。乃翁隨以清肅調之而愈。

胡秋穀令愛。年甫笄。往歲患眩暈。孟英切其脈。滑作痰治。服一二劑未愈。更醫謂虛。進以補藥。頗效。渠信爲實。然今冬復病。徑服補藥。半月後。眠食皆廢。聞聲驚惕。寒顫自汗。肢冷如冰。以爲久虛欲脫。乞援於孟英。脈極細數。目赤便祕。胸下痞塞。如杵。力辨其非虛證。蓋痰飲爲患。乍補每若相安。具雙眼者。始不爲病所欺也。投以旋赭姑貝蛤殼花粉桑梔蘿蔔連枳等藥。數服卽安。而暈不能止。乃去赭薤蘿枳加元參菊花。二至三甲之類。服匝月。始能起榻。

汪氏婦。自孟秋患痢之後。大解溏泄未愈。已而懷娠。恐其墮也。投補不輟。延至仲冬。兩目赤障。滿遮氣逆。

漢火爲患。人常居八九而醫書所載皆治寒疾。投之法。大開治熱。謂獨標繼義。不可謂之法。真可

有是謂。則有是藥。拘拘於產後之元虛。此明醫之所以異於庸醫也。

礙眠脫疼拒按痰嗽不食苦渴無濕。扁孟英診之脈甚滑數。曰此溫補所釀之疾也。夫秋閒滯下原屬暑濕熱爲病。既失清解逗留而爲泄。受孕以來業經四月。慮其墮而補益峻。將肺胃下行之令皆挽以逆升。是以胸次堵塞而疼痛。不能臥。又恐其上喘下泄而脫也。補之愈力。治節盡廢。溲閉不饑。濁氣壅至。清竅兩目之所以蒙障而瞽也。與沙參蛤殼枇杷葉。冬瓜子。海石。旋覆蘇子。杏仁。黃連枳實。海螵黃芩。梔子。重加貝母。服二劑。卽知饑下暢。目能睹物矣。

黃履吉患痛吐。孟英已爲治愈。仲冬復發。他醫藥之。已七日不進穀矣。二便祕澀。形肉速消。再詣孟英。之與旋赭姑芩萸連柿蒂棟實延胡等藥一劑。知三劑愈。

許仲筠患腹痛不饑。醫與參朮薑附諸藥。疼脹日加。水飲不沾。沈沈如寐。孟英診脈。絃細苔色黃膩。投以枳朴萸連梔棟香附蒺藜延胡等藥。二劑便行脈起。苔退知飢而愈。

畢方來室。患痰嗽礙眠。醫與補攝而至涕淚全無。目閉不饑。二便澀滯。乾嗽無痰。氣逆自汗。孟英切脈。右寸沉滑。左手細數。而絃乃高年陰虧。溫邪在肺。未經清化。率爲補藥所綑。宜開其痹而通其胃。與裏薤紫苑。兜鈴。杏貝。冬瓜子。甘桔。旋姑之劑。而安踰一年。以他疾終。

賴炳也。令堂年近古稀。患左半不遂。醫與再造丸暨補劑服。二旬病如故。孟英按脈。絃緩而滑。額赤苔黃。七

音微舌蹇便澀無痰曰此痰中也伏而未化與犀羚姑貝菖夏花粉知母白薇豆卷桑枝絲瓜絡等藥服三劑而苔化音漸清朗六七劑腿知痛痰漸吐便亦通既而腿痛難忍其熱如焰孟英令塗葱蜜以吸其熱痛果漸止半月後眠食漸安二旬外手能握月餘可扶掖以行矣

胡季權令郎珍官右額偶發紫斑一塊時當季冬孟英與犀角石膏涼解之藥二三帖後始發熱斑漸透犀角服二十帖始撤素有目疾餘熱復從目發令以石膏藥久服居然漸愈且能食肌充略無他患聞者莫不異之

趙春山司馬向患痰嗽。自秋仲以來屢發寒熱。吳古年從伏暑化瘧治頗為應手。而一旬半月之後病必復至。延至季冬。董蘭癡齋尹囑其質於孟英。按脈滑數舌絳苔黃渴飲溲赤動則喘逆夜不成眠痰多畏冷。自問不能起矣。孟英曰無恐也。不過膏粱釀痰溫補助熱是爲病根。迨夏吸暑邪互相轉轄。秋半而發勢頗類瘧。古年雖識其證。惜手段小耳。因與羚羊豆豉連翹薄荷知母花粉竹茹貝母旋覆海蛇元參梔子省頭草梨汁等藥服五劑。熱退不畏冷去前四味加沙參麥冬葳蕤杷葉漸能安寐。各恙遞減。再生地服匝月而體健勝昔。登高不喘。司馬云余昔曾服參茸大補之藥而陽痿。今服君方而沉疴頓起。乃知藥貴對證不貴補也。

王氏醫案續編卷五 原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

武進董介穀蘭初續輯

戊申元旦。陳秋槎參軍。大便驟下。黑血數升。繼卽大吐鮮紅之血。而汗出神昏肢冷。搐搦燥亂。妄言。速孟英至。舉家跪泣救命。察其脈。左手如無。右絃曳。按之數以六十八歲之年。僉慮其脫。參湯煎就。將欲灌之。孟英急止勿服。曰。高年陰分久虧。肝血大去。而風陽陡動。殆由忿怒兼服熱藥所致耶。其夫人云。日本頗有鬱怒。熱藥則未服也。惟冬閒久服薑棗湯。且飲都中藥燒酒一餅耳。孟英曰。是矣。以西洋參犀角生地銀花綠豆梔子元參茯苓羚羊茅根爲劑。衝入熱童漫灌之外。以燒鐵淬醋令吸其氣。龍牡研粉撲汗。生附子搗貼涌泉穴。引納浮陽。兩服血止。左脈漸起。又加以龜板鼈甲服三帖。神氣始清。各恙漸息。稍能啜粥。乃去犀羚加麥。冬天冬女。貞旱。投之。眠食日安。半月後始解黑燥矢。兩旬外便溺之色皆正。與滋補藥調痊。仍充撫轄巡捕。屢繹如常。秋間赴任紹興。已酉秋以他疾終。

姚令輿室素患喘嗽。而病春溫。醫知其本元久虧。投以溫補。瘡神昏。耳聾。譖語面青舌絳。痰喘不眠。皆束手矣。延孟英診之。脈猶絃滑。曰。證雖危險。生機未絕。遽爾輕棄。毋乃太忍。與犀角羚羊元參沙參知母花粉石膏。以清熱息風。救陰生液。佐從蓉石英鼈甲金鈴旋覆貝母竹瀝。以潛陽鎮逆。通絡蠲痰三劑而