

跌打損傷

回生第一
仙丹附後

瘡症門

瘡瘍門

楊梅結毒門

魚口便毒門

瘰癧門

醫西方易簡

卷拾

癰疽門

漆瘡門

疥瘡門

肺經疽毒門

腸癰懸癰門

癰疽發背等症門



增訂醫方易簡卷十

跌打損傷

跌打還魂丸 專治男女跌打損傷及在高樓高樹上失
足墜地不省人事牙關緊閉急用一丸錐爛開熱雙蒸
酒一盃和童便一盃用鐵剪竅開牙關灌入仰面待藥
下咽片時便活必須着數人貼身按定傷人恐其還魂
時翻動致傷腸臟症重者服四五丸輕者三四丸即愈
或婦人因傷胎動加五月艾汁一盃和藥服之即愈
今將各藥開列於後

田七

錢五
血竭

三錢
五分

川連

二錢

血餘

二錢

無名異

七分

石脂

二錢
五分

紅花

甘
明

第七

可的
兒

用不

片

煉滴水成珠取出攪勻藥末力搗干搥如不開卽下米

飲搗至合式每丸濕重四錢晒乾合式晒一日後加珠

兩生七碟

白花

蟛蜞草

四兩

共搗爛晒乾為末下在跌打藥處攪成膏丸

跌打藥

專治男女跌打傷眼血貫瞳人腫起用此藥敷

之川連

錢一

生地

兩三

扁柏葉

兩二

冰片粒

分二

其追爛用

蛋白二個調勻放火上燻半熟敷眼上令再換便愈

跌打藥

專治男女跌打損傷一概將此藥煎服或症重

者執雙劑同煎服之便愈

甘草

錢一

木通

錢一

續斷

錢三

紅花

錢一

花粉

錢二

歸尾

錢二

生地

桃仁

錢一

蘇木

錢二

桂枝

錢二

乳香

錢二

沒藥

錢五

赤芍

錢二

地骨皮

錢二

酒壹杯

錢二

水三碗

煎至八分

再加

山羊血

錢八

牛黃

田七

錢二

血珀

錢一

共為末

冲藥服

倘症重者

再加

牛黃

五珍珠末

分三年壯者加

大黃

錢三朴硝

分五

跌打損傷方

四川提督軍門某昔得秘方治跌打損傷

極效雖重傷頻死但有一絲之氣者立甦前任福建副

將軍時軍中有二弁相鬪皆至重傷其一則死矣馳往

視之其一惟心頭有氣尙微煖亟命以葯灌之覺胸間

喀喀有聲不移時張目索食翌日遂能起行自後屢著

神效其方或於重陽日或於十一月採野菊花連枝葉

陰乾每用菊花一兩加童便無灰酒各一碗同煎熱服

跌打損傷氣絕

凡跌打損傷氣絕不能言者急以菲汁

和童便灌之

或昏迷不省人事者用



蘇木錢二白蘇皮錢二細木耳錢二俱放瓦上焙焦色木耳更要焦為妙共為細末黃酒同黑糖調服服後將酒飲醉避風睡一宿即愈

跌打內傷 凡跌打內傷並閃挫風氣一切疼痛立效

當歸錢二通草錢一桃仁錢二川山甲錢二茜草錢一川桂枝錢一

五分杜仲錢二自然銅錢三醋服錢三淮牛膝錢一製大黃錢二朱砂錢一

皮錢一骨碎補錢二去毛錢二甘草錢一血竭錢二乳香錢二沒藥錢二白

芷錢一紅花錢一蘇子錢一降香錢一三七錢一地鱉虫錢二

米店內錢三石南枝頭錢三共煎湯加童便一酒盃溫服極重

二服可愈今改為末子藥如遇病不重者只需每服吃



末子五錢外加鹽便一杯老酒一杯送下輕者三服重者仍照前方煎服

跌打損傷

取淨土蒸熱以布裹更換熨之勿太熱

恐破

又方夾棍傷

凡傷手指者用

皂礬

水四五

碗砂鍋內熬滾將手薰洗良久即活血止疼不致潰爛

熬水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭惡不可聞

又方青松毛不拘多少同陳酒糟搗爛敷患處

又方榆樹皮搗爛醋調敷患處

又方生梔子末白麩以水調敷

又方損傷青腫生豆腐切片貼之如青腫不散以葱

白搗爛炒熱敷傷處冷再易之

又方 爛席草蒲扇燒灰冲酒服童便引

又方 凡一切跌打損傷遍身青腫凝停作痛及墮仆肉

傷一服即愈

白木耳

四兩黑者亦可

焙為細末每服一兩用

蘇油三匙和好酒調服日服三次葯完痊愈

此方係

那督憲蒞浙頒刻印示傳佈以惠民皆效

跌打損傷新舊皆治

羌活

獨活

血竭

枳殼

破

故紙

歸尾

白芷

自然銅

沉香

杜仲

小茴

大茴

丹皮

紅花

桃仁

麥冬

五瓜皮

鬱金

三七

甘草

各一錢紹酒溫服

又方 凡跌打損傷無論新舊上中下

當歸_{錢三} 川芎_{錢三}

母丁香

{錢三} 乳香{錢五} 三七_{錢二} 烏藥_{錢二}

西木香_{錢三} 續斷_{錢三} 秦_錢

芎

骨碎補_{錢三} 淮山藥_{錢二} 血竭_{錢二} 肉桂_{錢三} 杜仲_{錢五} 小茴_錢

香

{錢三} 甘草{錢一} 生地_{錢三} 青皮_{錢三} 麝香_{分一} 薏苡仁_{錢三}

共為細末每用紹酒調服二三錢

又敷藥方

皂殼_{錢三} 生地黃_{錢三} 大黃_{錢二} 豆粉炒黃將上藥

共為細末用醋調敷

損傷久不愈 冬瓜仁炒研末酒沖服

跌打損傷並年久損傷敷藥方

生川烏 生草烏 生南星 生半夏 北芥子 黃



京子 生枝子計少 北細辛 乳香 沒藥

共為細末用麵粉式文以燒酒燉熟調勻敷患處而接
骨先將斷處抖擻然後用雄鷄一隻同芋蔴蕘和葯連
毛骨將活鷄入春共為衝碎乘熱敷上內用包皮紙半
刀外用布扎緊二三日其病如常

跌打神效仙方 大田七二錢五分 沒藥一錢五分 大桃仁三錢

打牛膝三錢 白芷二錢 錦軍三錢 丹皮一錢五分 蘇木三錢 黃柏一錢 白

茯苓三錢 紅花二錢 木香一錢 研生地三錢 桂枝一錢 乳香一錢

如頭傷加川芎 肚傷加腹皮 腰傷加杜仲 胸傷加桔梗
酒水各半煎服將渣敷患處其效如神此方經驗多人



曾見被打撲傷重週身瘀黑不省人事奄奄頻死者煎服一二次別日即能行動也

跌撲傷筋

韭菜搗爛敷之

頭面跌傷

生半夏

芙蓉葉

等為末紹酒白蜜調敷

眼睛跌出

活猪身上封肉一小塊趁熱貼上少頃納入

打傷眼睛

生猪肉一片以當歸赤石脂二味研末摻肉

上貼之拔出瘀血眼即無恙

面目傷腫

眼目打傷青腫以生半夏末水調塗即愈

腫痛

牛膝放入口中嚼爛敷患處二三次其腫自消

跌打及墻壁壓傷

川蘇

分一

木香

分二

紅花

分三

甘草

分四



右研末黃酒送下均生用

打傷方

白蠟

一兩 藤黃

三錢

入蔴油溶化塗傷處立愈此方

止痛止血及湯火傷皆妙

打傷危急

松節

一斤

入鍋內炒起青烟爲度用黃酒二觔

入鍋內一滾卽去渣半熱灌之

一切傷損急救方

不拘金木百器手足及驢馬咬傷等

類見血敷上卽封口止痛

生半夏松香或黃或壓去

油各等分爲末敷傷處

騎驛馬兩股打傷

鷄蛋清攤作膏貼之

內傷久發

凡跌撲碎傷胸脇腰肋等處並肩挑負重失



右研末黃酒送下均生用

打傷方

白蠟

一兩

藤黃

三錢

入蔴油溶化塗傷處立愈此方

止痛止血及湯火傷皆妙

打傷危急

松節

一斤

入鍋內炒起青烟爲度用黃酒二觔

入鍋內一滾卽去渣半熱灌之

一切傷損急救方

不拘金木石器手足及驢馬咬傷等

類見血敷上卽封口止痛

生半夏松香或黃或壓去

油各等分爲末敷傷處

騎驛馬兩股打傷

雞蛋清攤作膏貼之

內傷久發

凡跌撲碎傷胸脇腰肋等處並肩挑負重失



中國藥學大學圖書館藏

足跽筋初時不覺久至經年累月忽然疼痛浮面按之
不痛擎重方覺或咳嗽吸氣牽掣引痛此乃內傷氣逆
血滯日久恐患癰毒 生大黃一兩只可烘勿火焙炒以老薑二
搗和滾水一杯絞汁隔湯燉溫調大黃末如膏塗於痛
處不必畱頭蓋以粗紙外用棉繫之一日一換三日卽
愈如傷三五年者亦效此方比閃肭膏功勝十倍

墜車落馬筋骨痛

元胡索末好酒服二錢日進二次卽愈

車碾及墜馬傷 服熱小便一碗立愈極驗

墜樓墜馬損壞手足 真酥油一杯沖酒一壺儘量飲醉

卽睡蓋厚被出汗睡醒筋骨自合痛亦自止冬月用火烘熱被再蓋

從高墜下及墜馬傷

取淨土和醋蒸熱布包熨之痛卽止

從高墜下瘀血沖心欲死

挾開其口以熱小便灌之

墜馬瘀血

地黃五斤搗碎置鍋中熬乾以無灰酒一斗

五升入藥飲之卽散

傷瘀脹喘

凡金傷壓傷墜傷瘀血在內胸腹脹滿喘促

氣短諸狀

當歸二兩大黃二兩爲末每服二錢不拘時候

童便和黃酒調服

墜撲損傷瘀血在內煩悶

蒲黃研末空心溫酒服三錢

重物壓傷

凡手足肩背被重物打傷或青腫紫赤瘀痕

疼痛不致內傷以

蘇木煎汁磨真降香塗之不可落

水連擦數日其腫自散

又外治方以

虎膽草搗爛擦之即愈

杖傷

急飲童便一碗外用熱豆腐鋪在傷處其氣如蒸

豆腐漸成紫色再換豆腐鋪之須得紫散盡轉淡紅為

又方

木耳

四兩

淨砂鍋炒焦存性

忌鐵器

為末每服五錢好

酒調下服後坐少時候藥力行至傷處從肉裏往外透

如針刺癢甚不時流血水即其效也

凡臨杖預服四

五錢則減痛不致重傷

又方 黃蜡香油同熬敷之

杖瘡

川大黃

兩一

加上冰片

二分

另研俱為末和勻涼水調

如糊攤杖處即時止痛一日後換膏藥貼之

或加甘

草

兩一

如青腫用濕棉紙鋪傷處以燒過酒糟搗爛厚

鋪紙上良久痛處如蟻行熱氣上升即散

或大黃末

醋調塗之更妙

又方攤藥

大黃

白芷

生半夏

各七錢

共為末以鮮薑

汁調敷乾即再敷以黑處血紅為度則換貼膏藥神效

閃挫腰痛

神麴

一塊如拳頭大

燒過紅淬紹酒三大碗飲之即愈

閃腰挫氣

用番葡萄乾

兩一

好酒煎服重者兩三服即愈

跌打損傷

跌打損傷

