

全
醫
要
略
鴻
詒

中



南京中医药大学图书馆所有

漢張仲景先生金匱要略廣註中卷

李彥珥臣註

張之堅介山

錢塘

弟彭新章叅門人施昇猷允大

張子馬存父

張于祐世仍

同學

顧澄扶搖

評

侄

瑞龍紫函

肺痿肺癰咳嗽上氣病脉證治第七

心主血肺主氣血爲榮氣爲衛其大槩也然經云藏真高干肺以行榮衛陰陽則肺主衛而未嘗不兼主榮也經又云肺惡寒形寒飲冷則傷



南京中医药大学图书馆版权所有

肺。然肺屬金而畏火。則肺又未嘗不惡熱也。故
肺液脫而爲痿。肺葉腐而爲癰。脈數而虛。爲瘧。
數而實。爲癰。肺中冷。多涎唾。爲痿。熱之所過。血
結癰。膿爲癰。至于痿之或咳或不咳。癰之先爲
咳逆。此痿與癰之所由分也。然肺病又有咳嗽
上氣者。經云。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。
邪氣以從其所合也。其寒飲食入胃。從肺脉上
至于肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則
爲肺咳。雖五藏六府。皆令人咳。然皆聚于胃。關

于肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也。

潘碩甫先生曰。痰與癰皆熱在上焦。其脉皆數。皆咳。亡津液。未有異也。但痰屬肺氣虛。雖有熱而不烈。雖亡津液。不至燥涸。雖咳。而口中尙有濁唾涎沫。雖客熱亦不至腐爲膿血。故脉雖數而虛也。癰則氣壅邪實而熱烈。故津液亡而更覺乾涸。口中辟辟燥欬。卽胸中隱痛。津液既涸。脈應滯滯而反滑數者。蓄熱腐膿脉。且數實也。問曰。熱在上焦者。因咳爲肺痰。肺痰之病。從何得之。師

日或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難
又被快藥下利重亡津液故得之曰寸口脉數其人欬
口中反有濁唾涎沫者何師曰爲肺痿之病若口中辟
辟燥欬卽胸中隱隱痛脈反滑數此爲肺癰欬唾膿血
經云天氣通于肺天處高而必有雨露以爲潤澤肺
主氣而必有津液以爲滋榮若旣從汗出嘔吐消渴
小便利數便難快藥下利是重亡津液此肺痿受病
之因也脉數者經云數則爲熱又云數則爲虛以肺
居上焦故脉亦應寸口上部也咳者肺氣逆也腎主

液自入爲唾。入脾爲涎。口中濁唾涎沫者。肺虛挾熱。

則脾腎子母俱虛。

脾爲肺母。腎爲肺子。

津液穢敗。此肺痿之症。

也。辟辟者。燥欬。唾膿血之聲。胸中爲肺之部分。隱隱

痛者。以熱腐膿血氣與火相搏而痛也。脈數且滑者。

膿血內潰也。此肺癰之症也。

脉數虛者爲肺痿。數實者爲肺癰。

金匱

痿癰俱有熱故俱脈數。但肺痿亡津液故脈數而虛。

肺癰吐膿血故脉數而實。

肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴必遺尿。小便數。所以

然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷必眩多涎吐。

甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者屬消渴。金匱二。

吐涎沫者脾爲肺母。脾虛不能攝涎也。肺氣虛而不逆。故不咳。內無熱。故不渴也。遺尿。小便數爲下虛。蓋

肺居上部。膀胱居下部。肺氣虛不能約束津液。而偏

滲膀胱。此上虛不能制下也。虛則必寒。故肺中冷以

肺熱則閉。瘈肺寒則遺溺。肺主通調水道。下輸膀胱。經所謂水液。

澄澈清冷。皆屬於寒。是也。經云。上虛則眩。甘草乾薑

湯以溫肺經。服湯已渴者。肺中有熱。則遺尿。便數。非

肺痿乃消渴也。內經云。肺消者。飲一溲二。死不治。又云。心遺熱于肺。傳爲鬲消是也。

甘草乾薑湯方

甘草 炙 四兩
乾薑 炮 二兩

右㕮咀以水三升。煮取一升五合。去滓分溫再服。
肺冷者。乾薑以溫之。甘草益脾。虛則補其母也。

師曰。肺欬逆。脈之何以知此。爲肺癰。當有膿血吐之。則死。其脈何類。師曰。寸口脉微而數微。則爲風。數則爲熱。微則汗出數。則惡寒風中。干衛呼氣不入。熱過于榮吸。

而不。出。風。傷。皮。毛。熱。傷。血。脈。風。舍。于。肺。其。人。則。歎。口。乾。
喘。滿。咽。燥。不。渴。多。唾。濁。沫。時。時。振。寒。熱。之。所。過。血。爲。之。
凝。滯。畜。結。癰。膿。吐。如。米。粥。始。萌。可。救。膿。成。則。死。金。之。
此。肺。癰。一。症。不。獨。內。傷。而。亦。有。受。外。感。者。也。肺。位。上。
焦。故。肺。應。上。部。寸。口。微。則。爲。風。外。邪。至。而。正。氣。虛。也。
數。則。爲。熱。者。火。勢。張。而。性。速。疾。也。正。氣。虛。而。腠。理。踈。
泄。故。汗。出。熱。伏。于。內。肌。表。反。覺。酒。浙。惡。寒。此。火。拯。似。
水。之。象。也。衛。在。外。呼。出。氣。亦。在。外。風。中。于。衛。呼。氣。不。
入。者。風。邪。壅。于。外。而。真。息。不。收。于。內。也。夫。壅。于。外。則。

風外傷皮毛矣。榮在內。吸入氣亦在內。熱過于榮。吸而不出者。熱氣鬱于內。而不宣于外也。夫鬱于內。則熱內傷血脉矣。是以風傷皮毛。邪氣舍其所合。舍居
也。肺合皮毛。則肺氣壅逆。故欬而喘滿。熱傷血脉。則津液不布。故口乾咽燥。但熱不在胃。故不渴耳。多唾濁沫者。肺熱液敗也。時時振寒者。卽上文數則惡寒之意。夫如因中風。其既也。風惡化而爲熱。則不覺其有風。但見其有熱。故熱之所過。血爲凝滯。而蓄膿致吐膿。成則死。以臟真不可傷也。

肺癰喘不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。

金四九

葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶

熬令黃色搗丸如彈子大

大棗

十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服。

肺癰氣逆則喘。喘自不得臥。葶藶瀉肺大棗甘以緩之。甘以瀉之也。

欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者爲肺癰。桔梗湯主之。

解見本篇金五一
第四節

桔梗湯方

桔梗輕朴重聲言能上下氣也所謂治急宜緩因其勢而利導之且甘草力作梗基更無內顧牽制始能

桔梗一兩

甘草二兩

右一味。以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿血。

也。

百瓣合成中心攢。莖空似桿。枝之梗且末有桿。有桔李有已。有其。或載上載下。亦有乎形貝母似貝。而掬抱心花形元似垂肺。輔桔与合。其屬類銀杏。形如包桔。三葉於莖側。重枝。

肺癰膜成則死然旣有膿血則又宜于吐出本草二云

甘草吐肺癰之膿血者，以甘能瀉熱也。桔梗色白味辛，利咽氣，解肺。

清氣之發於肺而散於皮毛者也。故曰苦以泄之，辛以散之。提氣血爲舟車，則能順流而下，逆流而上，無往而不利矣。

楫之劑所以載甘草上升而使之吐也。此之謂斯作焉故

肺癰胸脹滿一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭

身面目浮腫宜清涼世一
內外細者脾各司升清平之當解毒去湿熱之氣血中血清氣力
清後三多歸所當異之此而已後若車輿引重致遠墮傷後車棄拍

辛亥逆土

此者夫亦是六極可

辟西司御膳房

王
氣

合皮毛

火升氣逆也。鼻塞涕出。

曰不聞香臭酸辛者

開竅于鼻肺氣壅塞也

欬逆上氣喘鳴迫塞總屬肺

氣不利所致。

雖曰「地肺藏之上，實同肺金之不誠所也。謂金底於肺而肺止於河亭水而注之海者是矣。

氣面浮

腫肩息其脈淫

大不治又加利尤甚金五

肺在上

而其氣則常下降所謂地道宜上升天氣宜

下濟也

一咳逆上氣則氣逆矣。固浮腫者氣升火載肩

息者喘

息擡肩此氣之上脫也浮大者脈暴出而內

虛此氣之外散也。故不治。加利則脾土更衰。不生財金。此氣之下泄也。故尤甚。

上氣喘而躁者屬肺。脹欲作風水。發汗則愈。金。

內經水熱穴論曰。腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者

太陰也。其本在腎。其末在肺。皆積水也。腎者胃之關

也。關門不利。故聚水而從其類也。勇而勞甚。則腎汗

出。逢于風內。不得入于藏府。外不得越于皮膚。客于

玄府也。汗空行于皮裏。傳爲附腫。附脚本之于腎。名曰

風水。故水病腎爲附腫。大腹肺爲喘呼。不得臥者。標

本俱病也

肺是本
標

又評熱病論云少氣時熱從胸背

上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹鳴身

重難以行月事不來煩不能食正偃則欬名曰風水

又大奇論腎肝并沉爲石水并浮爲風水合內經觀之腎病水氣上逆因致肺脹以肺爲母腎爲子因子病而害及于母所以喘出于肺躁出于腎也發汗則愈者肺合皮毛汗出則風水之邪從皮毛中泄去肺脹自消矣

肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加

石膏湯主之

不周列物，鑿求報敵，逞灑尤言，考洋然水釋矣。甘草固本，采覆
防，平制外侮，五味欽收，匡溫以絕上原，乾姜任理，善果上庭。
剗除桂樹方宣，毒雨合辛生，用行而體至，其愚者，水

心下有水，則水寒射肺。故致肺脹而有喘咳，煩躁之證。水病脈宜沉，而反浮者，水氣泛溢上壅，又心肺居上焦，其脈原屬浮也。

小青龍加石膏湯方

卷二

答吸收不顯明，轉化不充分，更超越其表面深恐生意更
宣輸其化用，不然更越其表深恐生意更

麻書

乾薑

雨各二

五味子

半夏升各坐

T

細辛

一
書

二
兩

卷之三

萬物之有條也

去麻黃者，改散桂綿矣。則此因時之序也。立方處

制去筋重大相經。不可不惟。故以
右九味以詠一斗。

穀麻黃去上
枝根

白刺木一體胡為而盛

制去蜀輕重大相徑庭可不惟疑

穀麻黃去上
枝根

白刺木一體胡為而盛



曰在天爲雲，在地爲雨，既在天或雲，在地或雨，既可臻本氣之寒，亦可臻本氣之熱。

二升強人服一升羸者減之。日二服。小兒服四合。

龍能變化施雨水。經云：陽之汗以天地之雨名之。

發汗用大青龍行水用小青龍。此命名製方之本也。

心下有水。麻黃桂枝發汗以泄水于外。半夏乾薑細辛溫中以散水于內。芍藥五味子收逆氣以平肺甘

草益脾土以制水加石膏以去煩躁兼能解肌出汗也。

○能與相合能與同能與不同能與不為益者曰生陰龍而下行而南施小青不治水因矣。既稱大青力有功能。抱拯玄氣于墓葬宣大甲之云。○能與相合能與同能與不同能與不為益者曰生陽龍而上行而物不勝者。龍三德不為安者如以之莊周云未泮漫以子房龍子支離益

欵而上氣此爲肺脹其人喘汨如脫狀脈浮大者越婢