

全
匯
要
略
鷹
社

下

南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING COLLEGE OF CHINESE MEDICINE LIBRARY
1951

编 主 悅 者 王

珍 医 湖 春
之 三

金匱要略广注

清·李文撰

中医古籍出版社出版发行
长春市春湖复印社印制
一九八七年五月第一版第一次印制
ISBN7-80013-046-0/R·046

统一书号：一四二四九·〇二五一
定价：一百二十二元



漢張仲景先生金匱要略廣註下卷

錢塘 李彪耳臣註 張子康繩武

弟 彪新章叅 門人吳之彭在文

沈晉垣亮宸

同學

顧澄扶搖

評

侄

爲度晉斐

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治第十六

告並引病之

驚者外事相觸而然或耳聞大聲目擊異物遇
險臨危觸事喪志心爲之忤有惕惕然之狀悸
者動也有陽氣內衰心下空虛火氣內動而爲

悸者。有水停心下。心屬火。惡水。神不自安。而爲
悸者。有汗吐下後。正氣內虛。而悸者。有榮衛涸
流脈結代。而悸者。此俱屬傷寒而論也。若雜病。
則更有心下鼓者。有心中澹澹大動者。有心惕
惕。如人將捕之者。此驚與悸之所由分也。至于
吐衄下血。胸滿瘀血。又有源流之別。吐血出干
胃。吐行濁道。衄血出於經。衄行清道。蓋胃者。守
營之血。守而不走。存於胃中。胃氣虛。不能攝血。
故吐血從喉出於口。經者。走經之血。走而不守。

火氣急迫隨經直犯清道由督脈斬關而出於
鼻此吐衄血所由異也下血者內經云結陰者
便血一升再結二升三結三升此陰氣內結不
得通行血無所稟滲入腸間故下血也許學士
謂下清血色鮮者腸風也血濁色黯者臟毒也
肛門射如血線者脈痔也又下血腹不痛者爲
濕毒腹痛者爲熱毒此下血之所由異也若胸
滿由血瘀所致則有傷寒血瘀者有產後血瘀
者有暴怒傷陰血瘀者有跌撲墜損血瘀者證



各不同然血瘀必胸滿者何也難經云氣會膻中膻中穴在兩乳間陷中正當胸中部分此二焦宗氣所居是爲上氣海始因氣滯而血瘀終以血瘀而氣更滯此血瘀之所以致胸滿也今總以意斷之肝病發驚悸是驚屬乎肝也心動則爲悸是悸屬乎心也心主血屬君火肝藏血屬相火凡諸見血皆火迫妄行故吐衄下血瘀血與驚悸統稟爲一論乎

寸口脈動而弱動卽爲驚弱則爲悸

驚者其脉急而復弱其人目睛赤不眠多驚

金匱要略

傷寒論云。數脈見於關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者爲動也。又云。陽動則汗出。陰動則發熱。是動脈不特見於關上。卽尺寸兩部亦有動脈。以陰陽相搏而虛者則動也。此寸口脈兼二部而言。蓋驚自外至者也。驚則氣亂。故脈動而不寧。悸自內惕者也。悸因氣虛。故脈弱而無力也。

心下悸者。半夏麻黃丸主之。

半夏
麻黃丸方

等分

右二味末之。煉蜜和丸。如小豆大。飲服三丸。日服三
本經云。水停心下甚者。則悸。半夏辛以散之。能運脾。
去濕。以燥水飲於內。麻黃苦以泄之。能發表出汗。以
宣水飲於外也。

李瑋西曰。傷寒脈結代。心動悸者。主炙甘草湯以潤
經益血。復脈通心。與此方大異。則憑脈與不憑證之
謂也。

師曰。尺脈浮。目睛暈黃。劙未止。暈黃去。目睛慧了。知劙

今止。

金中六二

尺脈宜沉而反浮氣升火載陰氣不藏也目睛暈黃者以肝藏血開竅於目故衄之止與否視目睛之暈黃何如黃去睛慧則目得血而能視故衄止

又曰從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明全年六

衄血出於鼻手太陽經上頤抵鼻目下爲頤足太陽經從

巔入絡腦鼻與腦通手陽明經挾鼻孔迎香穴足陽明經起

鼻交頰中卽山根四經皆循鼻分故皆能致衄太陽行

身之表內經云太陽爲開是春生夏長陽氣在外有開之義故春夏衄者太陽陽明行身之裏經云陽明

爲闔。是秋斂冬藏。陽氣在內。有藏之義。故秋冬衄者。陽明。

衄家不可汗。汗出必額上陷。脈緊急。直視不能眴。不得眠。
全中六心

衄家陰血已虧。汗出則更凶。陽額上爲陽分。陷者陽虛氣脫也。脈者血之府。氣者脈所行。此以血凶氣竭。故脈緊急也。經云。瞳子高者。太陽不足。戴眼者。太陽已絕。此衄血傷陰。汗多凶。陽陰陽兩虛。故直視不能眴也。眴者目轉。經云。陰氣虛。故目不得瞑。又云。陽虛。合之貌。

發汗躁不得眠。

病人面無血色。無寒熱脈沉弦者。脈浮弱手按之絕者。下血煩欬者必吐血。卷六五

內經云心之合脈也。其榮色也。以心主血。血克則色和。面無血色者。脫血之象。無寒熱表無邪也。沉弦皆陰脈。劙則血脫而陰虛故也。脈浮在表裏氣必虛。且弱而按之絕者。陰已內亡氣不攝血。故下血也。煩與欬俱肺病。肺中伏火。迫血妄行。故吐血。所謂上氣見血。下聞病音也。



南京中医药大学图书馆版权所有
试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

夫吐血欬逆上氣。其脈數而有熱。不得臥者死。

吐血肺虛氣逆。金不生水。并腎臟亦不能納氣歸原。

故欬逆上氣也。脈數有熱。在腎則水衰火盛。在肺則

火刑肺金也。經云數則爲熱。又云數則爲虛。不得臥。陰虛血不歸肝

也。肝藏血。經云人臥則血歸於肝。

李升璽曰。吐血脈數者不治。總以陰虛氣脫也。今醫但知清涼解熱者。真屬夢夢。

夫酒客欬者必致吐血。此因極飲過度所致也。

欬出於肺。吐出於胃。酒性至熱。極飲過度。則肺胃之

間熱蓄氣衝故欬而吐血

寸口脈而弦大。弦則為減。大則為芤。減則為虛。虛寒相持。此名曰革。婦人則半產漏下。男子則亡血。

此節解見上第六篇。彼為虛勞而言也。因內有亡血二字。復載入此篇。血論中通節要看虛寒二字。傷醫視亡血為熱症。不知氣逆亡血。血既亡後。則內已虛寒矣。經云。氣血者。喜溫而惡寒。蓋溫則經脈貫通。運行不息。虛則氣不攝。血寒則凝而不流。此血既不歸經。又無着落。自然泛溢。亡失。屢見亡血者。服寒涼藥。

愈出不止。患屬虛寒之咎。此古人血脫者益氣多以甘溫之藥奏功。良有以也。

亡血不可發其表。汗出即寒慄而振。

經云。奪血者無汗。以汗與血俱屬心液。亡血液竭。無復餘液作汗也。今又發表。則陰虛且更亡陽。表間衛氣虛極。故寒慄而振。

病人胸滿唇痿。舌青口燥。但欲嗽水。不欲嚥。無寒熱脈微。大來遲。暖不滿其人。言我滿為有瘀血。

心主血脉。肺主氣。俱位屬上。正在胸中。血瘀則心肺交困。氣血不行。故胸滿也。肝藏血。其經環唇內。脾裏血。其華在唇四白。胃多氣多血。其經挾口環唇。病則口渴唇脣

血瘀則肝脾胃三經枯滯。血不華潤。故唇痿也。

枯燥者

無血色。又心主血屬火。舌爲心竅。故其色紅。血瘀則之貌。

火氣衰冷。心血不生。故舌青也。血瘀則津液不布。故口燥內無實熱。故漱水不欲嚥。外無表邪。故不往來寒熱也。脈微大者。血瘀邪氣盛也。微大者。稍大之意。非微而又大也。

來遲者。血瘀脈滯也。肝藏血。其經抵小腹。布脇肋。

血瘀多在小腹。脇肋二處。與臍腹無干。故腹不滿。其人言我滿。以血瘀氣滯。凝爲腹滿耳。

病者如熱狀。煩滿口乾燥而渴。其脈反無熱。此爲陰伏。是瘀血也。當下之。今中七二

血瘀內無實熱。故外證但如熱狀。而其脈不數疾。反無熱也。煩滿者。血瘀經氣不舒。燥渴者。血瘀津液不布也。血屬陰。瘀則結伏於內。故爲陰伏下之。以去瘀生新。

火邪者。桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。此節

本傷寒論而句多遺失不全因原文
有驚狂二字故彙入驚悸篇中也

桂枝抹逆湯方

桂枝

二兩
去皮

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
洗

大棗

十二
枚

牡蠣

五兩
煮

龍骨

四兩

蜀漆

三兩
去腥

右爲末以水一斗三升先煮蜀漆減一升內諸藥
煮取三升去滓溫服一升

傷寒論云傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起
臥不安者主此湯方內皆回陽固脫之品也成無已

