

脾胃論

脾胃論卷中

氣運衰旺圖說

天地互為體用四說

察病神機

濕胃化 熱小腸長

風膽生

皆陷下不足先補則

黃耆

人參

甘草

當歸身

柴胡

升麻

乃辛甘發散以助春夏生長之用也

土脾形

火心神

木肝血

文 女 吳勉學 校

皆大盛上乘生長之氣後瀉則

甘草梢子之甘寒瀉火形於肺逆於胃中傷氣者也

黃芩之苦寒以瀉胃中之熱喘氣上奔者也

紅花以破惡血已用黃芩大補腎水益肺之氣瀉血中火燥者也

寒膀胱藏氣

燥大腸收氣

皆大旺後瀉則

黃耆之甘溫止自汗實表虛使不受寒邪

當歸之辛溫能潤燥更加桃仁以通幽門閉塞

利其陰路除大便之難燥者也

水腎精

金肺氣

皆虛衰不足先補則

黃蘗之苦寒除濕熱爲痿乘於腎救足膝無力  
亦除陰汗陰痿而益精

茸草枸杞黃芩補肺氣泄陰火之下行肺苦氣  
上逆急食苦以泄之也

此初受熱中常治之法也非權也

權者臨病制宜之謂也

常道病則反常矣

春夏乃天之用也是地之體也

秋冬乃天之體也是地之用也

此天地之常道既病反常也

春夏天之用人亦應之

食罷四肢躄健精氣神皆出九竅通利是也口鼻  
氣息自不聞其音語聲清響如鐘

春夏地之體人亦應之

食罷皮肉筋骨血脉皆滑利屈伸柔和而骨剛力  
盛用力不乏

飲食勞倦所傷始爲熱中論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內外  
經悉言人以胃氣爲本蓋人受水穀之氣以生所謂  
清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫  
胃爲水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣  
散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經  
並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也若飲食失  
節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣旣脾  
胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於  
下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包  
絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負

脾胃氣虛則下流於腎陰火得以乘其土位故脾證始得則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱爲頭痛爲渴而脉洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外爲有餘有餘者瀉之傷其內爲不足不足者補之內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也

實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何惟當以辛  
甘溫之劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣  
經曰勞者溫之損者溫之又云溫能除大熱大忌苦  
寒之藥損其脾胃脾胃之證始得則熱中今立治始  
得之證

### 補中益氣湯

黃耆

病甚勞役熱甚者一錢

甘草

已上各五分炙

人參

去蘆三分有嗽去之

已上三味除濕熱煩熱之聖藥也

當歸身

二分酒焙乾或日乾以和血脈



橘皮

不去白二分或三分以導氣又能益元氣得諸甘藥乃可若獨用瀉脾胃

片麻

二分或三分引胃氣上騰而復其本位便是行春升之令

柴胡

二分或三分引清氣行少陽之氣上升

白朮

三分除胃中熱利腰脊間血

右件藥哎咀都作一服水二盞煎至一盞量氣弱

氣盛臨病斟酌水盞大小去粗食遠稍熱服如傷

之重者不過二服而愈若病日久者以權立加減

法治之

○如腹中痛者加白芍藥

五分

炙甘草

三分

○如惡寒冷痛者加去皮中桂

一分或三分桂心是也

○如惡熱喜寒而腹痛者於已加白芍藥二味中更

加生黃芩 三分或二分

○如夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也

○如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中

更少加桂

○如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也加益智 三分

或二分 或加半夏 五分 生薑 二片

○如頭痛加蔓荊子 二分或三分

○如痛甚者加川芎 二分

○如頂痛腦痛加藁本 三分或五分

○如苦痛者加細辛 二分華陰者

○諸頭痛者併用此四味足矣

○如頭上有熱則此不能治別以清空膏主之

○如臍下痛者加真熟地黄 五分 其痛立止如不已

者乃大寒也更加肉桂 去皮二分 或三分 內經所說少腹

痛皆寒證從復法相報中來也經云大勝必大復

從熱病中變而作也非傷寒厥陰之證也 仲景以 抵當湯

并丸主之乃血 結下焦膀胱也

○如胃中氣壅滯加青皮 二分 如氣促少氣者去之

○如身有疼痛者濕若身重者亦濕加去桂五苓散

錢

○如風濕相搏一身盡痛加羌活防風藁本根各七上

湖分升麻蒼朮已上各一錢勿用五苓所以然者為風藥

已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以諸

風之藥損人元氣而益其病故也

○如大便秘澁加當歸梢一錢閉澁不行者煎成正

藥先用一口調玄明粉五分或一錢得行則止此病不

宜下下之恐變凶證也

○如久病痰嗽者去人參初病者勿去之冬月或春

寒或秋涼時各宜加去根節麻黃五分

○如春令大溫只加佛耳草三分欵冬花一分

○如夏月病嗽加五味子二十枚麥門冬去心二分或三分

○如舌上白滑胎者是胃中有寒勿用之

○如夏月不嗽亦加人參三分或二分并五味子麥門冬

各等分救肺受火邪也

○如病人能食而心下痞加黃連一分或三分

○如不能食心下痞勿加黃連

○如脇下痛或脇下急縮俱加柴胡三分甚則五分

右一方加減是飲食勞倦喜怒不節始病熱中則

可用之若末傳為寒中則不可用也蓋甘酸適足

益其病爾如黃耆人參甘草芍藥五味子之類也  
今詳內經鍼經熱中寒中之證列于左

調經論云血并於陽氣并於陰乃爲炅中血并於上  
氣并於下心煩惋善怒又云其生於陰者得之飲食  
居處陰陽喜怒又云所有勞倦形氣衰少穀氣不盛  
上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胃中故曰內熱  
陰盛生內寒厥氣上逆寒氣積於胃中而不瀉不瀉  
則溫氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脉不  
通其脉盛大以瀦故曰寒中

先病熱中證者衝脉之火附二陰之裏傳之督脉

督脉者第二十一 額下長强穴是也與足太陽膀胱寒氣爲附經督脉其盛也如巨川之水疾如奔馬其勢不可遏太陽寒氣細細如線逆太陽寒氣上行衝頂入額下鼻尖入手太陽於胷中手太陽者丙熱氣也足膀胱者壬寒氣也壬能尅丙寒熱逆於胷中故脉盛大其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經者故十一經之盛氣積於胷中故其脉盛大其膀胱逆行盛之極子能令母實手陽明大腸經金卽其母也故燥旺其燥氣挾子之勢故脉瀆而大便不通以此言脉盛大以瀆者手陽明大

腸脉也

黃帝鍼經胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里以補之

若見此病中一證皆大寒禁用諸甘酸藥上已明之矣

脾胃虛弱隨時爲病隨病制方

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味



目中溜火而視物眈眈無所見小便頻數大便難而  
結祕胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩  
束之急甚則如刀刺腹難舒伸胃中閉塞時顯嘔噦  
或有痰嗽口沃白沫舌強腰背胛眼皆痛頭痛時作  
食不下或食入卽飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆  
在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺  
金爲熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之不足黃  
耆人參湯主之

### 黃耆人參湯

黃耆

一錢如自汗過  
多更加一錢

升麻

六分