

驗方新編卷六目錄

前陰

男女交合精脫氣絕

陽痿

陽物軟而不舉者是

陽舉易洩

陽物挺脹

陽物堅硬精自流出捏之則脆音痛如針刺
癆病火動陽物易舉

陽強不倒精自流出

老人腎硬

陽物被捆腫大

飛絲纏繞陽物腫痛

陽物繩人

陽物割斷

陰頭生瘡

陰毛生八脚虱

腎氣由臍下上衝心痛

小腹有塊直衝心胸叫號疼止覺第硬

小腸氣痛腎子腫墜

腎子痛墜外現紅色

癩疝重墜囊大如斗

疝氣腫脹如斗

腎囊腫痛如斗

陰囊奇癢不止

陰囊陽物肛門作癢

陰囊腫如水晶

陰囊忽然腫大多因坐地所受風溼

陰囊打損瘀血積滯

陰囊腫爛腎子落出

下部濕瘡

前後陰之間生瘡

小便

小便不通



口渴小便不通

小便不逞性遍身水腫

夫婦交合忍精不放及強忍小便以致不通

轉胞小便閉塞

心熱如火一熱便入小腸大小便不快

小便不通氣衝心痛

小便白如米汁

小便短澀渾濁大便多而溏不思飲食

小便過多

夜睡遺尿

小便出血

小兒小便出血

小便出糞大便出屎

淋症

勞淋

熱淋

氣淋

血淋

石淋

五淋通治

五淋痛不可忍日久不愈

陽物堅硬精流不止痛如針刺

老人精敗淋痛

小兒淋症一日百餘次

增補石淋沙淋妙方

小兒大小便不通

遺精

遺精諸方

小兒夜尿多後遺濁



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編卷之六

前陰

男女交合精脫氣絕

男女交感樂極精脫而死切不可驚走下床男脫

口哺送其熱氣女脫則男以口哺送其熱氣一連數十

呵之則必悠悠然陽氣重回矣再以八參附子湯灌之氣

之法先須閉口提丹出之氣上來盡力若貧者不能得參
哺于口中送于喉去可救垂絕于俄傾急用黃芪四兩當歸
二錢附子五錢水煎服亦有生者

又方用人抱起坐之以人之口氣呵其口又恐不能入喉急以筆管通其兩頭入病人喉內使女子呵之不必皆

妻妾也 凡婦人皆可盡力呵之 雖死去亦生

又方 陽痿

陽物軟而不舉者是爲陽痿

人之口氣固其日久則

可熟地

干口一杯飲此方專治陽痿不舉一杯作三百

緩緩

飲之能生精養血益氣安神其功不可盡述

高麗參

參亦可

熟地

枸杞

各五錢

母子香

錢遠志去心

沉香

各一錢

荔枝肉七個

右藥浸上好燒酒

勦三日後蒸三炷香久取起浸冷水中取出火氣過二十

一日飲之

又方

麻雀

瓦雀又名鴉片

肉

冬月煮食功能起陽生

子其效無窮或用麻雀蛋煮食更爲神妙

又方

新鳳仙花子

卽指甲花子急慢性子研末

三錢 烟薰錢 增酥

八分真麝香

歲分此味俟
做丸時加入

共爲一大丸外用葱白搘燭包

裹再加紙一二層用水泡溼放炭火中煨熟換紙再燭

至七次去葱紙將藥改爲小丸如菉豆大每於將睡先一

二時取二丸用酒化開敷陽頭上半時俟陽物舉起將藥

洗去然後行事堅而且久並能種子其效如神屢試屢驗

又方 大附子

壹個重壹兩
五六錢者

鴉片煙五分硫黃末貳錢穿

山甲

貳片炙黃研未

將附子挖空以各藥納入用好酒半觔和附

子用文武火煮乾取出搗爛如膏先用

麝香參釐放臍

眼再將此膏貼上應驗無比

文火者微火也
武火者烈火也

又方 母

猪腹內子腸新瓦上焙乾爲末每服一錢燒酒送下可管

一月

又方

蜂窠新瓦上焙枯爲末新汲水調服一二

錢終夜不倒極效

陽舉易洩

有人交合之初陽舉卽洩百治不效後用
要韭菜地內者十一條破開長流水洗净加韭菜汁搗融酒沖服日服一次服至數日卽能久戰可望生子

陽物挺脹

甘草稍貳兩小黑豆半升煎濃湯服

陽物堅硬精自流出挾之則脆黯痛如針刺

此名腎漏又名妬精或云生楊梅瘡多有此症用

固腎



南京中医药大学图书馆版权所有

韭菜子略一少 黄柏五分煎服若不見效照後強中力
治之

癆病火動陽物易舉

皮硝放手心兩手合住其硝自化陽物即不舉安坐以燒酒
和泥敷陰毛上陽即復舉總之陽舉則相火妄動其病難
愈必致貪色亡身不如不舉安心靜養爲妙保生惜命者
宜加意焉

陽強不倒精自流出

此名強中乃陽盛實熱不急治必發大癰難治用 生地
黃柏 知母 龍骨 大黃 只壳略一少 水煎服若胃



虛食少者則用

黃柏

甘草

砂仁

洛一水煎服

老人腎硬

老人腎藏

虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腰子

杜仲一片

長二寬一寸

煮熟空心食之腎自柔軟再用

橘皮茶酒

陽物被捆腫大

一小兒被人用頭髮繫住龜頭少時氣閉腫大無法可解後將小兒坐冷水中卽刻縮小去髮卽愈

飛絲纏繞陽物腫痛不已

威靈仙二兩煎膿汁泡洗卽愈

陽物縮入

方見卷十四傷寒門陰症傷寒內

陽物割斷

凡陽物割斷傷口不合急用所割陽物焙枯碎末用酒

服立效

陰頭生瘡名下疳

蘆甘石

一兩火煅醋淬再煅再淬五次

兒茶

參少共研末香油調敷立愈

又方

婦人月經布

燒灰候冷

麻油調敷百發百中或加頂上

冰片少許更妙

又方先用

甘草

銀花

怒頭煎湯

洗淨用

生橄欖核一個

無則用鹽

橄欖核

煮淨亦可

燒存性頂上梅

花水丹一分共爲細末麻油調塗雖臭爛不堪敷之即愈

履試如神 又方

大訶子燒灰爲末入麝香少許先勝

荆芥

黃柏

甘草

葱白煎湯洗淨然後敷之

附
麝香

至一二寸用此亦妙

並查癰毒門楊梅瘡方內服湯藥爲

妙 又方

銀青散

見癰毒
諸方

敷之神效

又方
鱉甲燒灰

敷百藥不效者用此如神

又方

五倍子

研絲爪搗爛

包敷雖腐爛不堪者亦效

陰毛生八脚虱

白蘚嚼融擦之神效或用桃仁嚼融擦之亦可

腎氣由臍五上衝心痛小便不通

此名心疝用韭菜汁和五苓散見內外備
諸方用藥末以小茴香

煎湯冲服

又方

真雲苓

小茴香各四兩

共研末

爲

丸梧子大每服參錢開水下服完卽愈其效如神

小腹有塊直衝心胸叫號疼痛止覺筋硬

此名橫梁痛最難醫治婦女患此最多用

補骨脂

一兩

黑芝麻貳兩拌炒篩去芝麻只將補骨脂磨末

忌鐵器

以酒

爲丸每服三錢開水送下或照後絲瓜方乃丹溪方更妙

小腸氣痛腎子腫脹偏墜

名曰疝氣丹

老絲瓜

又名水瓜

瓦上焙枯研末熱酒冲

服重者不過三服卽愈難氣痛衝心亦效

又方

凡疝

初起必發寒熱疼痛欲成囊癰者用新鮮地骨皮

即枸杞子根

生姜

各四

共搗如泥用絹包於囊上其癢異常一夕卽納

永不再發

又方

陳皮

荔枝核

炒焦硫黃火中鎔化卽投水缸

去水

各等分共研末飯爲丸如梧子大每服十四粒

九空

心服酒下其疼立止痛甚者加五六丸不可再多氣痛衝心三四服可以斷根此丹溪力也

又方

槐子

壹錢

炒爲末入鹽三分空心熱酒送下腫消痛止

又方 雄黃五分飛淨爲細末姜湯下止痛如神

又方

將兩腳第二指對捫一處用豆大艾火從第二脚

指頭上合縫處燒之立愈或在足大指外邊甲縫內中間

不上不下之處燒之亦可

男左女右

又方

子腳裡側螺螄

骨上排起四指三陽交穴

艾火燒七次止痛如神

可

除根

又方

旱蓮草

五錢

又名墨

斗墨

東酒

煮服不論老少

近皆效

又方

栗炭

燒紅放碗內

加好燒酒半

碗以

益佳飲之雖痛不可忍亦可立止

又方

病在左用

荔枝核

壹錢

新瓦上

焙枯研末

空心服

病在右用

小茴香

五錢

鹽水炒

研末空心服

一日兩次甚效

又方

荔枝核

四兩

水浸炒

小茴香

壹兩

鹽同研極細

加紅白

二糖拌勻爲丸如梧子大

每服五錢

一日三次四劑後即

可斷根

又方

穀樹葉

三月三日

或五月五日採取

繖穿陰乾

要擇如雲

板式者

每

用四錢煎湯服

服後卽時小解一

二次立愈輕者一服重

者兩服全愈神效穀樹又名楮樹又名楮牆樹又名穀枝
樹 又方 苦楮樹葉半觔煮滾放鑊內先熏後洗每口
數次其效甚速 又方 生石菖蒲 柑子葉
各壹兩 揪極融爛置酒壺內加開水一碗將壺入鍋
盞滾於患處隔衣頻頻熨之止痛如神 又方
錢滾水送下立止三服除根 又方 葫蘆巴子
鑊內炒黑研末每服三錢滾酒送下出微汗即消
又方 菖蒲子七粒和飯搗爲丸敷脚心左痛敷左右痛
敷右雙痛雙敷 又方 黨參叁錢當歸酒洗炙芪鑊貳
川芎 川棟 小茴 橘核 荔核各壹錢附子 肉桂
桂枝

作貳
次冲服川椒各五分

赤芍五分

錢服一二劑左邊偏墜而

不癄

一

者效驗之至

又方

薺麥麪四兩

葫蘆巴四兩

酒浸

茴香煙兩

共磨爲末酒糊爲丸如梧子大

每服壹錢

中

益湯下一

日三次服至

一月大便必有溼熱之物

如膿者

乃可斷根

又方

凡患偏墜如服荔枝核小茴香等藥

不效者此熱症也取芙蓉花根去心

用皮搗極融爛加大

黃末敷患處二三日必愈神效

腎子作痛外現紅色而不昇上

又方

川棟子

奈苑陳皮赤芍甘草防風澤漆

各壹錢

枳橘鹽

各壹錢

加個

中

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.erton.com