

辨少陽病証并治全篇

吳子曰。少陽主春。其氣半出地外。半在地中。故曰。半表半裏也。半表者。在外之太陽也。半裏者。在內之太陰也。邪入其間。陰陽相移。寒熱交作。邪正相持。進退互拒。汗吐下三法。俱在所禁。故立小柴胡湯和解法。加減施治。然有口不渴。身微熱者。加桂枝取汗。下後胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。用柴胡桂枝乾薑湯汗之。又有些胡證具。而反下之。心下滿而鞭痛者。此為結胸也。大陷胸湯主之。柴胡證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下結。鬱鬱微煩者。

與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫以丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加芒消湯下之是仲景亦有汗下法惟在臨證詳察因病施治不可執一也文讀仲景書於一定之中寓權變者多活活潑潑集大成者吳子可謂善讀聖經者矣若倭口市醫必冷笑聖人自相矛盾此之謂蠢才也○近宗葉桂及三家指南醫案靈胎諸書只可騙肉食富紳財物一嘆

少陽之為病口苦咽乾目眩也

林瀾曰膽熱府自病

少陽中風

兩耳無所聞目赤

俗名紅眼睛

胸中滿而煩者不可吐下

吐下則悸而驚。

目赤用重薑棗湯。并出頭汗。有星翳。加木賊草三錢。初服加重。勿怪。連服。

十餘日。全愈。一無痛苦。誓不欺人。忌看書等二十日。

傷寒。脈弦細。頭痛發熱者。

屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則

愈。胃不和則煩而悸。○傷寒五六日。中風往來寒熱。

胸脇苦滿。

柴胡。胸脇引經主藥。凡百千胸脇證。非柴胡不能至其經。

默默不欲飲。

食。心煩。喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇

下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。小柴胡湯方。柴胡半斤。黃芩人參甘草炙。生薑切各三兩。半夏半升。洗。大棗十二枚。擘。少陽者。膽木初生萌芽也。土宜鬆。用柴升發。土宜肥。用參甘棗滋培。又必春日煦之。有薑夏陰雨膏之。有黃芩。仲景諸方。無不與天地合德。文偶舉一方言之。求同志者。於各方會心焉。右七味。以水一斗二升。煮取六升。去渣。再煎取三升。溫服一升。日

三服。加減法。若胸中煩而不嘔。去半夏人參。加桔

實一枚。

全瓜蒌。滌胸中垢膩。專藥。

若渴。去半夏。加人參。合前成四

兩半。桔蒹根四兩。

今名天花粉。

若腹中痛者。去黃芩。加芍

藥三兩。

芍專理逆氣。和肝脾。

若脇下痞鞭。去大棗。加牡蠣四兩。

壯軟堅。解結氣。市醫但云瀋精。

若心下悸。小便不利。去黃芩。加茯苓

四兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫服。

微汗愈。若效者去人參大棗生薑加五味子半升。乾

薑三兩

薑味斂散利肺神藥。但近效家不敢服。余亦未親試。蓋效雖見證於肺。而實非肺中有病。

市醫早用杏貝前苑桑杷肺家藥引侵肺之外邪直入肺裏。不得出。愈而逢節又發。久成吐血喘哮失音。諸癆瘵所謂引人癆病路上去者此也。余杜製大悲膏貼天柱骨下肺俞穴。十四日發痒汗出。效必止。神方也。附方求政麻黃桂枝乾薑細辛各漕平四兩生葱生薑洗切各四斤油八斤浸藥三晝夜微火煎之去渣再煎之滴水成珠下東丹攪之不老不嫩傾冷水內終年勿斷水則不乾。余門市賣每張七文救

人不少。今老而無子。此方不久滅絕矣。噫。傷寒中風。有柴胡證。但見一證。

便是。不必悉具。○傷寒三日。少陽脉小者。欲已也。○

傷寒四五日。身熱惡風。頸項強。脇下滿。手足溫而渴。

者。小柴胡湯主之。○陽明病發潮熱。大便溏。小便自。

可。胸脇滿不去者。與小柴胡湯。○陽明病。脇下鞭滿。

不大便而嘔。舌上白苔者。凡病在三陽。舌白入胃。舌。

黃厚入三陰。舌灰黃黑。中。



虛人舌多裂紋津液少舌光赤
剝無苔癆病壞病舌起白浮點可與小柴胡湯上焦
得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解○凡柴
胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必
蒸蒸而振却發熱汗出而解○得病六七日脈遲浮
弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛
面目及身黃頸項強小便難者與小柴胡湯後必下重

本渴而飲水嘔者。柴胡不中與也。

言誤下壞病。當隨證救逆。亦不可泥。

一證便是。柴胡不罷二條。仍與

傷寒六七日發熱微

小柴胡也。聖人教人。經權常變。

惡寒支節煩疼微嘔。心下支結。外證未去者。柴胡桂

枝湯主之。

太陽少陽病。使用兩陽方。治病何等容易。

柴胡桂枝湯方。柴胡

四兩。桂枝人參黃芩芍藥生薑切各一兩半。甘草炙

一兩。半夏二合半。洗。大棗六枚擘。右九味。以水七升。

煮取三升。去渣。溫服一升。○傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。柴胡桂枝乾薑湯方。柴胡半觔。桂枝黃芩各三兩。乾薑牡蠣甘草炙各二兩。桔蓐根四兩。右七味。以水一斗二升。煮取六升。去渣。再煎。取三升。溫服一升。日

服聖人方必先與病家說明了。否則必被

倭口市醫利口紳富咋舌阻撓復進以珠犀麝

蘆根石斛等種種入心寒滑毒品。遇邪入內而鳴者。

下凡服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○傷寒五

六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便

鞭脉沈者。此為陽微結。結亦手足冷。與厥冷者自不同。必有表復有

裏也。脉沈亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結不得。

復有外證。悉入在裏。此為半在裏。半在外也。脉雖沈

細。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。

故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。外解而大便鞭

屎未去也。得屎而解。言不可再用藥。當俟津液回。自屎下而解。○聖人教人審證之細如此。

求善學者百。文按治病最容○易審證極萬難。傷寒陽脉濇。陰脈弦。

法當腹中急痛者。先與小建中湯。不差者。與小柴胡

湯主之。○傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者黃連湯主之。黃連湯方黃連甘草炙乾薑桂枝

各三兩。人參二兩。半夏半升洗。大棗十二枚擘。右七

味以水一斗煮取六升去渣溫服晝三夜二。程知曰寒溫互

用為陰陽相。○文按嘔吐藥須勻多次太陽病十日

格者立治法。○緩服故曰晝三夜二也

以上。鯀浮細而嗜臥者外已解也。浮細嗜臥病已解沈細嗜臥少陰證



設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。聖

臨證詳察。不拘日數。

傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞭。嘔吐而不

利者。大柴胡湯主之。

吳子曰。桂枝人參。治汗出下利。表裏俱虛。此治痞鞭不利。表裏

俱實。○文按。協熱痞鞭。以利不利分虛實。內經均謂兩感不治者。聖人出二方。救億萬世無限生民矣。

太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證

。用大柴。必先與小柴。

仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。

為未解也。與大胡湯下之則愈。天柴胡湯方。柴胡半

觔。黃芩芍藥各三兩。大黃二兩。生薑五兩切。枳實四

枚炙。半夏半升洗。大棗十二枚擘。右八味以水一斗

二升煮取六升去渣再煎溫服一升日三服。○太陽

病過經十餘日。心中溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。

腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。吐也。自巳與調胃



承氣湯。

胃有熱邪。

若不爾者。

不是自己吐。醫誤吐。

不可與。但欲嘔。

胸

中痛。

醫誤吐。傷胸陽。

微溏者。此非柴胡證。以嘔。故知極吐下。

也。

醫誤吐。傷胸陽之故。非胃有熱也。宜大半夏湯。

傷寒十三日不解。

俗名兩候。

胸

脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證。下

之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。

潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒



消湯主之。

又出兩解法也。

柴胡加芒消湯方。於小柴胡湯方

內加芒消六兩。餘依前法。不解更服。

下法千變萬化

傷寒十

三日不解。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小

便利者。大便當鞭。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥

下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此

為內實也。調胃承氣湯主之。○傷寒三日。三陽為盡。