

加批
詳評
景岳全書

卷四十二

會稽張介賓會卿著

麻疹

(一) 述原

景岳子曰。痘之與疹。原非一種。雖痘之變態多證。而疹之收斂稍易。然疹之甚者。其勢凶危。亦不減於痘。最為可畏。蓋疹毒。痘毒本無異也。第古人重痘而忽疹。多不詳及。使後人無所宗法。余實悵然。自得羅田萬氏之刻。見其理透法精。鄙念斯慰。今悉從其訓。備述於此。雖其中稍有裁訂。亦不過正其疑似。詳其未詳耳。使此後患疹者。幸獲迷津之指南。亦以見萬氏之功。為不少矣。

(二) 名義

疹者。痘之未疾。惟二經受證。脾與肺也。內應於手足太陰。外合於皮毛肌肉。是皆天地間疹戾不正之氣。故曰疹也。然其名目有異。在蘇松曰沙子。在浙江曰醋子。在江右湖廣曰麻。在山陝曰膚癘。曰糠癘。曰赤瘡。在北直曰疹子。名雖不同。其證則一。但疹在痘前者。痘後必復疹。惟痘後出疹者。方為結局。

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

謄集



加批
詳評
景岳全書

卷四十二

會稽張介賓會卿著

麻疹

(一) 述原

景岳子曰。痘之與疹。原非一種。雖痘之變態多證。而疹之收斂稍易。然疹之甚者。其勢凶危。亦不減於痘。最為可畏。蓋疹毒痘毒本無異也。第古人重痘而忽疹。多不詳及。使後人無所宗法。余實悵然。自得羅田萬氏之刻。見其理透法精。鄙念斯慰。今悉從其訓。備述於此。雖其中稍有裁訂。亦不過正其疑似。詳其未詳耳。使此後患疹者。幸獲迷津之指南。亦以見萬氏之功。為不少矣。

(二) 名義

疹者痘之未疾。惟二經受證。脾與肺也。內應於手足太陰。外合於皮毛肌肉。是皆天地間疹戾不正之氣。故曰疹也。然其名目有異。在蘇松曰沙子。在浙江曰醋子。在江右湖廣曰麻。在山陝曰膚癘。曰糠癘。曰赤瘡。在北直曰疹子。名雖不同。其證則一。但疹在痘前者。痘後必復疹。惟痘後出疹者。方為結局。

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

謄集



(三) 疹逆順

萬氏曰疹以春夏為順。秋冬為逆。以其出於脾肺二經。一遇風寒。勢必難出。且多變證。故於秋冬為不宜耳。夫天行不正之氣。致為人之痘疹。然古人於痘疹二字。始終歸重於痘。並不分別疹為何物。豈可以二證歸於一證耶。想當時重痘不重疹。故爾略之。致使後人不得心法。因而害事者。往往有之。今以吾家四代傳流。以及今日心得之法。開載於後。用此應痘。定不差矣。敢有毫釐隱匿。天其鑒諸。

(四) 疹脈

凡出疹自熱起至收完。但看右手一指脈洪大有力。雖有別證。亦不為害。葉評此乃有胃氣此定存亡之要法也。

景岳曰。按此即陽證得陽脈之義。若細軟無力。則陽證得陰脈矣。元氣既弱。安能勝此邪毒。是即安危之基也。故凡診得陰脈者。即當識為陰證。而速救元神。宜用傷寒溫補託法。參酌治之。葉評疹疹用溫補託法必致誤人若執以麻疹為陽毒。而概用清寒。則必不免矣。

(五) 疹證

疹雖非痘之比。然亦由胎毒蘊於脾肺。故發於皮毛肌肉之間。但一時傳染。大小相似。則未有不由天行癘氣而發者。此其源雖內發。而證多屬表。故其內為胎毒。則與痘證同。外有表邪。則與傷寒類。其為毒也。總由君相二火。燔灼太陰。而脾肺受之。葉評但論脾肺受病。君相之火。燔灼使然。此不易之言。非比景岳之

陰症溫補
托裏也

故其為證則有效嗽噴嚏面腫腮赤目胞浮腫眼淚汪汪鼻流清涕呵欠煩悶乍熱手足稍冷夜卧驚悸或惡心嘔噦或以手搗面目唇鼻者是即出疹之候便宜用解毒散邪等藥不使留停於中庶無他患且凡是疹證必其面赤中指冷而多嗽又必大熱五六日而後見紅點遍身此其所以與痘與傷寒有異也

一痘欲盡發而不留疹欲盡出則無病邪氣鬱遏則留而不去正氣損傷則困而不伸毒歸五臟變有四證歸脾則泄瀉不止歸心則煩熱不退而發驚歸肺則效嗽出血歸腎則牙齦爛而

疳蝕

葉評此
說合理

程氏曰麻疹初出類傷風寒頭疼嗽效熱甚目赤頰紅一二日內即出者輕必須解表忌見風寒葷腥厚味如犯之恐生痰涎變為驚搐必致危矣如初起吐瀉交作者順乾嘔霍亂者逆欲出不出者危亡立至徐氏曰痘自裏而出於臟故重疹自表而出於府故輕景岳曰痘疹之屬有四種曰痘曰疹曰斑曰點也痘則陸續漸出自小而大或大或小或密或稀部位顆粒有辨也疹則一齊發出大者如蘇子次者如芥子小者如蠶子而成粒成片者是也麻則最細而碎如蚊迹模糊者是也斑則無粒惟成片紅紫如雲如錦者是也大都疹與麻斑同類即發斑傷寒之屬而痘則本非其類也蓋痘毒本於肝腎出自中下二焦是以終始不妨於食而全賴水穀為主所以能食則吉不能食則凶故治痘者不可不顧脾胃麻疹之毒則由表邪不解而內犯太陰陽明病在上中二焦所以多不能食治麻疹者但宜解散火邪邪散則自能食

兵。是痘疹之治。當各有所重者如此。

(六) 疹期

出疹之候。初熱一日。至次日雞鳴時。其熱即止。止存五心微熱。漸見欬嗽。鼻流清涕。或腹中作痛。飲食漸減。到申酉之間。其熱復來。如此者四日。用手滿按髮際處甚熱。其面上熱少減二三。分。欬嗽連聲。面燥腮赤。眼中多淚。噴嚏頻發。或忽然鼻中出血。至五日。其熱不分晝夜。六日。早時。其疹出在兩頰下。細細紅點。至午時。兩手背並腰下及渾身。密密俱有紅點。七日。普遍振發。其鼻中清涕不流。噴嚏亦不行。七日晚。兩頰顏色漸淡。此驗出疹之要法。

凡疹熱六日而出。一定之規也。若醫人無識。用藥太早。耗散元氣。及至出時。變害多矣。或嗽而變喘。或出一二日。即隱。或作大瀉。或合目而喘。此醫人用藥不當之害也。吾家治法。定不在五

日內用藥。必待見疹方用。徐徐升表。然用藥亦有次第。凡一劑便作十餘次飲之。况疹在皮膚之間。若作一次服。則藥性催之太急。每致譫語煩躁。

葉評此服藥之理。疹屬肺。因肺藥不厭頻而少。非若景岳不論上下臟腑之分別。一概以大故當慎之。

○景岳曰。按此萬氏之法。謂醫人用藥太早。恐致耗散元氣。故必待見點而後施治。及作一次服。恐藥性催之太急。皆惟恐無益而反以致害。此固其心得之法也。然以愚

見。則醫有高下。藥有宜否。但使見有確真。發無不當。則於未出之前。或解或補。必有得預防之

葉評其毒在內。豈可潛消。必由表而出。此萬氏之高見也。

力。以潛消其毒者。在善與不善。或不嫌早與不早也。嘗見庸流之誤治者多。是誠不服藥為中醫也。此萬氏之說。

不可不遵也。

凡疹熱五六日必出矣。醫人用藥見不能散。父母見藥不效。醫人見熱嗽不能除。或以別證治之。主家又或更醫。此世之所以誤者多矣。

(七) 麻疹初熱

麻疹發熱之初。與傷寒相似。惟疹子則面頰赤。咳嗽噴嚏。鼻流清涕。目中有淚。呵欠喜睡。或吐瀉。或手搥眉目。面赤為異耳。但見此候。即是疹子。便宜謹避風寒。戒葷腥厚味。古法用升麻湯根湯。以表散毒邪。余製透邪煎代之更佳。或柴歸飲亦妙。葉評當歸大不宜服之必不妙但使皮膚通暢。腠理開。則疹毒易出。不可作傷寒。妄加汗下也。妄汗則增熱。而為衄血。歎血。為口瘡咽痛。為目赤腫。為煩躁乾渴。為大小便不通。妄下則裏虛。為滑泄。為滯下。經曰。必先歲氣。毋伐天和。言不可妄汗妄下也。

葉評看司天之氣并時令寒熱非言汗下之誤

凡疹初熱。疑似之間。切不可輕易用藥。總有他證。必待五日。腮下見疹。方可用升表之劑。嗽多連打噴嚏。鼻流清涕。或流鼻血。飲食減少。好飲涼水。只宜調理飲食。或麴食葷腥。一疹子初發時。未見出現。咳嗽百十餘聲不已。上氣喘急。面目胞腫。時卧時起。此火毒內蒸。肺葉焦舉。宜甘桔湯。合白虎湯。加牛蒡子。薄荷。主之。○如疹出之時。咳嗽口乾。心煩者。此毒在肺。發未盡也。瀉白散。加天花。連翹。玄參。黃連。主之。○一疹子欲出未出時。宜早發散。以解其毒。則無餘患。若不預解。使之盡出。多致毒蓄於中。或為壯熱。日久枯痺。或成驚癇。或為瀉痢。或為歎。

詳評
血喘促。或作疳蝕而死。此雖一時戾氣之染。然未有不由於人事之未盡也。

(八) 疹出沒

一疹子出沒。常以六時為準。假如子後出。午後即收。午後出。子後即收。乃陰生陽。陽生陰。造化自然之數也。凡此旋出旋收者。輕。若一出連綿三四日不收者。乃陽毒太甚。宜大青湯。或用荊芥牛蒡子甘草玄參石膏桔梗主之。○若逡巡不出者。乃風寒外束。皮膚閉密也。宜荊防敗毒散主之。○一疹已出而復沒者。乃風寒所逼而然。若不早治。毒必內攻。以致痔瘡而死。急用升麻湯。加荊芥牛蒡子甘草熱服。則疹必復出而安矣。○一發熱六七日以後。明是疹子。不見出。此必皮膚堅厚。腠理閉密。或為風寒所襲。或曾有吐瀉。皆能伏也。急用托裏散。春之劑。加麻黃湯。去杏仁。加蟬蛻升麻。外用胡荽酒之類。〔案〕若見吐瀉而疹不出。在景岳。○如一向未更衣者。必毒甚於內。伏而不出。局方涼膈散。加牛蒡子主之。○一疹子只怕不能得出。若出盡則毒便解。故治疹者。於發熱之時。當察時令寒暄酌而治之。○如時證大寒。以桂枝葛根湯。或麻黃湯發之。○時證大熱。以升麻葛根湯。或合人參白虎湯發之。○不寒不熱。以荊防敗毒散發之。○如兼疫癘之氣。以人參敗毒散發之。○如盡一劑不出。再作本湯服之。外用胡荽酒。又以苧麻蘸酒。遍身擦之。務令亟出。如三四作更不出。如腹中脹痛。氣喘昏悶。則死證也。○景岳曰。按此萬氏之法。極得隨時制宜之善。已盡發表之義矣。然發表之義。亦最不易。即如榮衛不足而疹有不能出者。其證甚多。若徒知發之。則榮衛有弱者。非惟不能發。而且恐窮其源矣。

葉辨又要用血藥發表之意

此○一疹毒出盡則邪氣解散正氣自然和平如發熱煩悶或嘔吐或泄瀉此毒邪壅遏尚未出盡也○煩熱者黃連解毒湯○嘔瀉者柴胡橘皮湯○並外用胡荽酒及苧麻擦法如前行疹子出盡則煩熱自去嘔吐自止矣○一疹有既收而餘毒未盡至三日之外又復發出或至五六次不已者此因發熱之時不避風寒致令邪氣鬱於肌肉之間留連不散雖曾解散終屬不暢耳若兼雜證亦當隨證治之

(九) 疹形色

凡看麻疹初出之法多於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而勻淨者吉也若色見通紅則疹發於心紅者火之正色也若疹色淡白者心血不足也養血化斑湯主之或四物湯加防風葉辨四物大非所宜色大紅或微紫者血熱也或出太甚者並宜大青湯主之或四物湯去川芎加柴胡黃芩乾薑紅花牛蒡子連翹涼血滋陰而熱自除所謂養陽之義亦五死一生之證也若黑色者則熱毒尤甚而十死一生之證此尤不可不明察之而混為施治也

凡疹初出色赤者毒盛之勢也但大便調咳嗽多右手一指脈輕重取皆有力雖勢重不碍但當隨證調理若嗽少右手一指脈無力雖三日後收其渾身疹瘡變為紫色壅結於皮膚之間若用解利之藥其色漸轉紅色嗽多流涕頗思飲食者生若投二三劑難變者難療也

(十) 疹涕

凡出疹至二三日。必兩鼻俱乾。待收完看毒氣輕者。清涕即來。就思飲食。此不必服藥。若清涕來遲。不思飲食者。須要清肺解毒。必俟清涕出。方可不用藥。

(二) 疹吉凶

或熱或退。五六日而後出者。輕。透發三日而漸沒者。輕。淡紅滋潤。頭面勻淨而多者。輕。頭面不出者。重。紅紫黯燥者。重。咽喉腫痛不食者。重。冒風沒早者。重。移熱大腸變痢者。重。重黯乾枯。一出即沒者。不治。鼻扇口張目無神者。不治。鼻清糞黑者。不治。氣喘心前吸者。不治。

(三) 總論治法

一、疹喜清涼而惡濕。痘喜溫煖而惡涼。此固其大法也。然亦當有得其宜者。如疹子初出。亦須和緩則易出。所以發苗之初。只要發出得盡。則疹毒便解。非若痘之苗而秀而實。而後毒解也。痘子成熟之時。若太溫熱。則反潰爛不收。是痘之後。亦喜清涼也。故治痘疹者。無過熱。無過寒。必溫涼適宜。使陰陽和平。是為得之。○一、痘宜內實。可用補劑。疹忌內實。只惟解散。惟初熱發表時。略相似耳。既出之後。痘宜補氣以生血。疹宜補陰以制陽。何也。蓋疹熱甚。則陰分受其熬煎。而血多虛耗。陰金被尅。故治以清火滋陰為主。而不可少動其氣。若燥悍之劑。首尾皆深忌也。世知痘疹所係之重。而不知疹之殺人尤甚。方書多忽而不備。良可太息也矣。○一、斑疹之毒。皆由於火。內經曰。赫曦之紀。其病瘡瘍。故或遇二火司天。或司運之歲。肺金受制。感而發者居多。輕則如蚊迹之狀。或壘腫於皮膚之間。名曰癰疹。重者如珠點紅暈。或片片如錦紋。名

曰斑疹。大抵色赤者吉。色黑者凶。其證似傷寒發熱。凡三四日而出。七八日而屬也。凡此之類。皆屬邪熱治之之法。惟辛涼解利而已。即若吐瀉。亦斷不可用溫補也。如豈薏乾薑之類。切勿輕用。而初發之時。尤不可大汗。只用升麻葛根透邪煎之屬。微表之耳。故用宜斟酌。有不可一概取必也。○一標出不紅現。而發熱轉甚。或頭痛身痛煩躁者。升麻湯。或透邪煎。○一色赤稠密。身痛煩躁者。升麻湯。加紫草連翹。○一寒熱併作。頭痛背強者。升麻湯。加羌活防風連翹。○一頭項面腫。升麻湯。加牛蒡子荊芥。若脈強火盛熱渴者。宜清降其火。以白虎湯加減用之。○一自汗煩渴。氣壅脈數者。化斑湯。○一身熱煩渴泄瀉者。柴芩湯。或四苓散。如夏月益元散。○一熱甚小便赤澀。譫語驚恐者。導赤散。四苓散。加辰砂。葉註四苓散內有白朮不宜用。夏月益元散加辰砂。○一咳嗽甚者。二母散。麥門冬湯。清肺湯。○一喘者。小柴胡湯。去人參。加五味子。葉註喘要虛實。邪火未清者。五味不宜用。小柴胡亦非治喘之方。○一熱甚鼻衄。或便血溺血熱甚者。黃連解毒湯。血甚者。犀角地黃湯。○一傷食嘔吐。六君子湯。加藿香乾薑。或減去人參。熱甚嘔吐者。解毒湯。○小便不利而嘔吐者。四苓散。一二日不通者。導赤散。葉註四苓與導赤同是利小便之方。而各有分別。如濕邪傷脾而泄赤導心火下降也。景岳尚有不明之處。○一大便秘結。發熱身痛者。大柴胡湯。腹脹氣喘者。前胡枳殼湯。○一咽喉不利。甘桔湯。兼風熱咳嗽者。加防風。○一寒熱往來似瘧。小柴胡湯。如兼咳嗽。去人參。○一壓後身熱不除者。葉註宜加杏仁桔梗。前胡桑皮之類。去人參不致。升麻湯。或去升麻。加黃芩黃連。各酒炒用。○一下痢赤白腹痛者。黃芩芍藥湯。或加枳殼。身熱腹痛者。解毒湯。○一餘毒未盡。變生癰疽瘡瘍者。

升麻湯加防風荊芥牛蒡子。

葉評尚宜清火解毒。

景岳曰。按以上萬氏治疹諸條。皆極詳妥。然其中惟瀉痢氣喘二證。則最多疑似。蓋二證之由疹毒。固當如其治矣。然有不因疹毒者。如俗醫但見其疹。無不概用寒涼。不知有可涼者。有不可涼者。其有脾氣本弱。而過用寒涼。或以誤食生冷。致傷脾胃。而為泄瀉者。亦多有之。此一證也。雖曰由疹而發。而實非疹毒之病矣。但察其別無熱證。熱脈而兼之色白。氣餘者。便須速救。脾氣急從溫補。宜溫胃飲。五君子煎。胃關煎之類。主之。若執謂疹毒不可溫。則無不危矣。此醫之當知本也。又如氣喘一證。大有虛實。蓋十喘九虛。葉評甚言虛者多。亦不可執此說。若察其本非火證。又非外邪。而或以大瀉。或以大汗。而致喘者。必皆氣脫之候。此非六氣煎。或貞元飲。必不可也。貞元飲。但有歸地血藥。大瀉與大汗而喘者。參芪朮為主。凡此二者。皆不可不加細察。而或者以氣促作氣喘。則萬萬大誤矣。又痘瘡總論中。有因人因證之辨。與此麻疹。實同一理。所當參閱。故不可以麻疹之邪。悉認為實火。而不知虛火之為害也。

徐東皋曰。痘難疹易之說。此俗談耳。其有胃氣原弱。所感入深。又或因瀉痢而發。有不快。或發之未透。而隨現隨隱。久之邪氣漸入於胃。必瀉泄不已。出而復出。加之喘促。則必危矣。凡若此者。又豈可以易言哉。所以但有出疹。若見虛弱。急當先補脾胃。其有欲出不出。急當托裏發表。以助之。且首尾俱不可瀉。一如痘證同也。

(三) 疹禁忌

凡疹瘡發表之後。紅影出於肌膚。切戒風寒生冷。如一犯之。則皮膚閉密。毒氣壅滯。遂變濕身青紫。而毒反皮攻。煩燥腹痛。氣喘悶亂。諸證作矣。欲出不出。危亡立至。醫家病家。皆不可不慎。一疹瘡之證。全在調治。禁忌如雞魚。炙煔。鹽醋。五辛之類。直過七七之後。方可食之。惟宜食淡。不可縱口。致生他疾也。若誤食雞魚。則終身皮膚粟起。如雞皮之狀。或遇天行出疹之時。又令重出。誤食豬肉。則每歲凡遇出疹之月。多有下利。誤食鹽醋。致令欬嗽。則每歲疹之月。必多欬嗽。誤食五辛之物。則不時多生驚熱。此痘疹之家。皆所當慎也。

(四) 疹發熱

疹瘡非熱不出。凡疹子欲出。必遍身發熱。或煩燥。或頭眩。或身體拘急。及既出。則身體便涼。諸證悉解。此一層疹子。隨即收者。極輕者也。如疹子既出。而熱甚不減。此毒盛者也。宜大青湯解其毒。便澀者。宜黃連解毒湯。合白虎湯。或大連翹飲。解其裏。大便不通者。局方涼膈散。加牛蒡子主之。

(五) 疹喘嗽

凡疹證多嗽。此頓出頓入之勢也。但有疹毒。須假嗽多而散。故疹後旬日之內。尚宜有嗽。切不可見嗽多而治嗽也。宜慎之。疹證屬肺與脾胃。肺受火邪。則嗽多。嗽多則頓出體面。并及四肢。大腸受火邪。則上連脾胃。而為泄瀉。若早瀉則嗽必減。而變為喘。蓋喘嗽二者。皆屬於肺。然嗽實喘虛。得嗽者出。得喘者入。

入則合眼多痰胸滿腹脹色白而毒不盡出證則危矣此證之宜嗽不宜喘而最不宜於泄瀉也

(一六) 疹吐瀉

凡疹子初起發熱吐利純是熱證不可作寒論此乃火邪內逼上焦則多吐下焦則多利連焦則吐利並作自利者宜黃芩湯吐利者宜黃芩湯加半夏二錢生薑三片自利裏急後重宜黃連解毒湯合益元散凡疹出一二日或三四日忽然大瀉嗽多者用升表之藥加以分利治之若瀉而兼喘復見悶亂搖頭者凶

一麻疹現後大便下膿血或因泄瀉而變成膿血者或徑自利者但看瘡疹出多而色紅又多嗽者只宜表疹俟其收後方宜解毒兼治其痢○一疹之初起最忌泄瀉然亦有始終泄瀉而不妨者稟之強弱異也若因瀉嗽減而變為喘者則危矣詳前喘嗽條○一身熱煩渴泄瀉者柴芩湯四苓散如熱甚或夏月益元散○一疹後作痢亦有看手咬指甲撕口唇皮及咬人等證當以解毒分利藥治之若所下稠涎紅白相兼者務要用解毒之藥○若晝夜有三五十次漸減至二三次或漸多嗽右手一指脈漸起清涕復來者方可望生○若痢變煤色或成屋漏色或如青菜色肛門如筒喘促音啞飲食不進午後腮紅皆不治

景岳曰自古方書凡發揮未盡及用治未當者間亦有之而惟於泄瀉一證則尤其為最何也蓋古人以泄瀉為熱者什九故多用河間黃芩芍藥湯為主治之要藥邪熱下利若作脾胃虛弱論必而不知凡屬泄瀉最多脾腎虛寒也以脾腎並講用藥必以脾腎並治大凡補腎不利



脾胃因凝滯滑潤也。即如出疹一證。雖有由疹毒而瀉者。然果係實熱。多不作瀉。但致瀉者。率由脾胃之弱。若但知清火解毒。脾胃必日敗。而漸成屋漏青菜色。及氣促絕食不治之證矣。葉氏此證邪傷其陽。而白景岳每每誤認。而用熱補大錯。關頭病而至此。豈猶熱耶。總屬誤耳。故凡治泄瀉者。即雖是疹。亦必察其有無邪熱。如無熱證。熱脈即當於痘瘡泄瀉條求法治之。葉氏評疹因脾胃受熱而起。熱邪下流大腸。則瀉若疹後日久。當以調補脾胃。若初起斷不可認為脾虛也。庶最危者。可望其生也。故余於諸法之外。而獨言其要者。有如此。

(一) 疹飲食

凡出疹者。多有五六日不飲食。此胃為邪氣所侵。亦為邪氣所養。故不食亦不妨。切不可著意治之。只宜治疹。疹瘡出盡。毒氣漸解。即思飲食。尤不可與麪食。雖用粥飲。每次只可少與。候氣清神爽。身全不熱。漸漸加添。但宜少而頻也。

凡出疹之先。平昔過用麪食者。或胃氣漸開。即思飲食。而用早者。因動胃火。或正出時。吃麪食者。以致清涕不來。身體作熱。兩眼看手。咬指。搥鼻。撕口唇皮。及撕眼剗毛者。此皆疹後食復之病也。當清肺解毒。加消導之劑治之。

(二) 疹飲水

凡患疹之人。不拘大小。自起至收。必皆喜飲涼水。此不必禁。但宜少不宜多。宜頻不宜頓。則毒氣隨之解散。

(元) 疹渴

凡疹子渴喜飲水。純是火邪。肺焦胃乾。心火內亢故也。初熱發渴者。升麻葛根湯。加天花粉。麥門冬。渴甚者。人參白虎湯。合黃連解毒湯主之。

(二) 疹汗衄

凡疹子發熱。或自汗。或鼻衄者。不須止之。此亦散越之義。汗者毒從汗散。衄者毒從衄解。但不可太過。如汗太多。人參白虎湯。或合黃連解毒湯。衄太多者。元參地黃湯。

(二) 疹躁妄狂亂

凡疹有初熱。而見煩躁謔妄狂亂者。宜麻葛根湯。調辰砂益元散主之。○一疹收之後。餘熱未盡。日夜煩燥。謔語狂亂者。辰砂益元散。用燈心湯調下。或四苓散加燈草。黃連黃芩。調水飛硃砂五分主之。

(三) 疹咽痛

凡疹咽痛。亦是常候。乃火毒上熏而然也。勿以喉痺同論。妄用針刺。蓋此非喉痺癰腫。原無惡血可去也。痘疹喉病。只是咽乾作痛。宜甘桔湯加牛旁子。或射干鼠黏子湯。細細嚥之。更以玉鑰匙吹之。

(三) 疹唇口瘡

凡出疹之先。或有胃火。及出疹之後。餘毒不散。此熱毒收於牙齦上下。故並唇口生瘡。每日用溫米泔水洗十次。急用解毒之藥治之。若或失治。多變走馬疳也。



(二) 疹腹痛

凡疹初熱一日至六七日之間。多有腹痛之證。此大腸之火鬱於皮竅之中。故作腹痛。俱不可認作傷食。用消導之藥。或以手揉。俱能致害。但解疹毒。毒散則腹痛自止。最宜慎之。

(三) 疹後諸證

凡疹後餘毒未盡。隨當解之。若停留日久不解。則必致喘嗽。或喉中痰響。或為四肢冷痺。或目無光彩。面色青白。或鼻孔如烟筒。或嗽聲不出。若右手一指脈。輕取散亂。重按全無。則成難治之證矣。

一、疹子收後。身有微熱者。此虛熱也。不須治之。待血氣和暢。其熱自退。若熱勞太甚。或日久不退。宜用柴胡麥門冬散。甚則黃連解毒湯。合人參白虎湯。○一疹後熱不退。而髮枯毛豎。肉消骨立。漸漸羸瘦。為骨蒸勞瘵之證者。宜萬氏柴胡四物湯主之。或蘆薈肥兒丸主之。加當歸連翹治之。遲則變證為睡則露睛。口鼻生冷。手足厥逆。遂成慢脾風。瘵癰不治之證矣。○一疹後熱不除。忽作搐者。不可以急驚風同論。宜導赤散。加人參麥門冬。送七味安神丸。小便清者可治。短少者難治。如見多痰。或用抱龍丸。或以四物湯。加麥門冬。棗仁。淡竹葉。甘草。龍膽草。黃連。茯苓。辰砂。石菖蒲之類治之。或以此藥為末。用蒸餅猪心血為丸。服亦可。○一疹退後。多有秋嗽之證。若微嗽不已者。此餘毒未盡也。用清肺飲。加生甘草。牛蒡子主之。○若嗽甚。氣逆。發而不已者。此肺中伏火。金虛葉焦也。宜清肺飲。或清肺湯。合人參白虎湯。六一散之類主之。○若

身熱頓嗽。甚至飲食俱噎。出或咳出血。皆熱毒乘肺而然。宜多用麥冬清肺湯。或加連翹。或清金降火湯主之。○若欬甚而面浮目腫。胸高喘急。血出口鼻。面色青赤。昏躁搖頭者。死證也。又有肺氣本虛。為毒所逼而發喘不已。但無嗽血。噎食等證者。宜用清肺飲。倍加人參治之。不可拘於肺熱之說。而純用清肺解毒之藥也。○一疹後餘熱未盡。或熱甚而失血者。四物湯加茵陳。木通。犀角。以利小便。使熱氣下行。則愈。若血在上者。去川芎。○一疹後餘毒入胃。久而不散。以致牙齦黑爛。肉腐血出。臭氣衝人者。名為走馬疳。用馬鳴散主之。甚者急用人中白蘆。使君子。龍膽草。黃連。五靈脂。浸蒸餅為丸。滾水服之。以清胃火。○若面頰浮腫。口青黑。齒脫。唇崩鼻壞者。死證也。○一疹退之後。飲食如常。動止如故。乃卒然心腹絞痛。遍身汗濕如水者。此因元氣虛弱。失於補養。外雖無病。裏實虛損。偶然為惡氣所中。謂之中惡。此朝發夕死之證。

(六) 附麻疹

痘之外有疹。疹之外又有麻疹。麻疹者。亦疹之類。即斑疹也。但正疹則熱至五六日而後一齊湧出。出皆粒粒成瘡。非若麻疹之皮紅成片也。且麻疹之出。則不拘三四日。以火照之。遍身如塗朱之狀。此將出之兆。出則細碎。皮紅成片。如蚊蚤之迹者。即麻疹也。亦或有五六日始出。出而又沒。沒而又出。不過一周時許。世俗謂一日三出。三日九出。後方齊出透徹。然亦有不拘者。只三日間。從面至胸背手足。隨出隨沒。然則要出透。以遍身紅潤者為美。重者遍身膨脹。眼亦封閉。色有赤白微黃不同。只要紅活。最嫌黑陷。及面目胸腹稠密。纏鎖咽喉者為逆。發不出而