

正體類要目錄

卷之上

正體主治大法

撲傷之症治驗

墜跌金傷治驗

湯火所傷治驗

卷之下

方藥

正體類要目錄終

正體類要卷之上

古吳薛 已著

後學顧凌霄校

正體主治大法

一脇肋脹痛若大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺
也用小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大
便不通喘咳吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散
通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土
肝火既熾肝血必傷脾氣必虛宜先清肝養血則

瘀血不致凝滯肌肉不致遍潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易生若行剋伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

一肚腹作痛或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胸脇反痛肝血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也用四物參朮補之既下而惡

寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發
熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下而泄瀉脾腎
傷也用六君肉果破故紙補之若下後手足俱冷
昏憤出汗陽氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足俱
冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯
口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞症也
急投大劑參附湯多有得生者

一肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋

骨作痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血

作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預爲調補脾胃則無此患矣

一作痛若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當生肝血補脾氣

一青腫不消用補中益氣湯以導氣腫黯不消用

加味消遙散以散血若癰腫脹痛癰毒生作膿也以
八珍湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以
十全大補湯補之若骨節接而復脫肝腎虛也用
地黃丸腫不消青不退氣血虛也內用八珍湯外
用葱熨法則瘀血自散腫痛自消若行血破血則
脾胃愈虛運氣愈滯若敷貼涼藥則瘀血益凝內
腐益深致難收拾

一發熱若出血過多或潰膿之後脉洪大而虛重
按全無此陰虛發熱也用當歸補血湯脉沉微按

之軟弱此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁
肉瞶筋惕亡血也用聖愈湯如汗不止血脫也用
獨參湯其血脫脉實汗後脉躁者難治細小者易
治外臺秘要云陰盛發躁欲坐井中用附子四逆
湯加葱白王太僕先生云凡熱來復去晝見夜伏
夜見晝伏不時而動者名曰無火此無根之虛火

也

一作嘔若因痛甚或因尅伐而傷胃者用四君當
歸半夏生薑或因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加

山梔茯苓若因痰火盛用二陳薑炒黃連山梔若
因胃氣虛用補中益氣湯生姜半夏若出血過多
或因潰後用六君子湯加當歸

一喘咳若出血過多面黑胸脹或胸膈痛而發喘
者乃氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲若咳血
吐血者乃氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加
山梔苓連蘇木

一作渴若因出血過多用四物參朮如不應用人

參黃芪以補氣當歸熟地以養血若因潰後用八

珍湯若胃熱傷津液用竹葉黃芪湯胃虛津液不足用補中益氣湯胃火熾盛竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋瀝乃腎經虛熱非地黃丸不能救

一出血若患處或諸竅出血者肝火熾盛血熱錯經

而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱

血無所附而妄行用加味四君子湯補益中氣或

元氣內脫不能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如

不應急加附子或血蘊於內而嘔血用四物加柴

胡黃芩凡損傷勞碌怒氣肚腹脹悶誤服大黃等

血積血則

言

血積血則經隧失職

血傷陰絲

脾肺亦有生者但

此理不用此法惜

一手足傷損若元氣不戒房勞或妄行攻

伐致死肉上延或腐而不痛黑而不脫者當大補

元氣庶可保生若手足節斷去者無妨骨斷筋

連不急剪去若侵及好肉則不治若預爲調補脾

氣則無此患大凡膿瘡內燉者卽針之而投托裏

散或口噤遺尿而似破傷風者急用十全大補湯

加附子多有生者

一腐肉不潰或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而不潰用八珍湯若因尅伐而不潰者用六君子湯加當歸其外皮黑堅硬不潰者內火蒸炙也內服八珍湯外塗當歸膏其死肉不能潰或新肉不能生而致死者皆失於不預補脾胃也

一新肉不生若患處天白脾氣虛也用六君芎歸患處緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血處也用十全大補湯膿稀白而不生者脾肺氣

虛也用補中益氣湯膿稀赤而不生者心脾血虛
也用東垣聖愈湯寒熱而不生肝火動也用加味
逍遙散晡熱而不生肝血虛也用八珍牡丹皮食
少體倦而不生脾胃氣虛也用六君子湯膿穢而
不生者陰虛邪火也用六味地黃丸四肢困倦精
神短少而不生者元氣內傷也用補中益氣湯如
夏月用調中益氣湯作瀉用清暑益氣湯秋令作
瀉用清燥湯

一傷重昏憤者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可

下急用花薤石散內化之恐因瀉而亡陰也若元氣虛甚者尤不可下亦用以前散化之凡瘀血在內大小便不通用大黃朴硝血凝而不下者急用木香肉桂末三二錢以熱酒調灌服血下乃生如怯弱之人用硝黃須加肉桂木香同煎假其熱以行其寒也

一大便秘結若大腸血虛火熾者用四物湯送潤之若腎虛火燥者用六味地

在氣湯

加傷甚內肉已壞

膿固速荷

非補劑壯其根本

以外非近轉滯其

瘀穢良肉不無傷

輕外皮破傷者但宜

當歸膏敷貼更服四

苓連柴胡山梔白朮茯苓

又丁癰不結傷肉不潰死血自散腫痛自消若

行菴貼則醞釀瘀毒矣

一跳躍提胃閃挫舉重勞役恚怒而胃腹痛悶喜

手摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸者

肝經血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胸脇
作痛發熱嘔熱肝經血傷也用加味逍遙散若胸
脇作痛飲食少思脾氣傷也用四君芎歸柴梔
丹皮若胸腹脹滿食少思肝脾氣滯也用六君

加柴胡芎歸若胸腹不利食少無寐脾氣鬱結也
用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳
白朮芎歸梔子青皮若咬牙發搐肝旺脾虛也用
小柴胡湯川芎山梔天麻釣藤釣或用風藥則肝
傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛肝火愈

熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血少壯者必
爲痼疾老弱者多致不起

一破傷風河間云風症善行數變入臟甚速死生
在反掌之間宜急分表裏虛實而治之邪在表者
則筋脉拘急時或寒熱筋惕搐搦脉浮弦用羌活
防風湯散之在半表裏者則頭微汗身無汗用
羌活湯和之傳入裏者則舌強口噤項背反張筋惕
搐搦痰涎壅盛胸腹滿悶便溺閉赤時或汗出脉
洪數而弦以大芎黃湯導之既下而汗仍出表虛