

共六本

幼幼集成
風



鼎錄幼幼集成卷之三

羅學陳復正飛霞氏輯訂

廬陵劉勳家孟氏

校正

遂陽周宗頤虛甫氏

審定

金谿周光霽頤篁氏

重校

○咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也
又曰邪在肺則病皮膚癢寒熱上氣喘汗出欬動肩背○夫
肺爲華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必出之路故專主
氣經曰形寒飲冷則傷肺由兒衣太薄及冷飲之類傷於寒
也經曰熱傷肺由兒衣太厚愛着過溫傷於熱也又曰皮毛
者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下逆

而不收克塞咽隘故令咳嗽也

凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽肺溼動也有聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾溼也在小兒由風寒食不慎而致病者尤多矣經曰五臟六腑皆令人發熱必肺腑各受其邪而與之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者咳爲重主治在肺以時而言之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬胃火午後嗽者屬陰虛腎嗽者火浮於肺三更嗽者食積滯於三焦肺實者頻嗽抱背面赤反食肺虛者氣逆虛鳴面白飧泄肺熱者痰腥而稠身熱喘滿鼻乾面紅手捏眉目肺寒者嗽多痰清面白而喘惡風多涕故治者各因其虛實寒熱而調之斯無誤矣

因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻寒聲重宜參蘇飲微將
之○咳而氣逆喘嗽面白有痰此肺本經病宜清肺
葶藶丸微利之○咳而喉中介介有聲面赤發熱宜
喉痛聲啞者此肺病兼見心證宜清寧散咽喉痛者
咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼脾證
大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘皮湯
咳而面青多怒痰涎壅盛而發搐者蓋因咳嗽聲不能轉所以
瞪目直視此肺病兼見肝證宜集成金粟丹咳而面色闇黑
久咳而吐痰水此肺病兼見腎證宜六味地黃丸加麥冬五
味○咳而聲不出口鼻出血者此氣逆血亦逆也須順氣寧
嗽爲主人參冬花膏○咳而久不止並無他證乃肺虛也只

宜補脾爲主人參五味子湯○咳而胸高骨起其狀如龜者
謂之龜胸此肺熱之極陽火熏蒸而致也清燥救肺湯○咳
而日久胸前疼痛口吐膿血腥臭者此肺火壅盛已成癰
桔梗湯治不如法其證多死○凡咳嗽痰涎壅集氣喘并
而作喘者多難治故頭搖目上視及閉目呻吟手足攣舞肩
抬胸突喉中痰鳴口噤不乳喘而手足冷者皆死證也

○入方

人參敗毒散 此方辛平升散爲咳門第一神方舉世少有知
者凡有咳嗽無論內傷飲食外感風寒夾溼夾毒不拘男婦
大小胸緊氣急咽痛口苦痰不相應卽用此方升散之或感
冒重者服此其咳聲啞不知者以爲藥不相符棄而勿服不

知正是升散之力佳兆也再服之漸次輕減不拘劑數只以
 痰應為度聲嚮寒出其效也枯燥之人數劑之後略加沙
 參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰無不愈著有
 叮嚀凡咳嗽初起切不可誤用寒涼及滋陰之藥其
 為害不小但辛散為先着俟痰應之後漸加滋陰則得矣
 官揀參五七分芽桔梗二分正川芎錢一白雲苓錢一陳枳殼錢一
 信前胡錢一羌活分五獨活分五北柴胡錢一南薄荷錢一
 荆芥穗錢一北防風錢一淨連翹錢一炙甘草分五
 生薑二片為引水煎半饑服每日二劑
 參蘇飲 治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛此方不如前方用
 之多不效姑存之

中國醫藥大學圖書館藏

一官揀參錢五白雲苓錢一陳枳殼錢一法半夏錢一信前胡錢一

一芽桔梗錢一老蘇葉錢一粉乾葛錢一真廣皮錢一炙甘草錢五

生薑三片葱白三寸水煎溫服取微汗本方有廣木香

清肺飲 治氣逆而咳面白有痰

信前胡錢一北柴胡錢七桑白皮錢五陳枳殼錢一淨知母錢一

川貝母錢一南薄荷錢七白雲苓錢一白桔梗錢一金井膠錢一

大麥冬錢一荆芥穗錢一炙甘草錢五水煎熱服切忌油膩

蘇蘇丸 治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽

甜葶藶錢一去土隔炒黑牽牛錢一炒光杏仁錢一去皮尖炒錢一漢防己錢一

右藥等分爲細末入杏仁泥和蒸棗糊爲丸如櫻桃之類細研七

丸薑湯化下量兒大小再服之神效



此九因乳食傷脾痰甚著及壯實小兒可用之苟不因乳食

所傷并怯弱者本方云牽牛易家蘇子等分炒研為丸效

清寧散 治心肺有熱而令咳嗽宜從小便利出

桑白皮 燐甜葶藶 赤茯苓 炒酒車前子 炙甘草

右為細末每服五分生薑大棗煎湯調服

集成沉瀝丹 方見二卷胎熱門

橘皮湯 治咳嗽痰甚嘔吐

法坐夏錢白雲苓錢真廣皮錢旋覆花錢北細辛五

官揀參分五芽桔梗錢陳枳殼錢炙甘草分五

生薑三片大棗一枚水煎徐服

集成金粟丹 方見二卷類摘門

力力集成



六味地黃湯 方見一卷胎前

人參多花膏 治氣逆咳血痰帶見血

官揀參錢一天門冬錢一麥門冬錢一款冬花錢一川貝母錢一

桑白皮錢一金井橘錢一片枯苓錢一白當歸錢一北五味錢一

炙甘草分五 右為細末煉蜜為丸龍眼核大每一丸湯下

人參五味子湯 治久嗽脾虛中氣怯弱面白神白此神方也

官揀參錢一漂白朮錢一白雲苓錢一北五味分五杭麥冬錢一

炙甘草分八 生薑三片大棗三枚水煎溫服

清燥救肺湯喻嘉言製 治諸氣膈鬱諸癆喘嘔皆屬肺之燥也

鮮桑葉經霜者得金氣而柔潤炙甘草和胃生熱石膏藥兩

氣極清肺熱不凋取之為君用二錢官揀參生胃之津養胡麻仁炒真阿膠分八杭

用一錢二分肺之氣七分

麥冬

去心一分

北杏仁

泡去皮尖炒黃七分

枇杷葉

一片刷去毛蜜塗炙黃用

水

一碗煎六分

頻頻分

二三次服

痰多加川貝母

瓜蒌仁

虛加生地黃

熱甚加犀角羚羊角

桔槓湯

治肺癰出膿而

芽槓槓

錢一

白當歸

錢一

川貝母

錢一

瓜蒌皮

錢一

漢防已

錢一

光杏仁

五分

陳枳殼

錢一

薏苡仁

錢一

生黃耆

錢一

鮮桑葉

錢一

潤玄參

錢一

用蘆薈嫩根

三錢

為引水煎服

○百晬嗽論

凡乳子百晬內有痰嗽者謂之百晬嗽或出胎暴受風寒或浴

兒為風所襲或解換襦裳或出懷喂乳而風寒得以乘之此

病由外來者或乳汁過多吞嚥不及而噎者或啼哭未定以



乳哺之氣逆而嗽者此病由於內生者竟能爲嗽前汗下
之劑難於用之以其胃氣方生不能勝藥故也故曰百晬嗽
難醫然雖曰難醫正未嘗曰不醫之治此未爲不多其用
藥之治有案在後復有不治之治更爲捷徑而又百晬嗽
但須乳母聽戒治之無難凡遇百晬嗽先用荆防敗毒湯
劑母子同服服完正藥惟令乳母忌口凡葷酒油膩醃醃
鹹薑椒辛辣青菜麪食之類一槩屏絕惟用香茶白飯少佐
橘餅登時止嗽至重者不過十日八日得哺清

○附案

遂陽明經高君作梅翁與公弟雲軒翁同於甲寅五月舉子然

黃耆桑之稟胎元怯弱於七月間兩兒同患百啞嗽予謂雲
翁曰公郎面白唇淡白眼帶青嗽聲連續痰不相應此肝風
有餘肺氣不足雖有喘嗽未可以常法治之設按風清肺
適足益燥傷陰不特嗽不能愈而證必加重雲翁深以為然
乃投入參五味子湯其應如響四劑全瘳計用人參五錢大
分作翁者其體更弱外候面白眼青目汗多嗽滿頭青筋
門寬大因謂之曰令姪正同此證已服補脾保肺之劑愈矣
公即中氣更虛速宜用參始不費手適有老嫗專挑馬牙者
從內阻之復有醫者從外阻之乃言不可用參服參則不可
治且云未見百日之兒敢用參者老嫗更囑其母曰道翁丸
藥切不可服其中多有人參服之為害不淺其母聞之以為

誠然於是視予藥如砒毒矣作翁因素艱嗣息莫能主張於
予言似有陽是陰否之意予見其遲疑不決亦不敢強始聽
之此醫曰一診視自七月下旬治起直至十月初旬作翁復
府考貢其病愈治愈危竟至於奄奄一縷而逆證叢生無可
救藥醫者束手之策老嫗緘口無言皆絕迹不至矣又入軍
無所倚仗復懇於予嘆曰早聽予言何有今日乃入診視
見其面目如藍形體惟皮束骨聲啞無音咳嗽氣促而汗淋
漓四肢搐掣逆證全具毫無生機因不忍釋手詳爲審視惟
兩目神光尚存予曰生機或在是乎遂以大參一枝天員五
粒蒸湯與服初服小半予爲抱之環坐室中審其呼吸之息
氣雖未減而亦不見其增卽與服完良久覺氣稍順予喜曰

得之矣遂用大參二錢炙貝肉七粒蒸湯服之竟獲大效是
夜汗滴俱止喘嗽略亦輕減勞苦於人小體弱卽二錢之參
湯亦須一夜方能服完乎此時行功習靜數載參湯之功
終久無眠竟與抱之晝夜不一釋手醒卽予服服後仍睡數
日之後則鼾聲如雷睡眠極穩呼吸極長予知爲氣脈神歸
之效如此者十晝夜諸證已愈八九惟形色未復有聲未定
予曰功程雖半未敢暫停參須倍之於是每日大參四錢天
員十四粒如前調理計前後二十晝夜共用官棟六兩有零
始奏全績於是聲音清亮面色紅融肌肉復生精神勝舊今
已長成儼然美丈夫矣而且聰明特達經史皆通他日翱翔
奚能限量如此之證如此之治不特世人永見醫家未聞卽

諸書亦所未載半週乳子而用六兩之參起沉痾於萬難之日苟無定識者未必有成故拜懇同道但須認證真確不必拘泥古方神而明之存乎人耳

或問二證皆百晬嗽何以以前證用藥而後證獨用參者何也曰各有理焉前證在七月開正肺金旺時爲風邪傷其氣他臟無涉故以四君子補脾生脈散保肺收其耗散之金得返清肅之令中氣一回應手而愈後證自七月起至於十月金已退氣正當水旺木相之時由腎水無源所以肝木失養誠母病子傷故面目俱青手足搐掣此非肝強實肝敗也內經有善則不見惡則見之言顯然可證在常俗之輩見其搐掣又必爲之驚化痰截風定搐矣誰復爲之保

固真元維持竭絕哉不知此等之症陰陽兩敗臟腑俱傷
非大力之品莫可挽回所以屏去雜藥獨用人參之甘潤天
員之甘潤味極純正飼之兒喜況人參之力能陰益陰在陽
益陽榮衛氣血精神怠智無不補者而且晝夜不輟則元
陰受其長養之功烏得不效又曰初服卽效而必待至七之
日始奏全績者何也曰剋削過傷枯燥已極如旱苗焦槁
而無裨必淙淙潤澤始可盈科至於三七之久天地來復之
機業已三至人身榮衛已周一千五十度升降有恆神氣已
足不藥之慶奚復何疑此等之治非謂世之嬰兒一有咳嗽
便當用參第稟受先虧胎元怯弱者有不得不用之勢獨惜
前醫偏執已見卽數分之參斷不肯用孰知用至六兩之多

始收全效可見辨證不真誤人非淺故筆此以為擇醫者勸

○咳嗽簡便方

小兒咳嗽聲不出者紫苑微炒研末杏仁去皮尖研如泥等分

煉蜜為丸芡實大每服一九北五味七粒煎湯化服

肺實咳嗽痰喘葶藶子隔紙炒為末棗肉為丸龍眼核大每服

一九白湯化服○咳嗽多痰葶藶子隔紙炒知母微炒各五

錢研末砂糖為丸芡實大每服一九白湯化下

小兒咳嗽發熱自汗吐紅脈虛無力人參切片焙乾天花粉切

片酒炒等分為末每服五分蜜湯調服以瘥為度

秋天肺燥咳嗽無痰北沙參一味每服五錢淨水濃煎熱服

小兒自晬嗽痰壅喘咳川貝母五錢淡薑湯潤溼飯上蒸爛有