

瘍科綱要卷下

嘉定張壽頤山雷甫述

第四章 膏丹丸散各方

第一節 退毒丸藥方

蟾酥退毒丸 治瘍患初起。不論大小各症。陰發陽發。宣通經絡。行氣活血。消散退腫。解毒定痛。以神。○惟頭面疔毒忌之。

製香附^g

西羌活^g

當歸全^g

川對肉^g

各^g

生遠志肉^g

牙

明腰素^g

白明礬^g

各^g

廣



地龍。去淨泥垢。炒鬆布焦。六錢。穿山甲
片。炙透。藏紅花。上麒麟竭。鴨嘴膽。各
各半。滴乳香。淨沒藥。各去油淨各八錢
真輕粉。淨者。二。上西牛黃。大梅片。當
門麝香。各半。右各為細末。和勻。另用真杜松
酥。牙半汾酒浸化。同拌丸。如小棗豆大。辰砂為
衣。小症每服分許。大症須服一錢至一錢五
分。如初起痼痛堅腫。能飲酒者。用熱黃酒吞丸。不

能飲者。當歸木香煎湯送服。須回圖吞。不可嚼碎。
如腫痛已甚。勢欲膿者。亦可服。但少減之。即膿
成後。回圖餘塊尚堅者。亦可服。以消盡堅腫為度。
〔方鮮〕外科之有蟾酥退毒丸。舊矣。然其方頗雜。殊未
易效。以黃牆朱氏改定之方。家傳五世。治瘍頗負時
名。消毒退腫。以此丸為必用之藥。輕症則三丸五丸。
大症則重用之。壽頤於庚戌八月。在滬上治一婦人。
腰疽大痛。形已高突。背脊痠楚異常。勢有蒸膿之狀。



知是大症可危。授以是丸。約三後許。嘔分三服。用熱
陳酒吞。每日一服。不意此人并作一次服之。黃昏
病。至夜半大熱如焚。一本有身熱但不甚熾。神志
迷蒙。幾至不識人事。家人大慌。犁旦啟門來詢。并約
速。赴診。頗初不知其故。以為疑訝。迨稍遲數刻。早
膳畢。即往視之。則熱已大退。神志已復。自說背痛。既
減。轉側輕捷。再與宣通煎劑。不勞更方。而愈。可見是
藥效力之神。病不瞑眩。厥疾不瘳。是之謂乎。

牛黃丸 治風熱痰壅。疔腮瘰癧。時毒痰核。瘰癧諸

症。及咽喉腫痛腐爛。肺癰胃瘕。咯吐膿血。

上陳膽南星。

十兩

天竺黃。

四兩

川芎。

連。廣鬱金。

五兩

易手粉。

各三兩

象

小貝母。

六兩

陶西牛黃。

五錢

透明腰黃。

二兩

各為極細末。以好黃酒化陳胆星。杵和為

丸。如大豆。長砂為衣。密收。勿透空氣。常用石灰甕

藏。每服三五丸。細嚼。緩咽下。



地道一通。其勢自緩。

明雄黃。一兩。生錦紋。二兩。巴豆霜。

揀取白肉。

包壓去油淨。四錢。三味各為細末。少加飛麵。互

錢。米醋同杵為丸。以鳳仙子大。每服三丸至五丸。

最重症不過九丸。不可多用。溫開水吞。泄一二次。

預備菜豆清湯。冷飲數口。即止。虛人孕婦弗用。小

兒痰食實症。發熱大便不通者。每用一丸。杵細飼

之。泄一次即愈。

方解疔毒皆實熱。地。道。瘰。癧。火。熱。上。凌。其。毒。益。
熾。是。方。即。仲。景。備。急。丸。之。變。法。惟。恐。承。氣。猶。猛。不。逮。
乃。以。巴。霜。之。迅。疾。峻。利。者。速。之。下。行。以。奪。其。上。逆。之。
勢。症。重。病。強。針。鋒。相。對。小。兒。亦。可。用。之。者。惟。其。大。寒。
大。瘧。故。可。下。奪。且。僅。服。一。丸。不。擾。其。陽。京。都。有。戲。行。
之。保。赤。散。即。是。巴。霜。硃。砂。世。皆。知。其。有。功。而。不。識。中。
是。何。物。若。使。明。告。以。方。當。無。不。誠。為。可。怪。須。知。所。服。
無。多。自。不。為。害。但。不。可。頻。用。以。傷。脾。腎。耳。近。年。滬。上。

某兒醫。六自製有幼科通治之某。丹。願曾見其藥。

色。六微紅。當即是京都之物。某君於幼科。願自時。

經驗已富。而六用此。當可知是藥之不致貽禍矣。

鐵掃丸。治脫痛腹痛。痞結堅塊。將為肚腹脹者。

力能消腫止痛。奏效甚捷。○腹痛腹脹。凡是實症。

雖無痞塊者。六佳。

沙根香附子。生玄胡索。弗妙各一。水五後。

叶烏。廣木香。桃仁。各一。水。川厚朴。陳皮。



青皮。各八錢。乳香沒藥。去油淨。各六錢。原麝。

香。三錢。各取細末。煎糯米濃漿。打和丸。每丸。

重約錢許。每料作一百大丸。辰砂為衣。每服一。

丸。臨時打碎為小塊。溫陳酒吞服。常嚼細。不忌飲。

者。砂仁湯下。妊者忌服。小兒酌減。

（方解）脫痛腹痛。以致痞結有形。釀為瘍患。無非氣滯
血凝。治之之法。活血行氣。宣通結滯。已無餘義。但病
在皮裏膜外者最多。湯藥難滲。急則徒傷腸胃。不達



病而後則病重為輕。亦復無濟。內服直刺。恆以桃仁
承氣為起時。亦有效。而不甚捷。其弊在此。朱氏是方。
丸以緩治。能直達下焦。留連以宣通之。所以投之輒
應。作為大丸者。欲其久藏。而香氣不泄。打作小塊吞
嚥者。欲其緩。以消化。方能達到腸間。猶有力量。以及
患而丸以米飲。取其粘結。而不速化。製方之意。極精。
皆不可忽畧看過。

沈香散 治停寒積飲。肝胃氣痛。痞結脹滿。噎逆酸

加製半反三升
炮姜炭 升
生元以二升
吳黃 升
古勇連 升

水痰涎諸症。○上治寒中霍亂。上吐下瀉。心腹絞痛。厥逆脈微欲絕者。

天台烏藥

北細辛 六分

廣新會皮 五升

木香

廣鬱金

紫降香

各三分

黑沈香

上

重者水磨細末日乾為餅

二餅各為細末和勻每

服一錢至二錢開水調吞

○方解肝胃氣痛。而全痞結脹滿。寒痰凝結者為多。即

嘔吐清水酸水。亦是中陽無權。飲積不化。於法必當



溫運。此為肚痛。腸痛。相去不遠。一問。但痛多。鬱熱。溫
荷。未可概投。此則以痛為主。非溫辛。不無開。痺。雖問
亦有肝陽鬱結。不利。溫。燥之症。然當大痛之時。每多
支冷畏寒。甚者且冷汗淋漓。授以此散。往往得應。惟
當痛勢既定之後。必須峻養肝陰。方為培本之策耳。
此新方九痛丸。治宿年九種胃痛。以刀切椎。按
結胸腹腸胃之症。無不神應。

白川椒

公丁香

高良姜

廣木香

明膠

江子仁⁸ 即巴豆 揀取白仁。壓淨油質。各一炒

五靈脂⁸ 八錢 西藏紅花⁸ 六錢 各為極細末用汾酒

泛丸如棗豆大不可審丸每服七厘溫汾酒壹杯

吞服⁸ 一二次飲冷粥湯⁸ 一口即止定痛極驗

重者不過三服有年久恙可割根株

(方鮮)以吾鄉某氏多年施送之藥遠近來索都稱捷

驗⁸ 頗索得其方溫下以除痼陰逆寒⁸ 而所服甚少⁸ 製

病有度⁸ 洵是良方但刈絕根株之後必當滋養肝脾⁸

善調其本。否則正氣益耗。再發增劇。不可不慮。

曾秉二仁丸。治梅毒下疳。淋濁陰癰諸症。真陰

虛。不任攻伐者。

老色蘆薈。五錢

真靜輕粉。三錢

煨西牛黃

二錢

桃仁

杏仁

去皮各三十立

以淨腰

雄黃。四錢

右各為末。打和丸。如桑豆大。壯者每

服。至

和弱者減之。以鮮生地。

仙遺糧。

銀花。

三味煎湯送下。即以此三味常服代茶。



方解梅毒一症。非傷脾不為功。然毒藏腸張真陰已
高。一路攻劑。亦所不勝。此毒在血絡。徒伐腸胃。而不
不中病。所以方丸。以緩治。威而不猛。無太過之弊。其
用輕粉者。惟以能搜絡脈之毒。主病在是。淺者視之。
每謂求其起毒。最防收入骨髓。轉跡變幻。不知江湖
術士。多事昇求。以治此症。倒提深入。害固不可勝言。
其咎在用之太多。而又不以清解輔之。二三日間。梅
瘡盡伏。其效如神。而毒得求加伏藏於內。達之又久。



然後發泄。則標決淫溢。不可復制。此方永尚不多。而
牛黃腰黃。即以此解其猛烈之毒。使用蘆薈二仁。導之
使泄。已無伏藏之慮。且又有陽引清利通瀉。二陰皆
有去路。配合自有法度。朱圓師主治毒門。必以是丸
為主。投之輒應。頗見已多。惟效果稍緩。不能剋日成
功。則王者之師。固不如雜霸之君。必責效於旦。○試
觀東西醫學。於此一科。內服外治。無不用汞。又有以
白檀香油治淋濁者。亦必每丸中。加入三仙丹半。

