

婦科雜症

婦科文 藏叔來輯

星瑞重校刊

經候而血也乃天一之水出自腎中是至陰之精

以下十五餘見明本得山水神

先期經來甚多火大腎中水用地骨皮錢五丹皮白芍酒熟地九蒸各青蒿錢二

水服服二劑而火自平又有先期經來只一二點者是腎中火旺

而血熱也九白芍酒熟地三錢三

子分三服

參各二服

經水斷或前或後無定期此則氣用足經湯

地熱山藥五錢白茯苓錢三黑芥穗錢三紫胡五分水煎服三劑而經湯四劑而經調矣

臨時或有外感者宜加紫蘇一羌活八有肉桂就者宜加神麩二傷肉食者加香肉

經水有數月一行者無不先發多少之經本層或有因嗜飲新糧者用茯苓錢五白朮錢

皮白芍酒山藥各三錢

三錢

三錢



南京中醫藥大學圖書館藏

婦科雜症

男星瑞重校刊

萍鄉文 歲叔來輯

星同校

經候經非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸從來以經為血沿誤已久倘果是血何以古聖賢不名

以下十五條見明本傳山女科

先期經來甚多是腎中水大旺用地骨皮五錢丹皮五錢白芍酒炒熟地三錢青蒿二錢茯苓一錢黃柏一錢

五分浸炒水煎服二劑而火自平。又有先期經來只一二點者是腎中火旺而陰水虧也

元參大生地酒炒各一兩白芍酒炒麥冬去心各五錢阿膠地骨皮各三錢水煎服四劑而經調

矣

經水後期而來多是血寒而有餘大熟地九錢白芍酒炒各一兩川芎酒洗白朮土炒各五錢紫胡肉桂去粗皮各

分五續斷錢一五味子分三水煎服三劑而經調矣。又有後期而來少者是血寒而不足前方加當

歸酒洗四錢阿膠人參各二錢服三四劑必效。貧者用黨參四錢代人參二錢以下皆同

經水斷續或前或後無定期此肝氣鬱結用定經湯 白芍酒炒當歸酒洗兔絲子酒炒各一兩大熟

地九錢山藥炒各五錢白茯苓三錢黑芥穗二錢柴胡五錢水煎服二劑而經淨四劑而經調矣 若

臨時或有外感者宜加紫蘇一錢羌活八分有內傷飲食者宜加神麴二錢傷肉食者加查肉二錢

經水有數月一行者亦無先後多少之殊本屬無病不必妄用藥餌也或有因嗜欲虧損者用茯苓五錢白朮土炒陳

皮白芍酒炒山藥各三錢兔絲子酒炒杜仲炒甘草各一錢河水煎服四劑仍如其舊不必再服

年老經水復行

五十以外或六七十經水忽復行乃肝不藏血脾不統血之故也

人參

黃芪

生熟地一兩各

白朮炒

當歸

酒炒

山萸

蒸各五錢

黑芥穗

阿膠

蛤粉炒

甘草

木耳炭

錢各一

香附

酒炒五分

水煎服

一劑減

五劑

至四劑尤減十劑愈

此方加貫仲炭

錢一

研細末

以藥冲服

尤妙

有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者

是肝氣不舒

大熟地

九蒸一兩

白芍

酒炒

當歸

酒洗

白朮

土炒各五錢

錢粉丹皮

川芎

酒洗各三錢

元胡索

酒炒

甘草

柴胡

錢各一

水煎服

數劑效

此方加黑荆芥穗

錢一尤妙

有經前腹痛數日而後經水行者

其經來多是紫黑地是熱極而火不化也

用宣鬱通經湯

丹皮

白芍

酒炒

當歸

歸

酒洗各五錢

梔子

錢炒三

白芥子

錢炒二

香附

酒炒

鬱金

醋炒

黃芩

酒炒

生甘草

柴胡

錢各一

水煎服連

四劑下月斷不先腹痛而行經矣

行經後少腹疼痛

人以為氣血之虛也誰知是腎氣之洩乎

山藥

錢炒五

阿膠

錢炒

當歸

酒洗

山萸

白芍

酒炒各三錢

巴戟

鹽水浸一錢

甘草

錢一

服四五劑愈

經水不止單方

陳蓮蓬殼燒灰存性研末每服二錢熱酒下

經水過多

行後復行面色痿黃身體倦而用加減四物湯因之愈甚是血虛不歸經也

熟地

九蒸一兩

當歸

酒洗

白朮

土炒各五錢

錢白芍

酒炒

黑芥穗

山萸

三錢

川芎

酒洗二錢

續斷

甘草

錢各一

水煎服

四劑而血歸經

十劑

之後加人參

錢三

再服十劑

下月行經適可而止

又膠艾湯

阿膠

錢炒半

川芎

炙草

各一錢

艾葉

當歸

各半錢

熟地

白芍

錢艾葉

當歸

各半錢

熟地

白芍

炒各二錢

水煎服

年未老經水斷以血枯而非血枯乃肝用益經湯熟地九白朮一土炒各山藥炒當歸酒

錢各五白芍酒炒沙參生棗仁三搗碎各人參丹皮錢各二柴胡杜仲一炒黑各水煎連服八劑而

經通三十劑而經不再閉矣

經水不通單方 茶一碗入紅砂糖二錢亮紗蓋定露一宿服之 又方蠶砂四兩炒黃

無灰酒一壺重湯煮熟去砂飲一鍾即通

經前腹痛吐血有經未行之前一二日忽然用順經湯 丹皮錢二當歸酒洗大熟地九蒸各

白芍二錢酒炒白茯苓沙參黑芥穗錢各三水煎服一劑而吐血止二劑經順十劑不再發

婦人年壯吐血往往有之不可遽作勞症治致成痼疾必頻以前方加茜草牛膝各一錢如法服之必效

經前腹痛單方 紫蘇四兩陰乾候經期如吐腹脹痛煎湯薰洗下部摩運小腹每經摩洗三

四日則經正痛止

經水將來三五日前臍下先疼痛狀如刀刺或寒熱交作所下如用溫臍化濕湯白朮

土炒一兩山藥炒巴戟肉鹽水浸各五錢白茯苓錢三扁豆炒各三錢白果搗碎十枚建蓮去心三枚水煎

服必須於經未來前服之四劑即效

經前洩水經水未來之前洩水三日而用健固湯 白朮一土炒人參巴戟鹽水浸各五錢白茯苓

苡仁三炒各錢水煎連服十餘劑不再洩水矣

行經之前一日大便先流血是經流也當歸酒洗白芍酒炒白朮土炒麥冬去心大熟地九蒸各黑

芥穗山茱萸二錢各人參錢三巴戟肉一錢水浸升麻四水煎服二劑大腸血止而經即由前

陰而行矣服三四劑經止兼可受孕經水錯入大腸初起必若非於行經之際大便下

血過多精神短少人愈消瘦此脾不宜用補血湯嫩黃芪二兩生熟當歸身酒洗白

求土炒焦白芍三錢酒炒焦杜仲炒斷絲黑荆芥錢各二薑炭一錢半引用貫仲炭研一錢冲服

四劑必愈愈後減半再服二三劑治吐血暨經血逆行上出口鼻病未深者韭菜搗

汁一盞入童便半盞頓溫服

女人經閉已久晚蠶砂四兩炒微黃色好黃酒二斤

治女子經閉形容枯槁杭州冬去心四斤熬成膏何首烏半斤黑豆拌九蒸九晒為末

當歸四兩酒洗鹿茸五錢每服三錢漸加至五錢黃酒浪湯任下

經閉乾血等症神方雄雞一隻煮熟去肉取全骨一副即嘴爪俱要不遺再用童便生薑

在骨上仍留汁一小半將骨打碎又用香附末一兩同再焙仍將三汁陸續酒在骨上

陳修園加味四物湯熟地當歸酒洗川芎白芍炒加香附製錢茯神二錢炙草四錢少則此

女科要藥也經血先期而至加知柏黃芩熱則加黃連後期而至加姜桂艾葉實者加

參白朮大虛而枯者再加鹿角膠牛膝更佐以人參養榮湯經行而腹痛者加延胡

澤蘭並汁童便若腹中素有痞飲食滿悶者除地黃加枳實半夏經色紫者風也加荆防

白芷黑者熱甚也加苓連丹皮地骨皮淡白者虛也有快痰停水以混之加參芪陳皮色如

煙塵者或如屋漏水者加陳皮半夏及秦艽防風蒼朮如豆汁者加苓連或帶黃濁者濕痰

也或或晚作片血不變者氣滯也加枳實陳皮元胡色變紫黑屬熱者多屬寒者亦有之宜



察脈審症 此外若惡寒發熱頭痛有汗加桂枝湯 帶下 帶下俱是濕症而以帶名者

或飲酒而顛狂加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之浸熱氣之逼安得不成帶下之病

白帶 終年累月流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢乃濕氣感火衰肝鬱而氣弱則

直下而不能自禁治法宜大補 此宜用完帶湯 白朮 炒土山藥 炒各一兩 白芍 炒各五錢 人參 錢二

車前子 炒酒 蒼朮 三錢 甘草 錢一 陳皮 黑芥穗 各五 柴胡 分六 水煎服二劑輕四劑止六劑白

帶全愈 倘未全效必係經水過期少腹急迫則當服寬帶湯 丹皮 當歸 酒洗各二錢 熟地 九錢 白朮 一兩 炒 人參 三錢 肉蓯蓉 淨洗 麥冬 肉杜仲 炒 黑白芍 酒炒各三錢 巴戟肉 酒補骨脂

熟地 五錢 白朮 一兩 炒 人參 三錢 肉蓯蓉 淨洗 麥冬 肉杜仲 炒 黑白芍 酒炒各三錢 巴戟肉 酒補骨脂

鹽水 炒 五味 分三建蓮 二十枚 水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月可受胎 又單方

用鱖魚 即桂 六七十寸長者先洗淨破去腸肚不必復洗用胡椒一歲一粒鹽一分煮食

即愈以後再食胡椒照上畧加鹽酒亦可二三次尤妙 又方棉花子半斤 燒存 柏子

一兩 燒 共為末空心淡酒下三錢 又方用隔年冬瓜子仁 炒研 每服五錢空心白滾湯

下 又方白篇豆 炒 為末每服二錢米飲下

青帶 腥臭此乃肝經之濕熱也宜用加味逍遙散 白芍 炒 酒生甘草 茯苓 錢各五 茵陳 梔子 各炒

錢三 柴胡 陳皮 錢各一 水煎服二劑而色淡四劑而青綠之色絕不必過劑矣

黃帶 如黃茶濃汁其氣腥穢乃任山藥 炒 芡實 打碎炒 黃柏 鹽水炒 車前子 酒炒 白果 十

碎水煎連服四劑無不全愈 此方治黃帶甚驗即凡有帶病者均可治之

帶下

三

黑帶

帶下而色黑甚則如黑豆汁其氣亦腥乃大熱之極其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺

寬快此胃火與命門勝三焦之火合而石膏煨白朮五錢各車前子炒茯苓大黃土

不留行黃連梔子炒

劉寄奴錢三知母錢二

水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑

帶變為白三劑白亦少減再服二三劑全愈矣愈後當節飲食戒辛熱調養脾土不可

恃有此方病發而服致傷元氣

赤帶

帶下而色紅似血非血淋漓不絕是肝經之鬱火內藏下起脾土脾土不能運化以

力故濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以有似血非血之形象也世杭白芍炒全當歸

人以赤帶屬之心火誤矣治宜清肝火而扶脾氣方用清肝止淋湯杭白芍炒全當歸

酒洗各生地炒五錢阿膠炒丹皮錢三黃柏牛膝錢各二香附一酒錢紅棗十枚黑豆兩一

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑永斷

赤白帶下臍腹痛極效單方名曰白芷炒二乾姜錢三共為末每服三錢空心溫米湯

調下 若肝經鬱結血虛火盛者宜用當歸錢二白芍錢五黃芩錢二煎服

赤白帶下單方

槿樹皮二兩切細以白酒一碗半煎一碗空心服而白帶用紅酒甚妙

又方雞冠花煎酒服赤帶用白花白帶用紅花 又方建蓮肉炒去心海螵蛸去硬殼煨

共為末熱酒服 又方馬齒莧搗爛擠汁三合和雞子清二枚先溫令熱次下莧汁微

溫頓服之不過再服即愈

赤白帶下經行不止

白芷一兩海螵蛸煨去甲胎髮一兩煨存性共為末每服二錢溫酒調下

血崩昏暗

婦人有血崩兩目黑暗昏倒在地不省人事者人莫不謂火盛動血然此非實火乃虛火耳不可一味止瀉須於補陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

大熟地

九蒸白朮各一兩生黃芪錢三錢人參錢三錢當歸五錢黑姜錢二錢水煎服一劑崩止十劑不

再發若血崩數日血下數斗六脈俱無鼻中僅有微息不可遽投此方恐氣將脫不能

受峻補也。有力者用人參去蘆錢三錢水煎湯。冲貫仲炭末錢一錢溫服之彼氣息微旺然後再

服此方仍加貫仲炭末錢一錢服無不見效。無力者用黨參六錢煎湯一盃加無灰酒半盃

冲貫仲炭末三錢服之待其氣接神清始可服此方。

年老血崩

五十以外血崩者宜用加減當歸補血湯生黃芪當歸一兩酒洗各三七根末錢三錢桑葉十四水煎服二劑

血少止四劑不發。然必斷色慾以前方增入熟地一兩白朮錢五錢山藥錢四錢麥冬錢三錢北五味錢一

服至百劑乃除崩漏之根。亦有婦人年老血崩係氣冲血室但於原方中加貫仲炭末錢三錢極效勿多服後方

少婦血崩

少婦血崩三四月即止血崩而胎亦墜多因行房不慎氣弱血動之過治法當以補氣為主而少佐補血之品方用固氣湯。人參一兩

白朮

土炒熟地九錢各當歸酒洗杜仲三錢白茯苓錢二錢山茱肉錢二錢遠志去甘草錢各一五味

子十粒水煎服一劑而血止連服十劑全愈。此方可通治非僅治小產血崩。

交感血出

婦人有一交合流血不止者皆因經水未淨陽精遽入白朮土炒熟地九錢各人參

山茱肉

五錢各茯苓錢三錢各黑姜錢一錢黃柏五錢水煎連服四劑效十劑全愈。然

必須慎房事百日愈後仍加調氣血節色慾方不至再發成癆。

鬱結血崩

婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐吞酸而血下白芍炒醋白朮土炒當歸一錢酒洗各丹

婦人是肝氣之鬱經也方宜用平肝開鬱湯。血崩

皮生地酒炒三七根研末各三錢甘草黑芥穗各二錢柴胡一錢水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除

四劑血崩愈此方入貫仲炭三錢更妙

閃跌血崩婦人有升高墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者然必手按之而疼痛久之面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比切不可用補

逐瘀之藥方用生地酒炒大黃赤芍龜板醋炙各三錢當歸枳殼炒各五錢丹皮一錢桃仁十粒

水煎服一劑痛輕二劑痛止三劑血亦全止不必再服凡跌打損傷致嘔血嘔血皆

宜如此治法若血聚胃中宜加川厚朴一錢姜汁炒

血海大熱血崩婦人有每一交合經水即來一如血崩人以為胞胎有傷觸之必動其血也誰知君相二火因交感而煽動子宮血海因火熱而不固乎治法必

滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半白朮炒土大熟地九蒸白芍酒炒元參乾桑

年而除矣然必絕經百日而後效方宜用清海丸丹皮十兩山茱蒸地骨皮石斛山藥炒麥冬肉沙參各一兩龍骨北五味

各為細末合一處煉蜜為丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方久服

能使子宮清涼血海自固若徒以髮灰白礬黃連炭五倍子等藥末外治其幽隱之處


恐愈濕而愈流終必至於敗亡也

婦人血崩不止單方五靈脂不拘多少炒令研末以當歸酒或童便調下三錢甚效

又方用陳棕舊棕箱整過棉花子等分燒灰存性每用二三錢黃酒送下即止又方

旱蓮草新鮮者佳用二兩半煮雞食之立效又方枯礬黃丹各五錢綿絹包裹麻油抹

絹面線扎一團用線穿竹筒上仰卧入陰戶內將竹筒退出一炷香久即止止後將線



掣出藥團可也。又採取雞冠花子。白者治紅崩。紅者治白崩。每服五錢。焙微枯。黃酒

送下。又方棉花子焙焦為末。三錢黃酒調服。兩劑全愈。又方甜杏上黃皮晒乾。研

末。每服一錢半。空心熱酒調下。又方大薊根葉搗汁。約半升溫服。又方貫仲切片

六錢。好黃酒一碗。煎至半碗。服之發汗立止。

血崩久甚不愈。

真紫降香三錢為末。水二鍾煎至八分。露半夜至雞鳴時熱服。出汗即愈。

治紅白崩。筋骨疼痛方。

三白草根一兩。精猪肉四兩。煮食即愈。此方同雞羹服。可治婦

人筋骨疼痛。

婦人血崩并失血。鼻血便血。

阿膠

蛤粉炒

當歸

瓦上焙乾

蒲黃

炒

澤泄各一兩。共為末。煉蜜為

丸。每服三錢。

婦人小便不通。

杏仁

去皮尖

麴炒黃

研細末。

水調

三服即愈。

婦人大小便不通。

大麥桿燒灰

水調

二錢服之

二三次即愈。

陰冷。

蛇床子

炒研

白粉

錢調勻

如棗大

每用一枚

綿裏納入陰內

自然溫暖。

婦人陰癢或生濕瘡。

蛇床子

一艾葉

明礬五倍子

杏仁

打碎各五錢

川連

錢煎水

先薰後洗

即愈。

又方桃仁

爛用綿裏塞之

又方鯽魚切片

以稀布裏納入陰戶內

其蟲自出

盡入布眼。

治二三次

以出盡不瘡為度

再用蛇床子朴硝

錢

煎水

二碗洗瘡

拭乾

以

乳香沒藥

各錢半

研末

加枯礬

分擦之

尤效。

陰痛 以青布裏鹽熨之

雞眼痛 地骨皮、紅花二味共研細末，麻油調敷患處，效如神。如成瘡者，乾數次日，即結。

蓋 又方：生葱剖開，取有蔥沫一邊，貼在雞眼上，包好三日愈。

陰戶并囊門生白蟲 蜂蜜煉過二甘草研末二味和勻敷瘡處，蟲自出，即效。再以蛇床

子一朴硝一煎湯頻洗，更效。

婦女脚了及足底彎曲處作癢 枯礬錢五熟石膏、輕粉、黃丹錢各三共研末，開水候溫洗淨。

擦之即愈 如破爛有膿水者，葱湯洗淨，用海螵蛸去硬殼人中白錢三冰片分共為末

每一錢搽之愈

女子小戶嫁痛海螵蛸炙黃去甲研末酒調服二錢三次

女子乾血癆唇紅腮白似桃花色骨瘦如柴相思亦有此病用啄木蟲十數個瓦焙存性為末，每用五分以上好黃酒

調勻服之，不過十日即愈。

婦女乾血癆三奇方過三年不治用白鴿子一隻，去肝腸淨，入血竭，一年內者一兩，二年內者二

兩，三年者三兩，以針線縫住，用無灰酒煮數沸，令病人吃下，瘀血即行，如心中慌亂者，

食白煮精肉一塊即止。又方：用全蝎去足燒灰存性，研二錢，空心黃酒送下，三五日見

效。又方：用削猪子腸燒灰，黃酒送下，不過二三服全愈。

婦人陰吹症太便燥猪膏半斤，亂髮如雞子大三團，和勻煎至髮消，藥成分二服，病從便出。

婦人顛狂失心

明礬
錢煨六

鬱金
一一
分錢

共為末米汁為丸如桐子大每服五十丸白湯下

數服卽愈

婦人各種風病腹中刺痛

紅藍花

一酒一大升煮至六分頓服一半未止再服

婦人氣血不調腰膝疼痛手足搖擗等症

全當歸

炒酒
白芍

炒酒熟地二酒錢炒

各川

分天麻

丁皮分五水煎服

血分滯者加宣木瓜

酒炒
錢半
氣

分滯者加川續斷
錢酒半炒

有濕者去熟地

傷寒未愈交感病

男人傷寒未愈陰毒在內常有行房而女人受毒得病者其症似傷寒非傷寒不治則死問得真情即用男人尿凝澀磨下一大匙煎服立愈

之立愈如女人病而男子
受毒者即用女禪襦服于

婦人眼病

與男子頗殊富補養腎水
并以陳肝解鬱之藥佐之

新定開瞽神方

以下兩條陳氏女科要旨

充蔚子
烘陽紙

元參酒浸
各八

雨

香附為末以人乳拌五次 柴胡酒拌為末各四兩

澤瀉
烘酒

擇
防風

用黃芪
汁拌

白菊花

各三
共

為末煉蜜為

凡如梧子每服三錢菊花湯送下

又方枸杞子

一斤去蒂并取羊膽十個用冬蜜十兩

山泉水斤一攪勻將枸杞子浸一宿取出蒸半

炷香晒乾又浸又蒸晒以汁乾為度收藏

密貯勿洩氣每早晚各吞三錢桑葉湯送下

瘰癧

頭上項側結果成核累累女子善懷每又多憂鬱宜逍遙散加貝母夏枯草牡蠣瓜蒌皮之類常服虛者加味歸脾湯效

一以艾重者三次可愈隨服消癰丸元參牡蠣散炒犀角如貝母去心各兩共三錢以

枯草三斤長流水煎熱膏半碗入煉蜜半碗為丸如梧子大每服三錢一日兩服開水送下外用皂角肉入鯽魚腹中煨入灰存性蜜和醋調塗上無不應效

全膏方見外科內服此方或間服加味逍遙散自愈此

乳頭腫硬用鹿角夫燒灰存性研細末酒調服二錢外用葱白搗爛敷之即愈若結乳

拘多少搗爛敷之立效又方
蚯蚓糞以陳醋調塗患處即愈

乳癰并乳腫此男患青橘葉百片青皮五錢柴胡一錢水二碗煎一碗入好酒一杯熱服

被蓋出汗立愈 又方香附末一好麝香分三研蒲公英三兩和酒煎服渣敷患處即消

乳癰初起尚未成形用生蘿葡連根帶泥搗爛敷熱即更易二

乳癰良方兼治各種大毒

大當歸八錢生黃耆五錢金銀花五錢炙甘草八分桔梗一錢黃酒二碗煎八分半飢半飽服

又治乳癰方兼治乳癰鮮蒲公英一兩連根搗爛取汁冲酒服以渣敷患處即愈如無鮮者以乾

者三兩煎服并敷亦可 又方以豆腐桌下做豆腐淋下水一桶傾入鍋熬乾成膏布蘸

搭上乾時再搭乳上結塊自消五七次必愈神效


乳巖二方此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋七八

生蟹壳置炒鍋內焙焦為末早晚每服二錢酒調下數十日漸消又間服加味逍遙散又加味歸

脾湯效 又方大瓜萸個一半生半炒酒二鍾煎至一鍾食後服外貼太乙膏此方兼治乳癰乳癰俱效

乙膏見外科

乳巖已破二方



荷葉蒂七個研末酒下 又方貝母核桃楸金銀花連翹各三錢酒水煎服 外貼俱宜

太乙膏此方只可偶用總宜多服

乳縮症乳頭收縮肉內此肝用生黃芪一當歸二錢白芷防風各錢半木通乾薑各一錢肉桂去粗皮研五分水二碗酒一杯煎七分服

乳卸症此肝經拖下長一二十寸用小柴胡湯 柴胡四錢人參黃芩炙甘草生薑各錢羌活防風各一錢主之 外用羌活防風白斂燒烟薰之仍以草麻子四十九粒麝香一分同研

爛塗頂心俟乳收上急急洗去此是怪症女人盛怒者多得之

加味逍遙散 柴胡錢茯苓白朮炒當歸酒洗白芍煨薑各一錢炙甘草薄荷各五分加丹皮黑山梔各一錢

加味歸脾湯 人參黃芪白朮炒茯苓二錢遠志肉當歸酒洗木香各一錢炙草各五分加

柴胡山梔各一錢

陰挺時醫名之曰瘡陰中突出一物如蛇或如拳如菌如茄如雞冠或血水不斷或乾枯

九或痛癢或頑麻不仁南人患此多係濕熱下注初起宜內服加味逍遙散六味地黃

蘆未敷之自消北人患此多係月經方淨生卧濕地蹲廁便溺其時血消腫成癆死而後

穢毒之氣乘虛內侵積久而成治以古方多不見效庸醫妄用下水消腫癰毒之藥

內服又以蟾蜍礪砂等藥外敷而庸醫且操刀而割遲快一時必致漸積成癰癰死而後

已傷哉陳修園於北人初患此証五苓散料加蜀椒黃柏小茴附子沙參川芎之類蜜

九每服四錢一日兩服外以花椒苦參蒼朮槐花煎湯入砒硝薰洗又以飛龍六兩銅

緣中奇效或久而成癰經水不利以金匱溫經湯及腎氣丸主之而龜板鱉甲蒺藜之

類隨證出入加減亦有愈者 前又方一易猪肉自入

後洗藥及末藥南北俱可用

乳症

鬼胎室女未嫁月經忽斷腹大如妊面色赤白六脈乍大乍小多係邪鬼憑身正氣

散雷丸六錢調正仁湯六十粒當歸一兩丹皮一兩甘草四錢陳皮明雄黃二錢水煎服必下惡

物半桶再服調正仁湯六十粒當歸一兩丹皮一兩甘草四錢陳皮明雄黃二錢水煎服必下惡

如桐子若大用補心開湯未愈服桂香仁各五錢茯苓三錢陳皮明雄黃二錢水煎服必下惡

炒各三錢厚朴姜汁炒枳實土炒又各二錢陳皮川芎各一錢服後必下惡

物次日再服平胃散不用桂香又各二錢陳皮川芎各一錢服後必下惡

出錢佩又方邪物憑胸每以桐油塗其陰則邪永絕

去私胎方大挺麵五升漬酒一斗煮二三沸去渣分五次

斷產法故服下終身不受孕亦可墮胎

調經逐瘀補虛益母丸

益母草一斤并子大生地酒洗當歸三兩洗白芍三兩炒川芎一兩烏側骨去粗殼澤蘭葉洗

四香附四兩便浸醋四次水茲將益母膏和羣藥加煉蜜為丸如熱加丹皮黃芩各兩梔

子一去川芎如寒加肉桂一兩砂仁一兩生地換熟地氣虛加人參白朮二兩香

附減半有痰加陳皮法半夏各一熱痰加麥冬心去川貝心各一兩半經閉不通加

延胡索酒炒一桃仁六錢紅花錢四詳察病情餘可類推

調經種子

治婦人不育加味交感丸香附去毛水浸一晝免絲子酒製各當歸童便浸夜神生研

兩共研為末煉蜜丸梧子大每早晚各服三錢米湯下二三月即效又方經淨之時



卽用月月紅根一兩以上者劈碎將未生過蛋母雞一隻去毛與腸水二大碗入

瓦罐封緊細木炭火煮二個時辰加鹽五分取出食雞肉並飲其湯得效如次月再食

一隻卽可受孕又烏賊魚肉久食令人有子又方烏賊魚骨去甲半斤蘆茹一兩共

研末以雀蛋和為丸梧子大食前以鮑魚汁送下三十九丸或用阿膠三兩化為丸米湯

送下亦效又方八珍湯照原等加益母草去下半截三錢煎服有胸滿悶者再加香

附酒炒八分炒水煎服脾虛有滯者加砂仁八分或加重等分蜜丸梧子大每服五錢米湯下效

身瘦不孕大熟地一兩當歸酒洗白芍酒炒山茱肉五錢水煎服至三月自可受孕以下六條見

身肥胖不孕是痰多濕用二陳湯合補中益氣湯茯苓五錢半夏三錢陳皮六分柴胡甘草各一錢

黃耆人參各三錢白朮一兩當歸二錢水煎服八劑痰涎盡消再十劑子宮潤出易於受孕矣

下部冰冷不受孕下身冰冷非火不煖交感時陰中絕無溫熱之白朮土炒巴戟鹽水浸

人參杜仲炒兔絲子酒浸山藥炒芡實炒肉桂去粗皮補骨脂鹽水炒附子製三

水煎服一月而胞胎熱可受孕矣若胞熱者若改湯加重為丸早晚服三錢尤效

少腹急迫不孕自覺有緊迫之狀急而不舒不能生白朮土炒大熟地蒸巴戟肉酒洗

錢人參麥冬心去杜仲炒肉從蓉洗淨白芍酒炒各當歸酒洗補骨脂鹽水炒五味子炒三

建蓮開二十粒心剖水煎服四劑少腹無緊迫之狀一月可受孕矣

骨蒸夜熱不受孕骨蒸夜熱遍體火焦口渴舌燥咳嗽吐沫人以為陰虛火動誰知是骨髓內熱用清骨滋腎湯地骨皮酒洗丹皮沙

調經種子

參麥冬心去元參酒洗各五錢白朮三錢石斛二錢五味子五錢水煎服三十劑而骨熱解再服

六十劑自受孕病去八分此藥即止不必拘定三十劑六十劑之數

便溫腹脹足浮腫不孕氣小水報溫腹脹脚腫不能受孕人以爲小腸之熱誰知是膀胱之

痼巴戟鹽水炒白朮一兩茯苓各錢芡實炒兔絲子五錢人參三錢車前二錢肉桂一錢皮研

水煎服二劑則膀胱之氣化四劑則艱澀之症除又十劑虛脹脚腫之病即消六十劑

腎氣大旺胞胎溫暖易於孕育矣

調經種子效方

當歸酒洗一錢吳萸炒七分白芍酒炒七分川芎一錢白茯苓七分大熟地錢香附醋炒五分丹皮延胡

索酒炒各七分陳皮七分若過期而色又淡者乃血虛有寒也加乾姜炒黑一錢官桂熟艾錢各二分若

先期色紫者加入條芩三錢各藥必須道地每味分兩切勿增減引用姜三片水二碗煎八

九分空心溫服存渣再煎臨卧服自經至之日服起一日一服藥盡經止縱未能孕經必

對期俟下月經來再服四劑必孕無疑矣極效又方當歸童便浸宿八分廣陳皮七分杜仲水

拌炒斷八分紅花四分益母草一錢淨砂仁八分甘草三分烏藥四分小茴香七分生薑三片水二鐘煎八

分空心溫服渣再煎服忌生冷氣惱菜油各物經盡之後不忌每經將臨時先服一劑既

臨接服二三劑無不受孕者總之藥材必須道地分兩毋得加減方妙又方當歸身三兩

酒浸煮熟地三兩酒蒸白茯苓一兩白芍一兩香附三兩先煮醋白朮一兩元胡七錢

