

卷二

真中風_一
濕症_五

類中風_二
燥症_六

中寒_三
火症_七

暑症_四

司補明醫指掌卷之二

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校正

男繩山邵達桑補

真中風一

歌府中風邪顯六經面加五色表之形。若還中藏多便阻。絕症臨之命必傾。半身不遂喎斜口。此是風邪中在經有表汗之須續命。六經加減認教真。須知在裏洩便秘實者。九當三化行。原無表裏秦芫治。大要清心靜養神。

論經云風爲百病之長也。善行而數變。或爲寒中。或爲熱中。或爲寒熱。或爲偏枯。或爲癘風。皆爲風也。其變莫測。然八方之風邪中人。則有中。府中藏中。經脈之分。所以別其邪之淺深也。中府者。有表症。面加五色。脈浮弦而惡風寒。拘急不仁。現六經形証。治宜汗之。亦不可過汗。損其衛氣。中藏者。內閉九竅。故脣緩失音。鼻塞耳聾。眼瞽大小便秘。故可下之。亦不可過下。損其榮血。中經脈者。外無六經形症。內無便溺阻隔。故治之在經。無表裏症。不可汗下。宜靜勝其躁。是養血也。大秦朮湯。其有痿痺。

癱瘓偏枯痛痒頑麻中痰中氣似風而非風也故
另立類中風條以別之

脈中風浮者滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或
沉而微而虛扶元治痰風未可疎浮遲者言急疾
者死

○中府

中府者腰肢節審其六經形症用加減續命湯初中
先須理氣烏藥順氣散對星香散若兼中藏大便秘
秘三化湯失音舌強大秦朮湯痰涎盛者希涎散
竹瀝湯刺瀉湯

加減續命湯

麻黃 去節

人參 去芦

黃芩 去腐

川芎

右咬咀生薑三片水二盞煎至一盞通口服達按

芍藥 酒炒

甘草 炙

杏仁 去皮尖麤炒

防已 去皮

桂枝 淨炒

防風 去芦各一錢

附子 炮去皮
臍五分

古人以此方混治中風未詳其証蓋麻黃杏仁麻黃湯也仲景以之治大陽症之傷寒桂枝芍藥桂枝湯也仲景以之治太陽証之中風如此言之則中風而有頭痛身熱脊强者皆在所必用也人參

甘州四君子之二也。局方用之以補氣。芍藥、川芎、四物湯之二也。局方用之以養血。如此言之。則中風而有氣虛、血虛者。皆在所必用也。風淫未疾。故佐以防風。濕淫腹疾。故佐以防已。陰淫寒疾。故佐以附子。陽淫熱疾。故佐以黃芩。蓋疾不單來。雜探而至。故其用藥亦兼該也。如治中風不審六經之形症。加減雖治。與不治無異也。宜以此湯隨症加減治之。如左。

○如中風無汗惡寒。麻黃續命湯主之。

依本方 麻黃

杏仁

防風各加一倍

宜針至陰出血

穴在足小指外側爪甲角針二分

崑崙舉蹻穴在足外

踵後跟骨針透太谿

○如中風有汗惡風

桂枝續命湯主之。

依本方

桂枝

芍藥

杏仁各加一倍

宜針風府

穴在項後入髮一寸五分禁灸

已上二症皆太陽經中風也。

○如中風有汗身熱不惡寒

白虎續命湯主之。

依本方加石膏知母各二錢甘草再加一倍

○如中風有汗身熱不惡風

葛根續命湯主之。

依本方加葛根

桂枝

黃芩再加一倍

宜針陷谷穴在足大指次指本節後陷中針入五分去陽明之賊

兼刺厲兌穴在足大指次指本節後陷中針入五分去陽明之實

上二症皆陽明經中風也

○如中風無汗身涼 附子續命湯主之

依本方 附子加一倍 乾薑加二倍

甘州加二倍

宜針隱白穴在足大指內甲角去太陰之賊

此太陰經中風也

○如中風有汗無熱 桂附續命湯主之

依本方 桂枝 附子 甘州各加一倍

宜針太谿穴

在足內踝後跟骨上陷中斜透崑崙

此少陰經中風也

○如中風六經混淆繫之於少陽厥陰或肢節變痛

或麻木不仁宜羌活連翹續命湯主之

依本方加羌活連翹也

少陽之經絕骨

穴在外踝上三寸灸五壯

灸以引其熱

厥陰之井大敦

穴在足大指甲聚毛間

刺以通其經

烏藥順氣散

烏藥

陳皮

各二錢

麻黃

去節

川芎

枳殼

去穢炒

白芷

枳殼

各一錢

蠶沙去

乾薑炮五

甘州炙三

右剉一齊。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。達按本方

以順氣名者。蓋遍身麻痺。表氣不順也。故治以麻

黃川芎。語言蹇澀。裏氣不順也。故治以烏藥陳皮。

枳殼。口眼歪斜。面部之氣不順也。故治以白芷。蠶

蠶喉中氣急。甘州可緩肺氣。上逆桔梗可下痰之

為物。寒則結滯。熱則流通。佐以乾薑。行其滯也。此

治標之劑也。然必邪實初病之人方可用。

中風一身俱麻。加人參白朮。當歸川芎。麥門冬。

久患左癱右瘓。去麻黃。加天麻。防風。羌活。牛黃。南

星木香當歸。○口眼喎斜加生薑。○虛汗去麻黃加黃芪。○中風面目十指俱麻乃氣虛也補中益氣湯加木香香附羌活防風烏藥。

對星香散

治中風體肥痰盛口不渴者此方主之

牛膽

南星 八錢

木香 一錢

右咬咀每服四錢生薑十片水一大盞煎七分溫服連按本方用南星燥痰之品也曰體肥曰痰甚曰不渴則宜燥也可知矣故以南星主之而必入牛膽者制其燥也佐以木香利痰氣也

星木香南星此皆中風有渴

○中藏

中藏無別病大便必者用三化湯老弱之人以滋潤
湯代之若口開眼合撒手遺尿汗出如油搖頭
直視面赤如瘰聲如鼾腫脈急大實者皆不可治
不省人事用通頂散或半夏末吹鼻中取嚏如無
嚏者死痰涎盛用稀涎散或蝦汁吐之痰多有熱
刺瀝湯

三化湯

治中藏者以此通其滯調以十全四物

大黃

枳實

厚朴

羌活

右咬咀等分每服一兩水煎服

滋潤湯

治風中在藏大便秘結

當歸

生地黄

枳殼去穰

厚朴去皮

檳榔

大黃

火麻仁

杏仁去皮

羌活七分

紅花各一錢

右剉水煎空心溫服。

通頂散

治病人初中風昏愦不省人事口噤不能

開者急用之

藜蘆

甘州生

川芎

細辛

人參各一錢

石膏五分

右爲末吹鼻中一字就提起頭頂心髮立甦有嚏者可治無嚏者不可治。

稀涎散 治中風忽然如醉。形體昏悶。四肢不收。涎

潮搖擗。用以吐出痰涎便醒。

明礬 一兩 半生半枯

皂角 四條 去黑皮炙

每服三錢。溫水調灌。風痰自出。達按本方治中風。暴仆痰涎壅塞者。蓋濁邪在上。風盛氣壅而然也。經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。故不與疏風補虛而先吐其涎。白礬之味鹹。苦。能軟堅。苦能去濕。皂角之味辛。鹹。辛能利竅。鹹能去涎。名之曰稀涎。固奪門之兵也。師曰。凡吐中風之痰。使咽喉疎通。能進湯液便止。若攻盡其痰。則

無液以養筋反令人攣急偏枯此大戒也

刺瀝湯方見類中風內

○中經脉

無表裏症口眼喎斜半身不遂宜靜勝其燥是養血也
大秦朮湯汗吐下後初症既定宜靜藥養之半
黃清心丸痰涎盛竹瀝湯口眼喎斜瓜蒂散或蝦
汗吐之血虛四物湯吞涎經丹

大秦朮湯治中風手足不能運動舌強不能言風

邪散見不拘一經者此方主之

秦朮去苦

石膏各三兩
生用

甘草

川芎

當歸酒炒

羌活去芦

獨活

防風

黃芩

酒炒

白芍藥

酒炒

白芷

白朮

生地黄

酒洗

熟地黄

白茯苓

去皮各二兩

細辛

五錢

每服一兩水煎陰雨濕勝時加生薑七片春夏加

知母七分心下痞加枳實二錢煎服○按中風虛

邪也詳學士云留而不去其病則實故用驅風養

血之劑以秦艽爲君者攻一身之風也以石膏爲

臣者去胸中之火也羌活散太陽百節之風芍藥

風爲諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之細

辛三陰內淫之風濕責之苓朮去厥陰經之風則
有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清
以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風濕在足
少陰甘州緩風邪上逆于肺用歸芍熟地者所以
養血于疎風之後一以濟風藥之燥一使手得血
而能握足得血而能步也

牛黃清心丸 方見癰症

竹瀝湯 方見類中風條下

瓜蒂散 方見痰症

四物湯 方見血症