

種痘新書卷之九

寧邑張 琰遜王氏編

受業曾衡波全

痘後辨症賦

痘結痂。雖生意已成。其入九餘毒未消。而變症正慮其多端。是以眼合腹脹。猶爲危候。虛浮不退。尙是凶機。痂或成而反致失聲。前症恐爲黑靨。腫未消而眼已先開。疑是內攻。陽氣極而狂叫。喘呼。腸胃傷而嘔嘔不寧。至于冷風入胃。則利下。糞粘熱滲。膀胱則小便溺血。熱毒逗留。不化痂結。而壯熱增寒。經終各遺餘毒。日晡而潮熱往來。發在午前。爲實熱煩渴。腮紅中



種痘新書卷之九

寧邑張 琰遜王氏編

受業曾衡波全

痘後辨症賦

痘結痂。疔雖生意已成。其入九餘毒未消。而變症正慮其多端。是以眼合腹脹。猶爲危候。虛浮不退。尙是凶機。痂或成而反致失聲。前症恐爲黑靨。腫未消而眼已先開。疑是內攻。陽氣極而狂叫。喘呼腸胃傷而嘔嘔不寧。至于冷風入胃。則利下糞。粘熱滲膀胱。則小便溺血。熱毒逗留。不化痂結。而壯熱增寒。經終各遺餘毒。日晡而潮熱往來。發在午前。爲實熱煩渴。腮紅中。



時方作是陰虛便調人靜。他如撮唇弄舌。心經熱盛。何疑扶危。
抬胸肺胃毒冲有準。身熱療人而便秘。恐來暴急。驚風攣攣。
熱兼泄瀉久。變慢脾風症。驗喪目于眼合羞明。辨口疳疳。
齒黑寔熱下注。大腸必有秘結之禍。虛寒客留臟腑。乃成泄瀉。
之病。喘渴須分虛實。驗症切勿差訛。欲觀痲落之餘。再審喉。
之色。桃紅潤澤。榮衛俱安。紫黑乾枯。尚留風熱。粉白。爲氣血。
虛週過也。應深逝走馬狀牙疳之烈。月餘亦見長驅。遍體赤。
乃是失於解利。渾身青紫。恐爲風寒所吹。餘毒未消。不特爲。
爲癰。見風太早。恐其復發瘡瘍。此是先賢之秘訣。余前接學。
宜傳。

痘後調治法

痘至十五六日。膿齊其功已就。至是雖可無虞。第恐漿清肝熱。致留餘毒。爲殃。餘毒若在肌膚。是必爲疽。爲癰。疽癰既形。不可不內攻。此兒知其不喪。雖綿延亦可全生。若熱蘊肝經。則目紅頭痛。而眼合羞明。肺留餘熱。則咳逆痰涎。而瘡痍外著。實熱下注。大腸則大便或來膿血。裏急後重。致生痢痢之病。餘熱若滲膀胱。其必陰囊腫脹。以致小便赤痛。若夫口瘡腐爛。齒血牙疳。狐惑瘡生。皆是胃經有毒。至若驚搐狂言。昏沉瞤瞤。弄舌撮唇。悉是心家之熱。經絡若留餘毒。是以變生莫測。總隨症以調治。有熱則退其熱。有風則去其風。勿謂痘家之症。遂膠固而不通。



但用藥不宜太猛。恐元氣難在。寒涼良以大病之後。氣血已耗。不惟病者必須慎其藥餌。卽未病者亦宜謹其起居。蓋從治太早。恐生浮腫。冒犯風寒。致生潮熱。悞服食物。致腹脹痛。瘡口破。乃病瘡。瘡是以落痂之餘。最要避風寒。節飲食。莫速梳頭。早洗浴。不可出外行動。不可忍飢。過食熱物。慎勿多食生冷。須禁忌。必待氣回血復。精神如故。臟腑安寧。然後可以無虞。痘收結痂厚。遲之三日。自落者吉。又痂色光潤。其癢帶紅。更無他症。飲食如常者吉。自食痘痂。雖有他症。任凶不凶。

痘後雜症

潮熱

痘後發熱症有數端。有氣血回元而熱者。則悠悠潮熱。不煩不渴。不一二日。氣還血復。而熱自退矣。不必服藥。又有發後元虧。或久坐。久視。勞動傷神。而發熱者。只須安息調養。不必服藥。又有感冒風寒。而發熱者。必聲重鼻塞。惡寒惡風。宜用補中益氣湯。人參 黃芪 白朮 茯苓 升麻 柴胡 炙草。熱甚則以升柴為君。加前胡有咳嗽。加陳皮。桔梗。半夏。南星。炒。苓不過一二服。其熱自退。又有餘毒攻作。將發痘疽。而潮熱者。必痘漿清。痂薄。熱而頻渴。古有黃芩。遍身俱熱。有一二處尤熱甚者。即瘡之所在也。治此宜解餘毒。精神旺者用。連喬飲。

連喬

牛子

柴胡

前胡

當歸

赤芍

防風

荆芥

木通 車前 炒芩 炒連 出退 活石 甘草 弱者加

人參 黃芪 大便秘者加酒大黃 或頭目大痛者餘毒生

攻目疾將作也仍以連翹飲云木通車前活石加升麻枯梗川

芎薄荷白芷蒙花菊花 目社去當歸加胆草紅花生地俱

必熱退痛止藥方可止然痘後元氣已虛解毒之藥必傷元氣

若毒清熱退即宜溫補以順元神 又有氣血兩虛而熱者其

熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手足背不熱精神怠倦大小

便利者乃虛熱也其熱多在午後故曰發在午前爲實熱之時

方作是陰虛治此宜用十全大補湯 又有餘毒不形癰腫而

持傳于肝肺而發熱者晝夜不息舌有黃苔或十指捲縮用生



地 柴胡 白芍 炒芩 姜虫 勾藤 牛子 知母 丹

皮 澤瀉 花粉 炙皮 甘草 此必血燥皮紅

一痂落不落

痂黑唇紅而舌有苔其身有熱者此餘熱為殃而不落也宜用調元化毒湯與服解其餘熱外用細茶猪膏共搗以絹盛之印于痂上茶以解其熱膏以潤其燥其痂自落矣若痂薄唇白

而舌無苔者此元虛而血不潤故不落也宜用人參 黃芪

當歸 炙草 虫退與服外用雞膏與茶潤之而自落也又

有痘痂不落虛弱之甚昏沉不省人事者用人參清補湯入

參 黃芪 當歸 白朮 茯神 枣仁 麥冬 陳皮 甘



草。又有痂乾陷入肌肉而不落者。用乳香二錢、輕粉二錢、共為末。用猪膏調敷。又或用鷹糞燒灰、馬齒莧汁和蜜調敷。又或過服辛熱而痂不落者。用升麻、乾葛、防風、連翹、虫退以去肌熱而自落矣。

痘後發痒

抓破成瘡

此皆血熱之症。宜用黃芩、

黃柏、生紫草、

甘草、生牛子、

銀

花、生地、紅花共煎油搽之即愈。

痘爛復灌

致成瘡痂

亦用前方與搽。或用黃豆燒灰調油搽之亦可。

癰白



此因漿清而血不足也宜用四物湯加白朮 陳皮

紅花

唇不蓋齒

此氣血兩虛而毒留脾胃也失治將變走馬牙疳宜用人



當歸 赤芍 元支 牛子 連翹 石羔 石斛 甘草

玄參

坐立戰搖

此氣血虛也宜用八珍湯

飲食倍進

若面赤喘急二便秘澀則內熱症于消燥也若不急治必生他

症宜以四順飲主之

大黃 酒制 當歸 芍藥 甘草

痘後諸瘡

遍身枝節上生瘡者。名為疳蝕。此因風寒相搏。而氣血滯凝于腠理。而乃生是瘡也。宜以前綿璽散敷之。自愈。又有見風大早。致成癰癰。而出膿汁者。燒乾牛糞敷之。又有痘風瘡者。年

年至春即發。宜用防風 荆芥 牛子 甘草 苦參 當歸

又或用 當歸 連翹 牛子 防風 荆芥 生地 赤

芍 紫草 甘草 蒼朮 川芎 薄荷與服。外用黃丹 黃

相 黃芩 大黃 輕粉共為末。以猪油調敷。再于風池曲

池。三厘諸穴。以火灸之。則永不發矣。又有皮膚之間。隱隱面

起者。俗呼疙瘡。此皆餘毒滯于皮膚而然也。宜服解毒藥。外用

漆規剖開取其腹內之水洗之或用蜆壳煎水亦可蜆形如蚌壳生魚池泥中凡割漆者必用此壳俗呼漆規其性涼而解毒又有用活石一面甘草五錢共爲末調敷瘡上者名天水散凡痘痂之後抓破出血遍身復灌膿漿成血風瘡每至春夏南風一起其瘡復發秋冬自愈但不纏染他人者俗呼痘風瘡也欲其不發須用火灸風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥 銅綠 白礬 生大黃 生檀脂 流

黃 川椒 膽礬 梣子 炙白芷 水銀 錫 右方各等分

爲末另將錫融化入水銀攪勻然後入諸藥末調猪油敷上

若參丸

苦參 炒枝 防風 只壳 立參 獨活 黃連

大黃 菊花 等分 共爲細末。蜜調作丸。如梧桐子大。每服五十

丸。酒送下。

花蛇酒。用白花蛇一條。蒸米熬升。先放酒曲。次將布袋盛蛇

肝。干酒曲之上。然後將蒸米與酒藥和均。頓于蛇上。用帛封缸

口。候三七日。開缸取酒。將蛇去皮骨。每服酒時。配蛇全服。再將

酒調苦參末爲丸服。愚謂只將蛇去其首。置酒甑中入好

酒。封固其口。謾火煮熟。俟數日。取酒與蛇並服。

瘕癥



痘後忽然遍身青紫而發瘰癧者蓋血氣既虛肌膚未固條感風邪故如是也用虫退未一錢以生薑薄荷取汁調服令其發汗即愈

赤火流丹

一片通紅從頭起者過心不治從足起者過腎即死此惡青暴發乘血橫行也宜內服
玄參 歸尾 紫草 紅花 石羔
連喬 赤芍 骨皮 車前 木通 防風 荆芥 淡竹葉
引外用馬蝗蜢三五條置紅腫處叱去惡血以洩其毒乃不延去
又俗呼天虹腫余紅此症其小便赤澀乃用 玄參 紅

花 紫草 生地 防風 午子 連喬 木通 車前 澤



瀉朱苓 活石 甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之
用瓦鋒刺去毒血後用墨與三七塗之即愈

走馬牙疳

其先牙齦生痒時時出血繼而齦黑腐爛其齒漸落或每日落
一齒或一日旋落數齒滿口齒俱落盡乃死見齒生痒即宜施
治此蓋胃經蓄熱所致宜用人參石羔牛子甘草石解與服以
解脾胃之毒再用石羔牛子連喬黃芩生地紫草蛇床枯礬甘
草煎水與嚼即愈若牙齦腐爛則用蚕退散敷之 枯礬 三錢
人中白 即尿脚焙 五倍子 二錢 蚕退 燒一錢 蛇床子 二錢 共為末
先用蜡蠟重蘸米泔水洗淨水洗淨腐肉惡血然後以木藥敷



之。又救苦散亦治牙疳。人中曰。嫩青黛五分。冰片一分。

薑虫一錢半。寒水石三不。共為末。敷之。又用薑虫、丹皮、甘草。

連喬心、生地、銀花、桑白皮、沙參、茯苓、炒栢等分煎服。虛弱者加。

人參。

唇口生瘡

上唇有瘡，虫食其穢，其名曰狐。下唇有瘡，虫食其肚，其名曰惑。

皆由裏熱，生虫內食臟腑，以及于肛，而外于唇之上下，乃有瘡。

形也。必其人昏昏好睡，不思飲食，其聲喑啞，而音不亮，即狐惑。

也。此最惡之候，必致鼻衄齒落，失聲而死。宜用除慝丸治之。

黃連二錢。盧薈一錢。使君子肉三錢。白燕黃一錢。乾蟬三分。燒灰。

重五斤膏。水之一。宣後雜症。



練子肉 一錢

共為末，用烏梅洗淨，去核搗爛，和末為丸，米飲下。

又有口舌生瘡，赤者名赤口瘡，此心脾蓄熱也；白者名白口瘡，此心肺有熱也。赤者用陰陽散，白者用朱礬散。

又通名驚口瘡，以驚涎洗淨，即驚驚煎水洗之。

心散與服。又通名驚口瘡，以驚涎洗淨，即驚驚煎水洗之。

可必洗淨，乃可敷藥，亦有洗之即愈者。又用地脾虫、蘸米泔

水洗之者。

陰陽散 黃連 三錢 乾薑 一錢 共為末敷之。

朱礬散 硃砂 二錢 白枯礬 一錢 共為末敷之。

洗心散 黃連 歸尾 生地 木通 薄荷 牛子 連翹

桔梗 甘草等分煎服，澄心湯引。