

醫聖元戎班論萃英

東垣十書

共

醫曹壘元戎

王進之著

醫聖元戎

5 金匱黃耆建中湯

6 大建中湯

6 易簡杏子湯

嗽

7 大補十全散

勞

7 易簡胃風湯

瀉血

8 千里漿

9 荔苡湯

9 蜜酒

9 易老門冬飲子

9 治勞復麥門冬湯

10 海藏五飲湯

10 海藏大已寒丸

11 生地黄黃連湯

風血

11 增損理中丸

結胃

12 易簡參蘇飲

熱發

13 萬病紫苑丸

15 理中湯加減例

16 平胃散加減例

17 八物定志丸 補

19 潔古天麻丸 中風

19 大效牡丹皮散 血虛

20 海藏大五補丸

20 清心丸 治熱

20 火府丹 瀉下

20 調胃白木澤瀉散 水鼓

21 四物六合諸方

29 海藏當歸丸 三陰痛

29 苦練丸

29 喉閉不救方

30 拯濟換骨丹

31 三焦熱 三焦寒

32 癰疽諸藥附

34 蒸病五蒸湯

36 活人敗毒散 溫疫

37 三陽頭痛

37 癰黃茵陳蒿加減例

△ 38 掌中金 乾血氣

38 龍腦雞蘇丸 上焦熱

39 黃耆膏子

同上

39 地骨皮枳殼散

骨蒸

△ 40 易簡芎歸湯

血多

41 三奇六神翹法

41 千金種子法

41 搐鼻香

子宮冷帶下

醫壘元戎藥目錄

畢

醫壘元戎

新安 吳中珩 校

○傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病卽止

若少陽病脈微不可發汗。亡陽故也。宜附子湯。

若陽已虛。尺中弱。濇者。復不可下之。宜小柴胡湯。

若動氣在左在右在上在下。並不可發汗。宜柴

胡桂枝湯。若少陰病。脈細沉數。病在裏。不可發

汗。宜當歸四逆湯。若少陽病。不可發汗。宜小柴

胡湯 若咽中閉塞咽喉乾燥吐血衄家淋家瘡
家不可發汗已上六證並宜小柴胡湯 若下利
清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類 若四逆
厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯 虛宜
附子湯 有熱人宜黃耆人參建中湯 若少陰
膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸
若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏
扇湯 若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛
家亦然厥宜當歸四逆湯 虛者宜附子湯 有
熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻其熱必噦宜小

柴胡湯

若脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解假

令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小

柴胡湯

若脈濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒

陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內
煩此不可汗宜小柴胡湯 若濡而弱不可發汗

宜小柴胡湯

若浮而大浮爲氣實大爲血虛小

便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法

應衛家微可與小建中湯

若反更實津液四射

榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡

湯

若脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯

若脈浮

而緊者不可下而反下之爲大逆宜桂枝麻黃各半湯 若脈數不可下宜柴胡桂枝湯 若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯 若脈濇弱浮數不可下宜小柴胡湯 若濡弱微濇微則陽氣不足中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯 若結胸脈浮大不可下下之卽死宜小陷胸湯 若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯 若太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下之下之爲逆宜桂枝麻黃湯 若太陽病有外證未解

不可下。下之爲逆。宜桂枝麻黃湯。若病發於陽。

而反下之。熱入。因作結胸。病發於陰。而反下之。因

作痞。結胸則有陷胸湯。九三。痞則有瀉心湯。

五。若太陽與陽明合病。喘而胃滿。不可下。宜麻

黃杏子甘草石膏湯。若太陽與少陽合病。心下

硬。頸項強而眩者。不可下。宜小柴胡湯。若病欲

吐者。不可下。宜小半夏加橘皮湯。太陰腹痛。吐

食自利。腹痛。下之。必胃下結硬。厥陰病。渴氣上

衝心。心中熱。饑不欲食。食則吐。蛇下之。則利不止。

若少陰病。飲食入口。則吐。心中溫溫欲吐。腹痛。

能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中寒實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯 若無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法 若傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加人參湯 若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯 若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯 若陽明病身面赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若色黃者小便不利也宜五苓散 若陽明病心下

硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯 半夏瀉心湯

攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胃痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

○太陽證

桂枝二十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書

中所無者并諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生薑

切各二兩

芍藥

六兩

炙甘草

二兩

膠飴

一升

大棗

十二箇擘

右七味㕮咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三若嘔者加生薑若腹滿者去棗加茯苓四兩若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疴痛并四肢拘急疼痛甚者

加遠志半兩。若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加附子七錢半。若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許。若男子婦人諸虛不足小腹急扁脇肋脹下虛滿胃中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半。若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三

服令人精壯

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攣急或
腹滿弦急不能食起卽微汗出陰縮或腹中寒痛
不堪勞苦唇口舌乾精自出或手足作寒作熱而
煩苦酸痛不能當立此補中益氣

桂心

錢三

芍藥

黃耆

錢各三

甘草

炙

當歸

人參

錢各一

生薑

兩半

附子

五分

半夏

錢二半

棗

枚二

右以水五盞煎至三盞去滓分三服

易簡杏子湯治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛

勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

減半

乾薑

減半

甘草

炙

官桂

減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用鸛

殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍

藥如麻黃之數。乾薑五味子各增一半。名小青龍湯。

大補十全散

參耆朮茯苓

芍地桂歸川

三五錢秤用

生薑棗水煎

婦人虛弱用

名美號十全

治男子婦人諸虛不足。五勞七傷。不進飲食。久病虛損。時發潮熱。氣攻骨痛。拘急疼痛。夜夢遺精。面色痿黃。脚膝無力。喘欬中滿。脾腎氣弱。五心煩悶。並皆治之。

肉桂

芍藥

甘草

黃耆