

便毒 六十一

便毒論治如薛氏之法固已詳矣然又惟交感不潔遭淫毒而患者爲最多每每先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱穢毒之爲患也凡初起腫痛尚未成膿而元氣尚强者速宜先去其毒惟會膿散或牡蠣散爲最善○若已成膿則或針或蝕惟速去其膿隨因證調補使速收口爲善○若初起一核其痛微其腫漫者此有二證一以邪輕一以元氣虛弱毒深而然若邪輕者只用會通膏加麝香貼之無有不散或降癰散亦可若元氣虛弱而毒深者既不肯散又不早潰愈久必

愈甚最爲可畏及其潰後多不能收輕則爲癰重則殞命此
惟大補元氣方不致害○若癰腫痛甚膿已將成勢不能消
宜用降癰散留頭圍之則勢可斂痛可解膿可速成而潰也
立齋曰便癰屬足厥陰肝經內熱外寒或勞役過度或房慾不
節或慾火不遂或強固其精或肝經濕熱而致大抵多患於
勞役不足精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日方可愈
若大補血氣不旬日可愈何用百日蓋瘡之收斂在乎血氣
之盛也亦有內蘊熱毒而生者須辨虛實及成膿與否不可
槩投攻藥凡婦人患此者多在兩脇腫痛或腹中結塊小便

澁滯苟治者得法患者又能調攝無足慮也常見治此證者
槩用大黃之類下之以求內消或其膿成令膿從大便而出
鮮有見其痊也人多欲內消者蓋恐收口之難也若知補養
血氣不旬日而收矣何難之有若膿既成豈有可消之理如
再用剋伐之劑必致難治

又曰便癰者血疳也俗呼爲便毒言於不便處爲癰也乃足
厥陰之經絡及衝任督脉亦屬肝之傍絡此氣血流通之道
路今壅而腫痛是則熱毒所致宜先疏導其滯更以托裏之
劑此臨證制宜之法也

又治法曰內熱外寒者牛黃雙解散○濕熱壅滯者宜用龍
膽瀉肝湯疎肝導滯○慾心不遂致逆精氣者先用五苓散
加大黃疎其逆滯後用地黃丸以補肝腎強固其精○房慾
不節者宜六味丸料○勞倦過度者補中益氣湯

一男子患便毒燉腫作痛大小便秘脉有力以玉燭散二劑頓
退更以龍膽瀉肝湯四劑而消○一男子膿未成大痛服消
毒托裏等藥不應診之脉洪大毒尚在以仙方活命飲一劑
痛止又劑而消○一儒者腫痛便澀用八正散二劑以清肝
火導濕熱而腫痛愈再以小柴胡加芍歸澤瀉山梔二劑以

清火補血而小便利○一男子已潰而痛不止小便秘澀此
肝火未解也與小柴胡加黃柏知母芍歸痛止便利更以托
裏當歸湯而瘡斂若毒未解而痛不止者須用活命飲○府
庠沈尼文年二十左拘患之余以肝腎陰虛先用托裏藥潰
而將愈因入房發熱作渴右邊亦作痛膿水清稀虛證悉至
脉洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脉證頓
退再劑全退後用大補湯三十劑而愈○一男子腫而不潰
此因陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂刺柴胡
甘草以排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡補其氣血數劑

而愈○春元凌待之虛而服尅伐藥幾至危殆余用托裏健
脾藥而愈秀才王文遠因勞苦患之服小柴胡湯而表證散
後用托裏藥膿成針之而旬日愈又胡判官膿清脉弱以大
補之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉痢不止
竟致不救可見此證屬不足者多矣非補不可大抵便毒屬
肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤軟膿成故也若
尚堅硬乃元氣不能腐化往往人見堅硬只欲內消反服攻
散藥多致虛虛之禍前此治者卽其驗也○一婦人兩拘腫
痛小腹痞滿小便數白帶時下寒熱往來小水淋瀝余謂脾

氣滯而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味丸而全愈○一婦人小腹內如有所梗兩拘並人門俱腫小便淋澁經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如鷄卵而漸大脉洪數而虛左關尤甚屬肝膽鬱結之證也用加味歸脾湯肝火退而脾土健間以逍遙散下蘆薈丸而愈

俱薛按

楊梅瘡 六十二

楊梅瘡一證以其腫突紅爛狀如楊梅故爾名之其在西北人則名爲天泡瘡東南人又謂之廣東瘡凡毒輕而小者狀類茱萸故名茱萸瘡毒甚而大者泛爛可畏形如綿花故名綿

花瘡大都此證必由淫毒傳染而生蓋此淫穢之毒由精泄
之後氣從精道乘虛直透命門以灌衝脉所以外而皮毛內
而骨髓凡衝脉所到之處則無處不到此其爲害最深最惡
設初起時去毒不淨或治失其宜而隨至敗爛殞命者蓋不
少矣或至二三十年之後猶然發爲瘋毒或至爛頭或至爛
鼻或四肢幽隱之處臭爛不可收拾或遺毒兒女致患終身
其惡如此靜而思之則有見此惡道而不爲寒心知避者其
愚亦甚矣故凡治之之法最當知要切不可不慎也○亦有
不因淫毒傳染偶中濕熱而患者此不過在皮毛肌肉之間

清去濕熱自當全愈無足慮也

一今人每遭此患或畏人知或畏毒甚而大用攻擊峻利等藥多致邪毒未除而元氣先敗或成勞瘵或卽殞命或愈久愈甚以致敗壞不能收斂皆元氣先敗之故也余見之多矣故凡被此病者切不可驚慌亦不可專肆攻擊但按法漸解其毒務使元氣毫無損傷則正能勝邪雖毒無害若正不勝邪則微毒亦能殺人此其要也不可不察

一廣瘡治法凡其初起而元陽未傷毒亦未甚宜速用清利使從小便利去其毒惟換肌消毒散爲第一其次則五加皮飲

亦妙或兼火邪者宜秘仙方遺糧湯或稟氣多弱者宜茯苓膏凡此諸藥或十日或半月甚者一月無不見效○一凡生瘡毒者宜服槐花薤至二三升則毒從小便泄去可免終身之患真神方也有按在下疳瘡條中○一此瘡初起時多有先下疳次便毒而後瘡出是爲一套若便毒勢甚腫痛熱秘而元氣素强者卽宜用會膿散或牡蠣散先去其毒之大勢而後用前方諸藥亦要着也○一此瘡或久而不愈或元氣素弱或因尅伐致虛但見有正不勝邪之勢則當酌其輕重或以純補元氣爲主凡脾腎陰陽氣血皆宜隨證用方但使

氣血得復則雖毒無害最忌見不真而執兩端則終歸無益亦是要着○一飲食宜否有謂宜忌口者有謂不宜忌口者而任其發透總之亦有其要蓋瘡毒初染毒本未甚此時只宜清利使毒漸消爲善若食發物則愈發愈多而毒愈甚矣此則宜忌之時也若瘡毒已久元氣已弱膿汁旣多血氣旣耗斯時也非以藥食滋補則日見消敗何以收效此則不宜忌者也宜忌不宜忌是亦宜補不宜補之法耳使不知辨安能無誤○一瘡生頭面或遍身不便處欲其速愈但用點藥則二三日可以脫落亦神妙者也但此惟治標之法耳方在

新因四十二〇一瘡毒久蓄發爲瘋毒亦名楊梅癰漏或蝕
筋或腐骨潰爛不收最爲惡候近來治法惟五寶丹爲最效
及徐東臯楊梅癰漏方或秘傳水銀膏宜擇用之

止齋曰天泡瘡屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受證在
肝腎二經故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患
而後痛者有瘡凸赤作痛熱毒熾甚也瘡微作痛毒將殺也
瘡色白而不結痂陽氣虛也色赤而不結痂陰血虛也搔痒
脉虛浮氣不相榮也搔痒脉浮數血不相榮也臀背間或頸
間作痒膀胱陰虛也陰器股內作痒肝經血虛也陰囊作痒

重墜肝經陰虛濕熱也小便頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數短少色白脾肺氣虛也面目搔痒或變赤外邪相搏也脊間痒或毛落肝膽血燥也飲食少思口乾飲湯胃氣虛也飲食不化大便不實脾氣虛也侵晨或夜間泄瀉脾腎虛也

又治法曰若表實者先用荆防敗毒散解散之○裏實者先用內疎黃連湯通導之○表裏俱實者防風通聖散雙解之○邪熱在肝經者龍膽瀉肝湯清解之○後用換肌消毒散爲主愈後再無筋骨疼痛之患氣虛者四君子湯血虛者四

物湯氣血俱虛者八珍湯俱加兼證之藥治之自無不愈○
若治失其法有蝕傷眼目腐爛玉莖拳攣肢體者但用九味
蘆薈丸以清肝火六味丸以生腎水蠲痺消毒散以養血祛
邪亦有可生者○若服輕粉等藥反收毒於內以致迭發或
槩服防風通聖散氣血愈虛因而不治者多矣○凡有腫硬
或作痛外用蒜灸及敷冲和膏內服補藥並效

一男子遍身皆患脉浮而數以荆防敗毒散治之表證乃退以
仙方活命飲六劑瘡漸愈兼飲草薢湯月餘而愈○一男子
下部生疳諸藥不應延及遍身突腫狀似番花筋攣骨痛至

夜尤甚此肝腎二經濕熱所致先以導水丸五服次以龍膽瀉肝湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔蒜灸拔其毒而愈○一童子玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞蘆薈丸更貼神異膏月餘而安○一儒者患前證先玉莖作痒出水後陰囊股內小腹脇臂發小癰或乾或膿窠誤服祛風等藥肢體倦怠惡寒發熱飲食漸減大便不實脉見浮弦兩尺浮數此腎水虛熱肝木乘脾土也用六味地黃丸補中益氣湯爲主佐以換肌消毒散而愈○一人患此服攻毒等藥患處凹而色赤作痛肢體倦怠惡寒發

熱脈浮而虛此元氣復傷而邪氣實也用補中益氣湯二劑而愈○進士劉華甫患之數月用輕粉硃砂等藥頭面背臂各結一塊二寸許潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥唇裂小便淋漓痰涎上壅飲食少思此脾胃傷諸臟弱而虛火動也先用六君子二十餘劑又用補中益氣湯加山藥山茱萸麥門五味服之胃氣復而諸證愈惟小便未清痰涎未止用加減八味丸而痊○一男子患楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水淋漓少食無睡久而不愈以八珍湯加茯神棗仁炒服每日以蒜搗爛塗患處灸良久隨貼膏藥數日少可却

用豆豉餅灸之更服十全大補湯而愈○一婦人患之皆愈
惟兩腿兩膝各爛一塊如掌兼筋攣骨痛三載不愈諸藥不
應日晡熱甚飲食少思以萆薢湯兼逍遙散倍用茯苓白朮
數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜仲木瓜三
十餘劑而痊○一婦人患此燃輕粉藥於被中薰之致遍身
皮塌膿水淋漓不能起居以滑石黃柏棗豆粉末等藥鋪席
上令可臥更服神功托裏散月餘而痊

俱薛按

囊癰

六十三

立齋曰囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注也○腫痛未作膿者