

傷寒總病論卷第三

結胸證

心下痞證

陽毒證

陰毒證

狐惑證

百合證

痊濕暍證

痊候 濕候 暍候

發汗吐下後雜病證

傷寒勞復證

陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之熱入內作結胸其病心下堅滿



傷寒總病論卷第三

結胸證

心下痞證

陽毒證

陰毒證

狐惑證

百合證

痊濕暍證

痊候 濕候 暍候

發汗吐下後雜病證

傷寒勞復證

陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之熱入內作結胸其病心下堅滿



按之如石鞭而痛項強如柔瘕狀其脉寸口浮關上
尺中皆沉或沉緊名曰結胃也下之則和宜大陷胃
湯今作煮散煎之

大黃

壹兩半

芒消

壹兩捌分半

甘遂

末壹字

異末先以水壹升半煎大黃半升絞去大黃滓下
消末更煮一二沸內甘遂末和勻溫分二服一服
快利止後服如作煮散即先以水一盞煎大黃末
肆錢匕至捌分下消末貳錢匕候化勻下甘遂末
半錢匕沸勻溫服之移時未利再煎服快利爲度
藏結如結胃狀飲食如故時時下利寸口脉浮關上

脉小細沉緊名曰藏結舌上白苔生者難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上苔滑不可攻也結胃證其脉尺寸浮大者不可下下之則死

復宜發汗也

結胃證悉具煩躁甚者死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲甚內拒痛胃中空虛宿熱動甚短氣煩躁心下懊懣陽氣內陷心下固鞭則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也

結胃無大熱者此爲水結在胃脇也但頭微汗出者
宜大陷胃湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌躁而渴
日晡則少有潮熱從心下至小腹滿而痛不可近者
宜大陷胃湯

虛弱家不耐大陷胃湯即以大陷胃丸下之

結胃者項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胃丸

大黃肆兩葶藶子壹兩半朴消壹兩捌分杏仁貳合

杵二味內杏仁朴消合研如脂丸如彈子大抄甘
遂末壹錢白蜜貳合水貳升煮取壹升溫頓服之



南京中醫藥大學圖書館版權所

一宿乃下不下更服

小結胃正在心下按之則痛脉浮滑者宜小陷胃湯

半夏

陸半

黃連二分

栝樓壹枚用四升

呔咀水參升煮栝樓至貳升下諸藥煮取壹升去滓

溫溫服一盞食頃再服一日盡劑微解下黃涎即愈

太陽病下之脉促者不結胃此爲欲解也脉浮者必

結胃脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者

頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱而利脉

浮滑者必下血

寒實結胃無熱證者與三物白散方

小陷胃者非也

桔梗參分 巴豆壹分 貝母參分

細末內巴豆研勻白飲調下壹錢羸人減之病在
膈上必吐在膈下必利未利啜熱粥投之利過不
止飲冷粥止之

龐曰近世治結胃多行針頭丸用硫黃陽起石者若
病熱毒甚者必死唯治冷結寒實耳

心下痞證

病發於陰而反下之爲痞

發熱惡寒爲陽誤下則爲結胃無熱惡寒爲發於陰誤下則爲痞氣

傷寒下之後若發熱汗出者爲欲解若心下滿而鞭痛
者此爲結胃也但滿而不痛此爲痞氣宜半夏瀉心湯

甘草

黃芩

乾薑

人參各壹兩半

黃連半兩

大棗

陸枚

半夏

壹兩壹分

呖咀水陸升煮取參升去滓再煎壹升半溫溫飲

一盞日三夜二

設下後津液入裏胃虛上逆寒結在心下故宜辛甘發散半夏下氣苦能

去濕兼通心氣又甘草力大故乾薑黃連不能相惡也

心下痞按之濡其脉關上浮者宜大黃黃連瀉心湯

大黃

壹兩

黃連

黃芩

各半兩

呖咀以𩇚眼沸湯壹升漬之須臾絞去滓溫溫分

四服得利止後服

寒濕迫心氣不行欲作熱也

心下痞悶而復惡寒汗出者大黃黃連瀉心湯內加

附子主之

附子

壹枚炮去皮尖四破以水參合煎壹合去附子以附子汁內湯中和勻服之

與瀉心湯而痞不解其人渴而口乾躁小便不利者

五苓散主之

方在可水證中

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇

下有水氣腹中雷鳴下利宜生薑瀉心湯

生薑

貳兩

人參

甘草

黃芩各壹兩半

半夏

壹兩

大棗

陸枚

黃連

乾薑各半兩

咬咀水伍升煮取參升去滓再煎取壹升半溫作

四服

胃中不和為少陽木氣所制故用生薑之辛味

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹



中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

甘草貳兩 黃芩

乾薑

人參各半兩

半夏

壹兩 壹分

大棗

陸枚

黃連

半兩

咬咀水伍升煎至叁升去滓再煎取壹升半溫作

四服

胃虛故加甘味

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解不可攻痞當

先解表表解乃可攻痞攻痞宜大黃黃連瀉心湯

附子是汗出多而惡寒表將解而裏結未除故也此證是發後無汗惡寒故先須解表也

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭吐嘔下利者大柴胡

湯主之

汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故以大柴胡湯下之

病人脇下素有痞連臍傍引小腹入陰筋者此為藏結死

陽毒證

初得病一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒其病腰背痛煩悶不安狂言欲走或見鬼或下利其脉浮大而數面赤班班如錦紋咽喉痛吐下膿血五日可治七日不可治升麻湯主之不可作煮散

升麻

當歸

甘草

各貳分

雄黃

研壹分

桂枝壹分

散龜甲半兩

蜀椒

半分

吹咀水貳升煎壹升去滓溫服一盞食頃再服溫
覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳

陽毒宜葛根龍膽湯

方在雜發汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十
日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒
氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四支厥冷
其脉沉細而緊仲景云陰毒之候如被杖喉咽痛五
六日可治七日不可治甘草湯主之

不可作煮散

甘草 鼈甲 升麻 當歸 桂枝各貳分

蜀椒壹分 雄黃壹分

以咀水參升煎取壹升去滓溫溫毒飲一盞食頃
再服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之

治陰毒反陰丹

硫黃伍兩 研末 太陰玄精石味鹹者 研末 硝石研末各貳兩

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間

下硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用盞

子合定令三斤炭火燒令得所勿以煙出多急取

出以瓦盆合定地下四面灰擁勿令煙出直候冷

取細研烝餅心丸豌豆大艾湯下十五丸病重加



北京中医药大学图书馆版权所有

至二三十丸此法甚驗喘促吐逆者入口便安服
此藥三五服覺不退便於臍下一寸半灸之須是
大炷百壯未愈可至二百壯若手足極冷小便澀
小腹鞭疔痛囊縮即須更於臍下四寸如前灸之
乃與當歸四逆并反陰丹頻頻與服內外通逐方
可解若稍緩即死矣當歸四逆乃加吳茱萸生薑
者是慎勿與尋常利小便藥此是陰毒氣結在小
腹所致也有見小便不通便用炒鹽及裏熱藥熨
臍下欲望小便通利其冷氣在小腹之間被熱物
所熨無處通出即奔上衝心其死速矣

又治陰毒硫黃丸

硫黃

貳兩

水銀 壹兩

同研入銚洒少醋慢火炒欲似煙出再出火洒醋如此三四徧地上放冷研之烝餅丸梧桐子大每服二十三十丸艾湯吞下日三服食前

陰毒脉沉微欲絕四支逆冷大躁而渴不止附子飲子

附子

壹枚半兩以上者
炮去皮尖四破

以水九升煎至三升去附子入瓶油單緊封沉井底候極冷取飲之仍下硫黃丸甚妙

陰毒之爲病因汗下藥性冷所變多在四五日也或

素來陽氣虛冷始得病便成陰毒或始因傷風傷冷物便成陰毒其病六日內可治過六日不可治

狐惑證

狐惑之爲狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面乍黑乍白上部則聲啞甘

草瀉心湯主之

方在痞證中

蝕於下部則咽乾蝕於肛門

者燒雄黃薰之

雄黃壹味燒薰下部

病者脉數則熱微煩默默

但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日則

兩目四眦周皆黑若能食者膿已成也赤小豆當歸

散主之

赤小豆

壹升浸生芽曝乾

當歸壹兩

細末漿水調下二錢日三服

百合證

龐曰百合病者百脉一宗悉致其病意欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行或有美食時或惡聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則增劇吐利者如有神巢者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺頭不痛淅然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或二十

