

S25-7

1547

1部6

黃氏醫酒譜

經鍾家塾存幾堂本



謝鶴松主方

治中寒胃腕與心包

諸痛又兼氣虛陽

明頭痛嘔吐痰水

脉弦緊苔微黃

金鈴子 二個 良薑 加

延胡索 二分 北辛 下

煨草果 二分 附末 二方

明天麻 二分 枳實 下

五靈脂 二分 煨姜 二方

乳沒藥 二方 薑 二方

於菟根 二方 薑 二方

杭芎 二方 薑 二方

茯苓 二方 薑 二方

風葉 二方 薑 二方

米 二方 薑 二方

醫緒

婦門

閨政

外言不入閨門謹

裏足淡居聞識淺

養此幽閒貞靜身

無非無儀諸事簡

莫教勞慮及心脾

心血脾津兩充滿

窺隙踰牆猶且不免況使之得便奔趨以售其器將放僻邪侈無所不為而



婦德婦工舉歸鳥有列禦寇書巨鰲負山以遊女媧氏斷鰲足以立四極巨

二七之年天癸至 二十而嫁且從緩

鰲長女山少男易蠱象也斷者裏束之閭闔之使勿出四極父子君臣兄弟

不事君父專事夫 累身特有經孕產

婦而子臣弟友奚由各至其極人皇何以稱焉且夫媧皇長壽一稱者媧而

經之爲義主常行 應月如潮爲定算

人情之禮則實以不忍人之心出之而先有無疆爲恤者在也幾希之不存

月事依時孕易成 胎安產順並無險

至若陳宮之偃月隋宮之玉鉤乃至戕賊人而不可以爲仁義是又害禮之

所以柔順則利貞 經調百病與俱免

甚焉者也 附識孕亦蠱象彖云先甲後甲孕之六甲子也彖云幹父之蠱

由茲更見婦工多 酒漿藿豆及絲繭

若干外事心華開
性情之地失閑檢

男女無別或昏嫁太早則少年遲興每至如是而不知失養之爲患太

恣意青春衝任傷
醉以入房使肝損

習于動故欲動情盛而不可遏

更加思慮竭脾津
靜中火動復難遣

陰疑于陽斯必戰
其血元黃易所衍

經亂或閉或乾枯
患由氣盛失常範

治宜抑氣濡其血
收以桑榆猶未晚

氣用辛香以散之

血取酸和而鹹

下工動取建中歸脾爲治而實
實虛虛之戒

坤體無妨見陽虛

若偏甘熱失斯遠

經候

一切經病證治

當期腹痛證治

腹痛經來紫黑證治

腹痛經來淡

紅證治

兼食少便溏證治

色淡後期證治

寒滯腹痛子宮冷證治

經來腹痛踰躬寒戰證治

經後腹痛證治

挾熱經長五心煩熱證

治經短證治 挾燥發瘕體強證治 血厥肢體證治 陽邪干陰足

心發熱夜分亢甚證治 經來先期或作吐衄證治 先期紫黑證治

小腹中痛血結成團證治 大熱脈數證治 血乾脈濇證治 經熱色

如豆汁證治 經來紫黑成塊證治 四物湯 生地黃熟地黃分用法 橘樸四物湯 連翹四物湯 增

損四物湯 艾附四物湯 倍芍藥加胡黃連法 加澤蘭木香法 秦

芩四物湯 羌活四物湯 升柴四物湯 地連四物湯 芩連四物



補血四物湯
連述四物湯
增損四物湯
蔓朮四物湯

四物湯
主治婦人一切經病

生地黃
當歸
洗芍藥
酒燭各五錢至

一兩川芎
錢半至五錢煎湯服寒證脈遲者改用熟地黃

橘樸四物湯
治血中氣鬱
當期腹痛

陳橘皮
二錢厚樸
三錢加入錢煎服

連述四物湯
治經來紫黑腹痛

黃連
一錢
錢莪
入前方煎服

增損四物湯
治經來淺淡腹痛或食少便溏

方內去地黃
加入蔓朮
白朮
土燭

各四錢
甘草
煎服

芩朮四物湯
治經水後期色淡

黃芩
酒燭
白朮
入前方煎服

第三

色淡後期

婦人經病四物湯
地黃生熟判溫涼

經期應月為常道
以此調經大用彰

腹痛當期緣氣鬱
橘皮厚樸定加將

紫黑加連與莪莖
淡紅增損餉之彊

增蔓朮草損去地
並主食少大便溏

色淡後期行失節
溫經芩朮法宜明

此方故名芩朮溫經湯其以芩佐朮正猶陽旦之以芍佐桂也

乾薑四物湯 治經因寒滯後期

方內用熟地黃加乾薑三錢附子

炮五錢至一兩煎服

加黃芩 酒燭白朮 治經來腹痛

躬戰

艾附四物湯 治經後內虛腹痛

艾二香附子 鹽水燭乾薑 錢半加入

煎服

倍芍藥加胡黃連 二錢治挾熱經長五心煩熱

加澤蘭 半錢 治經短少

秦芫四物湯 治血虛夾燥常時發瘧體強

秦芫 三錢加入

乾薑四物湯 艾附四物湯

若兼寒滯子宮冷

薑附加行許復常

腹痛鞠躬寒戰慄

兩方合進服之康

經後腹痛純虛耳

湯內加行艾附薑

五心煩熱因挾熱

厥泄行露熱且長

倍芍加用胡黃連

經短澤蘭與木香

燥而作瘧秦芫入

風厥肢體活匡

醫者 卷一 婦

經候

寒滯後期腹痛子宮冷 腹痛鞠躬戰慄 經後腹痛 挾熱經長五心煩熱 經短

四物加味逍遙飲

羌活四物湯 治風乘血虛常作血厥四肢羸曳

羌活 三錢加煎服

升柴四物湯 治陽邪干陰足心發熱夜分加盛

地連四物湯 治經水先期或作吐衄二方並見虛門

芩連四物湯 治經水先期紫黑

黃連 三錢酒燭黃連薑汁燭二錢加入煎服

延胡四物湯 治瘀結成團小腹中痛或要脇痛

延胡索 鹽酒燭三錢 牡丹皮 四錢 臨期生用

肉桂 二錢去粗皮加入煎服

二連四物湯 治血虛脈數表裏大熱方見虛門

四物加味逍遙飲 治血乾脈瀯加味逍遙飲方

見風門

四

病未及經而經有必病之勢若經病此證仍在者宜以先本後標為治

陽邪干陰足心熱 夜分劇以升柴攘

妄行定取地連益 先期紫黑芩連襄

世籍用桃仁承氣然病在血海不在腸光未若此之兼能生血為善

結痛延胡牡丹桂 大熱脈數二連行

桃仁承氣醋煎散皆所特禁而延胡牡丹蒲黃澤蘭亦非所宜

血乾脈瀯難攻創 加味逍遙合進良

經來而熱如豆汁 紫黑成團連附商

血乾則急在本 妄行則急在標

七證相因權緩急 閒時調補用輕方

連附四物湯 治血熱經如豆汁或如屋漏或紫黑成塊

黃連 酒燭半香附製三錢加入前方煎服以上七證往往相因用藥分別前後緩急參用

因用藥分別前後緩急參用

四烏湯 主治血中氣滯經前作痛腹柔

烏藥 酒燭香附子鹽水酒醋重便

甘草 炙一錢加入四物湯內煎服

加木香 一錢縮沙蜜二錢治前證且行且痛

連附四物湯 四烏湯

血中氣滯經前作痛腹柔證治 且行且痛證治 上攻頭痛作嘔證治

上攻咽痛證治 經閉咽痛證治

四烏湯 加木香縮沙蜜法 蘇子降氣湯 桃仁承氣湯

血中氣滯腹常柔 每痛經前久未休

四烏湯中用四物 烏藥香附甘草儔

經且行而且痛者 木香沙蜜更相投

甚為頭痛或兼嘔 又或痛及于咽喉

醫者 奪一婦 經候 血中氣滯經前作痛腹柔 且行且痛



蘇子降氣湯

治前證頭痛作嘔或咽痛方見虛門

桃仁承氣湯

治前證延為經閉上攻咽痛方見寒門

蘇子降氣行毋緩

氣順能令血順流

病重在氣熱故宜寫府陽

經閉而為咽作痛

桃仁承氣服之瘳

氣中血滯腹中團結經前作痛證治

堅悵如孕經閉證治 月事具行

且痛證治

醋煎散 變通醋煎散

失笑散煎

醋煎散

主治氣中血滯腹中團結經前作痛或經閉腹悵

香附子

重便烏藥酒燭各二錢

莪朮

赤芍藥各錢甘草炙一錢

用醋燂

肉桂去粗皮碾一錢加碾末紅沙湯調湯服經

氣中血滯痛團結

甚若妊娠堅悵極

必先病痛經後病堅悵乃為非孕

醋煎散用香附烏

棱莪芍甘肉桂協

閉堅帳如孕者倍進

變通醋煎散 主治經閉堅帳如孕

香附子 醋煮三棱 醋煮一宿 赤芍藥 酒燭各半

迷 醋煮三棱 醋煮一宿 赤芍藥 酒燭各半

和 酒燭各三

失笑散 治前證經行且痛

五靈脂 酒碾散去沙 蒲黃 五分

半燭酒煎 一錢二分 蒲黃 半生

紅錫調服

變通醋煎散 失笑散煎

醋燭調服用沙錫

能將銅蔽倏開闢

變通棧蓮用醋煮

去桂甘而用牛和

經行且痛失笑散

五靈脂取酒碾給

蒲黃半燭半用生

酒煎調以紅錫服

血虛滯痛喜接證治 作帳證治 子宮作冷證治 身寒證治 經來

瀉證治 兼嘔證治 便秘證治 決津煎 加木香法 加吳茱萸 法 加附子法 加紅華法 加

醫者 卷十一 婦 經候

氣中血滯月事且行且痛

決津煎

醫經第六

血虛滯痛喜按
嘔便秘
內冷
外冷
總矣

決津煎

主治血虛
滯痛喜按

當歸

酒洗一兩
熟地黃

五錢
牛薊二錢
酒燭

澤蔞

鹽水燭
肉桂

去粗皮
一錢
烏藥

煎湯服
酒燭三分

加木香

證兼悵
五分治前

加吳茱萸

去閉口泡鹽水燭三
錢治前證子宮冷

加附子

炮四錢治
前證身寒

加紅華

三分治前證
經來滯少

加乾薑

一錢
縮沙密
五分治前
證兼嘔

加肉樅榕

洗滌二錢治
前證便秘

乾薑縮沙密法 加肉樅榕法

血虛滯痛喜按摩

俗手一逢血滯作痛動行下瘀血湯桃核承氣湯而不知虛虛之為禍大

決津煎用歸地

牛薊澤蔞桂烏藥

作悵更以木香和

內冷吳茱萸外附子

經來滯少佐紅華

此與經短略同唯有痛無痛小異

嘔加乾薑縮沙密

便秘樅榕記弗譌

此乃血少而燥不可誤認府病遠
殃用下藥以傷其府

血實瘀凝小腹作痛拒按證治

夾寒證治

夾熱證治

悵薑證治

通瘀煎 加吳茱萸肉桂法 加梔子法 加牛膝赤芍藥法

通瘀煎 主治血實小
腹瘀痛拒按

當歸尾 三錢 山楂仁 燭 香附子 鹽酒

醋童便 遞燭 紅華 青皮 烏

各二錢半 藥酒 澤瀉 各二錢 木香 湯服

加吳茱萸 去閉口泡鹽 肉桂 去粗皮一

錢治前 證夾寒

加梔子 燭二錢治 前證夾熱

加牛膝 燭酒 赤芍藥 酒燭各三錢 治前證悵甚

病在子藏而不在府故但順氣以順其血而無取峻下以傷其府
血實瘀凝痛小腹 通瘀煎以拒按屬

歸櫨紅華香附子 青蒿木香暨烏藥

寒加萸桂熱加梔 悵甚定資牛膝芍

氣盈不和經亂或前或後時多時少時數時斷證治 經閉成勞發熱證

治 調營丸 間服逍遙飲法

通瘀煎

醫者 卷十一 婦 經候 血實瘀痛拒按 夾寒 夾熱 悵甚



調營丸 柏子仁丸

歸附丸 主治血氣不和

當歸 四兩 香附子 半斤 童便浸透 曬乾 酒醋鹽水

薑汁 遞燭 共為末 醋煨丸 每服三錢 沙密煎湯送下

調營丸 主治經亂前後參差長短 多少不一或一月再至而

又兩月 一至

四物湯方 重用六味地黃方半 倍用

加香附子 童便浸透 曬乾鹽水 酒醋遞燭二兩 地

子 燭 陳橘皮 各兩 白朮 燭一兩 共碾末

煉密和丸 梧子大 每服 五錢 早晚淡鹽湯下

興逍遙飲 間服 治前證延為經閉 成勞發熱二九遞

用

柏子仁丸 主治經來 短少汗多

醫經 第七

經亂無準時多時少時數時斷 經閉成勞發熱

氣血不和經錯亂 落後參前無定準

歸附丸偕沙密湯 時多時少數忽斷

調營四物六味兼 香附地仁橘朮伴

因而經閉作勞熱 逍遙飲與丸相間

經短汗多證 柏子仁丸

柏子仁丸熟地黃 牛薊續斷澤蘭芳

柏子仁去油熟地黃各四兩牛薢酒蒸

二續斷澤蘭各三兩卷柏一兩熟地

壽泥餘碾末加陳蜜和杵為丸
梧子大每服八十九童便下

韭汁飲治倒經吐血

童便飲治同法取年未十二無
病童子清長小便用食乳

小兒小便更佳

犀角地黃湯治倒經或吐或衄脈盛上魚方見暑門

香附丸經自汗

香附子製如熟地黃各六兩當歸

烏鰂骨童便浸燭澤蘭芍藥各三兩

川芎一兩其碾末浮麥磨麵二兩煮

梧子大早晚各服四錢

韭汁飲香附丸

更資卷柏蘇枯血汗多經短服之良

倒經吐血飲韭汁或取童子小便給

或吐或衄脈上魚犀角地方湯一服

否則浮火而已

倒經自汗香附丸地歸烏賊合澤蘭

倒經鼻汗證治熱汗如蒸證治香附丸當歸龍薈丸

腎者一婦經候汗多經短倒經吐血衄血倒經自汗



溫經湯

富歸龍膏丸

治前證熱汗如蒸服如上火方見暑門

醫經策

倒經熱汗如蒸經水不調口唇乾燥要痛

芍芎雀麥和黃醋

早晚行丸病可稍

熱汗如蒸心火盛

當歸龍膏進之

經水不調煩熱要痛證治

經阻欬嗽便血證治經水愆期或過多煩

熱證治 齋藥尋強痛證

溫經湯 大溫經湯 附子散加麻黃肉桂桃仁法

溫經湯

主治經水不調虛火上浮脈緩口唇乾燥或要痛

當歸芍藥

酒燭四錢川芎人參

甘草

炙肉桂去粗吳茱萸閉

口泡鹽牡丹皮半夏薑汁麥水燭

溫經湯內歸芍芎

淺甘肉桂吳茱萸

虛火上浮經不調

脈緩唇乾或痛要