

女科要訣卷之十三

進賢舒詔馳遠著

論調經

大凡經水不調必皆因病而致無病之婦豈末有不調者也經云女子七歲而齒二七而天癸至月事以時下交媾而成孕七七而天癸絕地道不通而無子乃天然不易自然而然安得有所謂經水不調者哉蓋為病所阻營衛經輸不能自裕運行升降皆失其常以致月事愆期或前或後不以時下倘若不能分經辨証按法治病徒用調經諸藥不但經不能調其病不除而身不死者幾希矣必求其所以致病之由或為六淫外邪或為七情內傷或為飲食傷脾或為痰飲阻隔或本氣多火迫血妄行



而經無常或素稟虛寒陽氣不運而血凝滯或經水短澀由
陰精枯涸或崩中帶下皆因脾胃氣虛凡此務宜審其病源
經索其本氣辨其陰陽確有所據而後按法以治其病而經
經輸各自流通運行升降悉如其常則經自調矣所謂治其病
即所以調其經上乘法也

從來女科皆重在調經謂經不調不能受孕故專以調經為主
自予觀之殊屬不然常見有子之婦無論經水調與不調皆能
受孕其無子者並非五不女之類雖月信如期身終無產此蓋
天地造化之妙有莫之爲而爲者不可得而知也其調經之說
竟可以不必而治病之道必不可不講若病不除匿但不孕命
且去矣故特以治病爲上重要訣也推之安胎催生亦皆當以

治病爲主其法屢試屢驗其理可信可畏女科諸方概不
非敢謬然臆說翻剝前賢竊恐貽悞後世定出于不得已也
同志君子當必有以諒之

六淫外邪乃風寒暑濕燥火六氣也六氣爲病各不相同
不外乎六經以六經之法按而治之而更察其本氣辨其虛
是則皆得之矣

七情爲病不必穿鑿千所因統而言之皆爲郁鬱憤懣之氣
阻遏胸中以致飲食漸減則生化之源漸窒因而經水漸白
不調法主宣暢胸膈條達脾胃收攝腎氣方申宜用黃芪白
朮茯苓遠志砂仁白蔻半夏桔梗故紙兔絲更當相其本氣
而爲加減



客問憂鬱成病逍遙散可用乎曰不可名雖善而禁不通在
憂愁憤懣則胸中鬱結其氣消阻主平靜上而生陰則為病
能受人勸則情懷舒暢其氣發揚主平動上而生陽病故愈
蓋為憂鬱一段陰氣痞塞胸中飲食不下憤懣增劇斯時不
為宣暢胸中條達脾胃而反用柴胡薄荷重耗其陽更加滋
歸白芍愈滋其陰而不死者亦罕矣

飲食傷脾者宜用砂仁神曲人參白朮等藥

痰火阻隔者宜用六君加炮姜草果等藥

火邪迫血妄行者宜用生地丹皮梔子仁童便涼血活血藥

藥更加參芪補其氣以統攝之

余稟虛寒者宜用木附姜桂參芪等藥

血虛肝燥陰精枯涸者宜用歸地歸之等藥

脾虛氣弱不能統攝而為血崩者宜用人參黃芪白朮

欠實故紙鹿茸之類

凡血妄行者或上溢而為吐血或下行而為崩漏均為脾虛

不能統攝所致法宜大補中氣一定之理也且有妄行于後

陰者曾答門人馬貫一云一婦人奇証每當期腹中痛連少

腹引入陰中其經血不行于前陰反從後陰而行三日則腹

痛諸証俱已次月當期亦復如是此為何証當用何法予曰

此太陰脾氣虛弱不能統攝少陰直陽素虧陰寒內結而為

腹痛侵入厥陰則痛連少腹引入陰中其証為三陰寒極

阻截前陰經血不能歸于衝任而直趨入腸宜用人參黃芪



扶蒼白朮以大補中氣附子肉桂乾姜砂仁以驅少陰之寒
吳黃川椒以散厥陰寒結更加山藥灸寔地瀰大腸香附
年霜引導前陰一定之理也曹一卽依此法爲之調理數月
則經調而受孕矣

女科書雖有調經先去病之說然不能分辨六經按法治病
如所載赤白帶下白淫白濁癰瘕積聚痞腸胃石癥諸証
但執一方而無可遇之理誠恐所悞後人而是書之所以作
要訣之所以名極知僭越無似寔出于不得已也否則曷敢
更置一喙哉

論閉經

經閉不通者亦必各有所因未有無因而成閉經者也從前女



科諸書不能視病用藥所載方論概不足錄今酌定治病手眼
總在臨証之際詳悉審問察其本氣分別六經辨其寒熱虛實
得其所因確有所據按法爲治其應而响若其人陰虛寒中經
血短少漸至乾枯而經不行者宜用歸地阿膠滋陰養血用皮
以瀉血熱降香以行血中之氣香附片以通其經而經自行若
其人陽虛陰盛冷積胞門而血不歸經者法主附杜姜桂以逐
冷積參芪苓朮人補陽氣使陰退陽回而經自行 曾醫龔雲
從之婦經信兩月未行醫用膠艾四物加紅花二十餘劑則飲
食漸減舌胎漸乾且黑謬謂有火再加炒苓又二十餘劑則舌
胎更加芒刺滿口腹膨作泄人事困倦身重惡寒雲從來宮寒
治吾以飲食減少腸膨作泄屬太陰人事困倦身重惡寒屬少

陰胎刺乾黑者陽虛不能薰騰津液之所致也方用茂米姜附
砂半桂苓故紙等藥六劑而身發大熱者知其泄且夕間必自
止又三劑泄止矣身熱漸減而腹中又作大熱雲從心腹下太
過予曰裏陽來復佳兆也積陰可化經當自通又十餘劑而人
事康復飲食加健腹膨俱消舌胎盡退經信行通如故又有爲
精積一証乃因經信當行血海未淨而強交媾精與汚濁互結
而積于胞胎之中以致阻塞經閉不通壯類有孕而証不同有
孕之婦飲食喜惡不常且腹中胎息汨汨微動精積之証悶亂
不安飲食不下腹無胎息可驗東當密照其夫果有此中
攻堅破積方用糯米一兩用斑蝥十五個同炒黃色易斑蝥
再炒去斑蝥用糯米花蕊石一兩硫黃五錢同煨爛淨取山士

血五錢 川山甲 炒五錢 製硫黃五錢 無名子五錢 巴豆霜三

紅花三錢 桃仁三錢 降真香三錢 硃砂一兩 肉桂五錢 黃其

白朮五錢 人參五錢 虛寒者加姜附五錢 火旺者去肉桂加人

黃香附五錢 已上俱為末 神曲糊為丸 每用開水服五錢 攻通

堅結即愈 若用藥不得其法 延至牢不可破 無能為也 有為

滋痰估 露胞胎者 其腹漸大 白帶常來 飲食非如孕婦 喜強不

常且又無胎息 可驗由其脾胃素虛 而生化之源 留飲窒塞

是以經血不行 兼之腎陽不足 不能化氣而痰乃微 估露胞胎

法宜大君子加砂仁 草果 干姜 肉桂 南星 香附等藥 其痰仍隨

白帶長驅而下 其腹漸消 經信復通 可以受孕矣

通經之道 仍在治病 調經門言之已悉 茲不復贅

論安胎

安胎之道法當求其動胎之故然未有無故而胎自墮者乎中
必有所因或因脾虛氣弱而不能載或因縱慾傷腎而不能安
或因攀高或因跌撲凡此均宜大補元氣調理脾腎如參芪苓
朮熟地黃故紙等藥若火旺加歸地阿膠黃芩虛寒者加附子炮
姜肉桂若胃有寒痰加炮姜半夏若兼嘔逆加砂仁白蔻吳萸
丁香若三陽外感頭痛壯熱表邪大盛正氣受傷而胎動不安
者則當分經解表以去其邪而胎自安若爲三陰中寒陰邪內
攻下利厥逆腹中急痛其胎必動宜亟回其陽以驅其陰而胎
自安若陽明內結火邪入胃燥渴陰精胞胎立壞外見惡熱不
眠舌胎乾燥噴熱如火大便閉結法當或驅其陽以救其陰能

見幾于早不失其宜胎亦可保

曾醫房媼懷孕三月而患熱病求吾藥吾見其口燥心煩
欲飲冷老陽明裏熱也法宜白虎以撤其熱汗出惡熱自止
閉結者胃寔也法宜調胃承氣以蕩其寔口苦咽乾者少陽
腑証也法宜黃芩以瀉腑熱舌胎乾黑芒利滿口者內火燥
乾津液陰欲竭之徵也腹微痛而胎欲動者熱邪逼及胞胎
也若不急行驅陽救陰之法胞胎立壞不可爲矣卽用白虎
湯合調胃承氣加黃芩一劑而熱勢畧殺再投一劑泄下二
次結去津回諸証皆愈其胎卽安此但治其病不必安胎而
無不安者也曾見有懷孕五月者卒中寒頭重如厭腰痛
如折厥逆而惡寒腹痛而胎欲墜法當亟驅其陰以救其陽

而胎自安粗工不鮮但用膠艾安胎散數劑而竟隨其胎且斃其生矣

又有懷孕七月者漏下清水時值秋分之後燥令大行乃為肺經受燥醫者不識謬執成法以為脾虛而用健脾之藥不効又謂藥不勝病再加大劑十餘服水更加甚而胎墮矣其後仍復下水醫謂不產後元氣暴虛更重用大劑數劑而証變喘促直視口不能言延予診之肺部洪勁無倫面色焦槁肌膚燥燥鼻鬚扇動吾知其不可為矣乃詰醫者曰若謂脾虛何所徵驗蓋脾虛者當必自利不渴今大便結硬口乾心煩乃為燥傷于肺其氣下迫胃中津水長驅而下而反用健脾之藥愈助其燥而肺愈傷今見肺脈洪勁無倫鼻鬚扇動

乃肺氣立絕之候而可為哉醫者不能置候少頃氣湧而死矣明年九月又有懷孕七月受秋燥而漏下清水者其詞與前死者無異其家懼而求予診視之依然肺脈湛潤而色乾枯心煩不眠吾用玉竹天冬阿膠雞子白以清肺燥便開提甘草和中一劑而効五劑全愈可見安胎必當治病不能除命且去矣可不慎與

孕婦小便癃閉不通
婦科書名之曰轉胞謂氣虛則胎下墜壓翻膀胱為轉胞因胞系了戾小便不通了戾者緩紐也法主大補中氣何其謬也胞為胞胎膀胱為尿脬並非尿胞小便不通關係出竅十糸無干何必曰胞系了戾且小便不通名曰癃閉不宜驟

細法當宣暢胸膈而醒脾胃使上焦得

通中樞得運而後氣
化能行方宜白朮砂仁半夏肉桂更加
枯梗開提生姜升散
苓朮水壅塞不行何
脫停痰可為定例其
証皆有寒熱虛是不
用藥方為妙筭女科
諸方皆非肯要吾不敢從

附胎前預服良方

炙黃芪三錢 製白朮三錢 木白茯苓二錢

西砂仁一錢 炙甘草八分 兔絲餅二錢

覆盆子二錢 破故紙二錢 木廣陳皮六分

右方用煨姜一片水

煎服若體虛者加人參陽虛者加附子

血虛者加歸地火旺者去砂仁加黃芩此方必宜多服
孕以後即服是藥不可歇手俾元氣足則胎自固而無
之患內氣充則產自易而無產難之患且臨產不受驚
必無病然又胎元足兒體堅無恙此為培元之後天即所以
毓兒之先天上乘法也凡孕婦有氣虛者必當及時治之務令其
更勤治不可遺其病于產後治之
論催生

孕婦產難亦皆有所由來懷胎十月形完氣足必自分娩產母
無病其產自順今既發動兒已出胞頭已向下降為三五日不
產其中必有所因或為氣虛不能運送宜用人參黃芪茯苓白
朮補氣之劑或為血虛津乏而不流利宜用歸地阿膠髮灰龜

板之類或爲疾病侵害以致難產當按六經之法分經用治使
病去而產自順醫不知此任用催生諸方無端妄投徒驚其生
而已矣

曾見產婦臨盆數日不產者其証嘔吐不止腹中大痛少氣懶
言身重無力此少陰証也催生諸方不可用吾用黃芪白朮附
子肉桂砂仁半夏炮姜吳萸一劑而嘔止但仍腹痛未減依然
少氣無力于是倍加芪朮再投一劑則腹痛止而氣力加健其
產如達母子俱無恙

又醫一証發動六日見已出胞頭已向下而竟不產醫用催生
諸方又用催生靈符又求靈神丹俱無効延予視之其身壯
熱無汗頭項腰背強痛此太陽寒傷營也法主麻黃湯作一大

劑投

皆治

令溫服少頃得汗熱退身安乃索食上訖然

病而病自順上乘法也

論產後

女科書謂醫產後諸病當以大補氣血為主此言雖得其大

然有當補有不當補者而當補之中又有分別血虛補血必當

補其氣氣虛者必不可兼補其血其氣血而虛者法當重在

補氣蓋陽生則陰長也觀女科所用諸方往往偏勝補血而且

又重破血然產後內臟望虛必不可破縱有瘀血亦不必破

務在求其所以然者是必因病而致治法拙當辨其寒熱陰陽

對証用藥使病去而瘀自行不知治病傳知破血必殺之矣

產後眩暈不醒人事者俗名血暈主用破血貽害千古此為氣

