

中西割症大成

光緒丁酉伏夏
曲園居士



	S294
	1561
	1部5冊



中西割症大全

曲園叟俞樾
子吳下書



南京中医药大学图书馆版权所有

肉瘤圖



生顙骨下

半骨半肉瘤
從顙骨下
穴內生出



肉瘤圖
後生頸




半骨半肉瘤圖
生顙骨下穴內



大脂瘤圖

印度有人生此症
自肚腹垂至足而



半骨半肉瘤圖



骨瘤圖

割開見內
如象牙




大肉瘤圖
生頸上



大脂瘤圖

生腎囊



肥瘤圖

生頸上多年



肉瘤圖

生月下



血瘤

生腦上



脆骨瘤圖

生手背




割開所
見如此



脂瘤圖

生鼻隼上

乳癰潰爛圖 此種堅硬



血瘤紮線圖

乳癰潰爛圖

此種軟易流血

上下左右
共線八條
結四處




浮肉

縱橫紮式

面癰圖

生顙骨下脣






骨剪鉗



鐮骨器



烙骨器



挖骨器




剪骨曲鉗



剪骨曲鉗


腐骨漏




掛骨鉗




半圓骨鋸




小方骨鋸



小長骨鋸



長骨鋸




大鋸柄

UNIVERSITY OF CHINA
北京中医药大学图书馆藏
1961


半管針圖

又名導引針
銀作者佳



探針圖


銀作者佳



探膿針圖



彎刀圖
銳鈍兩種



小割刀圖



小割刀斜式




小割刀平式



小長割刀
刺入膿流式



小長割刀
斜刺式



放血後用布帶
綁割口式




大小臂相交處迴血管圖




圖中大者係迴血管
細線係腦氣筋

小利刀圖 又名放血刀




小利刀放膿血式



圓口銳尖彎刀圖




圓口銳尖彎刀放膿圖



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館藏

布帶
放捲式



布帶纏束
腿足式




合口膏
藥裏護
瘡式




布帶放捲纏束手腕式




布條纏指式



布條纏束手腕式



穿過皮後
剪去餘線



扁針引線圖

器機放血式



機器放血式



玻璃杯



銳鉤針穿線式




鈍鉤針穿線式
又名血囊針



小銳鉤圖



鈍鉤圖



銳鉤圖



縫皮微彎針圖



縫皮彎針圖



縫皮直針圖

炎症論畧

一論積血為炎症之根。凡有阻礙血行之患。血必停積。或物壓住。或因打傷。或因發冷。血所積聚之處。或現青藍色。或紅黑色。比如眼或被打傷。或風吹初起。眼熱之症。皆因血積。凡血積聚在微絲血管。其故甚多。各有不同。比如手面觸冒風霜。初成藍色。漸變紅色。皆受月晒。或皮受大烘。皆變紅色。亦係此處血積微絲管。在外目所能見者。各樣血積如此。在內臟腑。目不能見者。亦屬相同。凡各部位積血。毋論在外皮。在內臟。皆為炎症之根源。止有積血。隨散而不成炎症者。未有發炎。不先由積血而成者也。凡積血統歸兩端。一血積各部位。毋論何故。微絲血管。發力皆能積血。一切積血。毋論何故。因各物壓住血管。不令血行。

論血積各處緣由。一係發炎部位之旁。四圍微絲血管積血。一係被繩線紮縛。或被血瘤及各物壓住。致令微絲血管積血。一係身弱。或係各部位。先經發炎之處。皆易令微絲血管積血。一各部位勞力太過。亦能令積血。食物過度。胃之微絲血管積血。炙火受熱過多。及湯火微傷等類。亦能積血。感冒風寒。臟腑積血。凡初覺積血。毋論內外。即屬發炎之肇端。若能速為調解散。不致炎症之漸增。斯誠善治也。

論炎症

論積血為炎症之根 積血緣由

炎症者。是最要之症者。醫者須知。凡病皆有炎症相雜在內。或生大小瘡。或大熱症。各臟腑損壞。內傷。下痢。疔毒。砂淋。白濁。風溼。生腐骨。眼症。出麻。出痘。發斑。麻瘋。此皆炎症也。或內外臟腑。四肢。脊髓。腦漿。骨肉。皆有此症。有輕有重。有新有舊。其所起之處。形狀紅腫。痛熱。有患在腦內之漿者。有患在腦漿外衣者。有患在肺內本體者。有患在肺外胞膜者。有患在胃者。有患在大腸小腸者。有患在肝脾本體者。有患在肝脾包膜者。有患在膀胱或內或外者。有患在骨內。或患在骨衣者。以上各部位。症屬相同。潮厥發炎之部位。皆有微絲血管積血而成。如指甲與頭髮因無血管。則無發炎矣。

一論炎症形狀。色紅而漸腫。亦因患處有微絲腦筋。故起痛。蓋發炎一症。在外目能察視者。有四。紅。腫。痛。熱。至於身內。臟腑骨內之發炎。無論何處。皆有此四端焉。

一論炎症緣由。或感冒傷寒。或大熱症下。紅白痢。砂淋。或內傷咳嗽。或湯火傷。或被凍物久壓。或誤食各種強水。或強水蝕入肉。或毒氣侵染。或痘毒疔毒。或打傷皮肉。針刺刀傷。跌斷骨。或紮縛過緊。或蛇傷犬咬。或膀胱有砂。或食物誤吞入肺管。或彈子穿陷肉內。以上均能令人發炎。

一論炎症傳開別處。炎症初起一處。漸漸生潤。傳到別處。部位有五等。不同傳之遲速。歷定。

一。由外皮而起。而由外皮而傳開者。或由肺大小腸內皮而起。即由內皮而傳開者。或由肥網而起。即由肥網而傳開者。二。由外皮或肥網而起。漸由汲液管。迴血管。傳開別處者。如疔。或脚生瘡。皆傳之腿較之核腫痛。手指生瘡。則傳之腋下之核腫痛者。三。不論何處部位先起。可傳到附近相連之部位。比如由外皮先起。而傳入肥網肌肉等處者。或在一處。臟腑先起。傳至第二處。臟腑者。此處包膜。亦可傳過別部包膜者。四。由腦筋傳開別處。此如疔腮發炎。則男人傳入腎子。婦人傳至乳核。五。因發炎處所生之膿。傳入血管。此膿由血管流至臟腑。各處能令發炎。多生小瘡。

一。炎症原分兩等。一新炎。一舊炎。若數日或十餘日。即屬新炎。若過十餘日。不愈延至數旬。或數月數年者。皆是舊炎。其舊炎之起。有二。一由新炎不愈變成者。一由炎症漸積不覺。初發即成舊者。醫者必須詳辨。何者為新炎。何者為舊炎。分得清楚。始能施治無差。倘炎症初起。即設法令其速愈。不致變為舊炎。善之上者也。但病者於初起時。尤宜善擇良醫。不可玩忽自誤。

一。此症上文既明釋新舊之由。第新舊之中。仍各有輕重之別。不可一概而論也。比如眼熱。臟腑熱。傷風咳嗽。損傷等。毋論內外。凡屬症之輕小者。雖是新炎。不難醫治。即戒慎調攝。或服

藥些少。自可告痊。若新炎症屬重者。關乎內臟氣管等類。則危險居多。至舊炎之症。則尤當辨其能愈不能愈焉。若由新炎延緩變成者。雖屬難治。醫者多方設法。幸或數旬數月而愈。或一二年方能痊愈者。又有皮肉潰爛。筋骨腐脫。骨較生硬。癰瘍。或內臟受傷日久。各等重症。竟至終身不能瘳者。則同一炎症。其新舊輕重之間。判若天淵。可不慎思而明辨乎。

一論炎症初起之後。各有不同。有部位發炎。不久全愈者。有發炎之後出水者。如本腫有發炎。在內則為疔。有發炎之後生膿者。以上所言有兩三樣並發者。亦有祇見

一樣者。有發炎之後。其肉成死黑色者。發炎之後。變態既殊。所以受炎之處。形狀亦隨之各異。或腫而軟。或變硬。或收縮。或生厚。統論患炎之處。大概如此。

一論炎症腫狀。凡人生外膚發炎。無有不腫。惟身內包膜。腕骨及眼罩睛皮。口內皮等處發炎。則不甚腫。腫亦有遲速硬軟之分。倘或跌打火傷。強水。滾水。蛇咬等傷。其腫必速。有頃刻手足俱腫。或腫遍周身者。有腫起甚急。瞬息便消者。有腫至日久而不消者。有由漸而腫熱退方消者。有因腫而該症轉輕者。有因腫而該症反重者。若患處有水。其腫必軟。患處出明汁。其腫必硬。硬者其症重。軟者其症輕也。腫處若硬。則逼緊血管。血不能行。其症故重。至於喉嚨暴腫。呼吸不能出入者。更為危矣。

一論炎症之熱。凡發炎之部位必熱。或一處。或週身。若人身無病者。祇熱九十八度。西國醫士用寒暑針安放受炎之處。或病者身上考覆的確。是以知發炎。或大熱者。其熱過一百度之外。或百零五度不等。

一論炎症之痛。部位若發炎。功用必改。人若身內無病。其脛筋不痛。有病則痛。假如大小腸包膜無病。雖大力按之。不覺痛。若發炎。雖輕手摸之。亦痛。大小腸內皮若壞。其脛筋必痛。外皮無病亦不痛。若發炎。功用改。常按之覺痛。眼耳鼻舌。若發炎。其功用亦改。眼發炎則畏光。不欲見物耳。發炎不能聽聲音。鼻發炎。即傷風。不能嗅馨香。舌發炎。食不知味。氣管發炎。或聲低。若失音。胸漿發炎。則謔言妄語。臟腑發炎。其津液必變。不及平日。皮發炎。則汗少。肝發炎。則膽汁亦少。內腎發炎。小便短少。肺發炎。初則痰少。久則更多。大腸發炎。則下瀉或下血。發炎之症。若輕者。祇在該部位而起。不能連累別處。若症重者。不但本部位受患。必連累別處。或臟腑。或週身不安。其人於未發炎之先。則或頭痛。或骨痛。口苦失胃。或微熱微寒。精神困倦。遍體不安。如此則或一二日。或四五日。便成熱症。其熱朝則輕。而夜則重。其脉速而洪。面與眼畧紅。皮燥無汗。手足俱熱。不欲穿衣。夜睡不寧。呼吸喘急。舌起胎。或紅或黃。或白。少津液。飲食失味。思茶口。或生膠。作悶胃不安。大便結。肚有風而脹。按之畧痛。大便臭。膽汁。或

多或少不等。炎症小便多有變質。或畧紅而有底。如無病人。每日夜則三十二安士。至四十二安士之多。如炎症身熱。或少一半。或少三分之二。

一腦漿不安睡。不能合眼。目不欲見光。耳不欲聽。各樣聲音。

新炎症

新炎之症。其部位則有熱痛。紅腫四等。其色亦有鮮紅。淡紅之分。若部位血管多者。則鮮紅。血管少者。則淡紅。若脾與肺之包膜。內腎小腸包膜。及內皮外皮。是血管多者。若發炎。則更紅矣。至於心與心腕骨包衣。腦漿。腦筋。肥肉。是血管略少者。若發炎。其色則淡。亦有倏然而發紅。有由漸而變紅。大約在中間則鮮紅。在旁邊則淡紅。有祇紅一處。有散開四圍。若其症重者。其色始則淡紅。繼而深紅。其肉若死。其色則由紫而變黑也。又有等用手按。定則無色。放開而紅者。有霎時紅不久自散者。此非發炎也。

發炎之處。初覺畧痛。漸腫。但其症曰重。則其痛愈甚。有痛在最紅腫之處者。有散開四圍痛者。或以手按其患處。則倍痛。或動之更痛。有早輕而午後更甚者。痛狀亦分部位。各有不同。若肺包膜發炎。脇下則痛如刀割之狀。肥網發炎。或生瘡。或背癱。其痛如徹。若肝肺發炎。其痛則如刺。腎子發炎。其痛若裂。皮發炎。則覺熱而癢。骨發炎。其痛如蟲咬。水管發炎。其痛如沸水傷者。



眼發炎。痛如有砂粘者。牙發炎。其痛如跳動。此是各處部位發炎。痛狀不同。發炎症。亦有非一定。痛在某處部位者。如患砂淋。膀胱發炎。其痛在水管頭。大髀骨較發炎。其痛在夕。肝發炎。亦有痛其右肩者。若臟腑本體發炎。與色膜發炎。其痛迥不相同。若肝肺腦漿發炎。其痛畧輕。如肝肺腦漿各種色膜發炎。其痛尤甚。至於風溼之痛。天氣晴和則輕。天色昏暗則重。疔毒骨痛日輕。而夜重者。是其常也。惟肚痛有時。而痛時而安者。或以手壓之則安。離手復痛者。如此雖痛劇。亦非發炎也。腦筋若每日痛一回。日日依時而痛者。亦有無腫而痛者。有痛在上下左右者。有腫甚而不痛者。雖未必盡發炎也。肺發炎。亦有不痛者。小腸熱症。發炎。亦有不痛者。脊骨發炎。至成腐骨而不痛者。亦有之。統言發炎之症。痛者重。不痛者恆輕也。醫者當留心察其某部位。痛則病在某。經如何痛狀。是發炎如何痛狀。是非發炎。查察明白。而後立法治之。庶不致有誤也。

一論炎症血質。與平人不同。凡發炎之症。身內之血。本質變壞。若係無病之人。放血流出。不久稠結。所以能稠結者。因為血內虽有明汁故也。好人之血。每一千分之内。有三分係明汁。若發炎之後。血內之明汁。必多每一千分之内。多至六分。或八分不等。間或多至九分。十分者。其症畧輕者。其血內之明汁。由漸生多。至四五分。不等。其炎症轉重者。血內之明汁。加多至七八