

外形篇

胸 乳 腹 脘 腰 肠 皮 肉 脉 筋 骨

東醫寶鑑

卷三



東醫寶鑑外形篇卷之三

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君

廟許浚

奉教撰

胷

胷膈之名有義

夫人之胷者呼吸之所經飲食之所過一或失節則疾病邪氣交至於胷中乃

有凶之兆故謂之胷也

也

膈膜在心肺之下與

背脊胷腹周面相着如幕不漏蓋膈者膈也遮膈

濁氣不使上薰於心

肝故謂之膈也

胷膈度數

胷圍曰尺五寸缺益以下至觸筋長九寸

櫛

咽以下膈以上通

謂之胷

也

胷膈部位

膈者心肺之分野也

胸腹者藏府之郭

也

膻中者心主之宮城也

也

咽之下胃脘

也貫膈與肺系相並在肺系之後其上卽咽門也

胃腕之下卽胃之上口也謂之貫門其膈膜相貼

之間亦漫脂

相巨也

門

胃腕

管一作

貫膈

與心肺

相通膈膜相綴也

門

心包絡

在心下

橫膈膜

之

上陞斜膈膜之

下與橫膜相粘

黃脂漫包者

心也

漫脂之外細筋膜

如絲與心肺相連此包絡也

門

心包絡

也門

臟腑經脈皆貫膈

手太陰之脈

上膈屬肺

手陽明之

脈下膈屬大腸

足陽明之脈

下膈屬

足太陽

屬胃絡脾

足太陰之脈

上膈狹咽

其支者別上

膈生在心

手少陰之脈

下膈絡小腸

手太陽

之脈

下膈屬

小腸

足少陰之脈

上貫肝膈

手

少陽之脈

下膈偏

脈陰之脈

下膈歷絡三焦

手少陽之脈

下膈偏

屬三焦

足少陽之脈

貫膈絡肝屬膽

足厥陰

之脈

上貫膈布脇肋

已上十一經

腎貫膈惟足

太陽循下于

背故不貫膈

脉法

脈陽微陰弦則胃痺而痛陽微故知在上焦陰弦故知胃痺而痛躁○胃痺痛寸口脉沉而遲關上

小緊而數躁

心腹

宜見沉細不宜見浮大

躁

心腹痛脉宜沉細忌浮大弦長

躁

心腹痛脉

沉細宜浮大弦長命必殂

躁

沉弦細動皆是痛

證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然

躁

躁

胃痞脉滑爲有痰結弦伏

躁濫則氣劣

躁

痛左手脉數熱多也脉濇有死血也右手脉緊實

躁

躁

是痰積也脉大必是久病也兩手脉堅實不大便

躁

躁

可下之痛甚者脉必伏臥

躁病右關脉多弦弦

躁

而遲者必心下堅

躁

躁

大爲心痺引背痛短而數或濇者心痛

躁

躁

心痛與胃脘痛病因不同

心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令

心下急痛。真心痛卽死不治其久心痛者是心之支別絡爲風邪冷熱所乘痛故成疹不死發

作有時經久不得差也。○胃之上口名曰貴門。貴門與心連故經所謂胃腕當心而痛。今俗呼

爲心痛者誤也。夫九種心痛詳其所由皆在胃腕而實下在於心也。○脾當心而痛脾藏運心

而痛局方皆云心痛蓋心痛少而脾胃痛居多心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也。○門令

心病者胃中痛。○諸經心痛引背多屬風冷。諸府心痛難以俛仰。○嘔瀉多屬熱。○

心痛有九種

一曰虫二曰疰三曰風四曰悸五曰食六

曰飲七曰冷八曰熱九曰去來下通用手

拈散九痛元通靈散拈

前陰

痛元神聖代鍼散

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果玄胡索靈脂并沒藥酒調三二錢。○似手拈却瞞

九痛元

治九種心痛及積冷心胃痛炮附子三兩吳茱萸人參乾薑炮巴豆去皮油各一兩狼毒

五錢右爲末蜜丸梧子

大溫酒下三五丸

焗

通靈散

治九種心痛蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍藥各五錢右剉五錢水煎入鹽少許服

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當歸蓬术各五錢右末蜜丸梧子大陳皮煎湯

下二三

十九

指

蟲心痛

胃脘痛痛定便能食時作時止者是虫痛也研心痛吐水者虫痛不吐水冷心痛

蛔

虫痛

面色

之證心腹痛上下攻刺嘔噦涎沫或吐青水

青黃宜化虫丸化虫散妙應丸

見三方並門

門

虫痛二

陳湯

妨覲加苦練根煎服

醫

虫痛

小兒多有之當與虫部

參考治之

瘡心痛

卒感惡忤尸疰神昏卒倒口噤不省宜蘇合香元

方門。備急丸妨覲。與中惡同治

風心痛

因傷風冷或肝邪乘心兩脇引痛宜
麻黃桂枝湯或分心氣飲。方見氣門

悸心痛

因七情怔忡驚悸以致心痛宜四七湯。方見氣門

◇心傷者勞役則頭面赤而下重心中痛而自煩
發熱脣上跳其脉弦宜辰砂妙香散。方見神門

食心痛

因食生冷或食物過多以致心痛宜香蘇散。

飲心痛

傷水飲聚痰涎心痛如刺宜芎夏湯。方見痰飲門

寒門平胃散。方見內傷門

散。方見內傷門

水飲流注胃腸痛三花神柘丸。方見內傷門

桂枝湯或分心氣飲。方見氣門

冷心痛

寒氣客於背俞之脉則血脈滯血脉滯則血虛
血虛則痛其俞注於心故相引而痛。內門

形寒

飲冷當風取涼或腎邪乘心痛則心懸若飢泄利

下重宜五積散。方見內傷門

○寒冷心痛宜扶陽助胃湯桂

門

枝四七湯 雞舌香散 神效散 邶痛散

草荳蔻丸 温胃湯 抽刀散 二薑丸

扶陽助胃湯

治胃脘當心而痛經曰寒氣客於腸胃之間則卒然痛得熱則已此藥主之附

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻益智仁白芍藥酒炒人參甘草炙官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮

各五分右剉作一貼薑

三片棗二枚水煎服

桂枝四七湯

治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各

七分人參紫蘇葉甘草炙各五分右剉

作一貼入薑三片棗二枚水煎服

搗

雞舌香散

治心腹冷痛丁香百枚白芍藥酒炒二兩良薑一兩甘草炙五錢右爲末每取二錢

陳米飲

調下

神效散

治一切心脾痛遇冷便作引入背膂痛不可忍服之絕根木香青皮陳皮麥芽枳殼三棱蓬术神麴白芍藥白芷肉桂玄胡索破故紙甘草

各七分草澄茄丁香各三分右剗作一貼入薑五片棗二枚

水煎服

郤痛散

治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢半當歸肉桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分右剗作一貼入

鹽醋各少許水煎服

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩草豆蔻煨白术各一兩麥芽炒神麴炒

半夏製各五錢乾生薑青皮陳皮各二錢炒鹽五分右末蒸餅和丸茶豆大白湯下五十丸

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃芪各七錢益智仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢縮砂

厚朴人參甘草各二錢右爲末每三錢

入薑三片水煎服礞一名益胃散礞

抽刀散

治急心冷痛斑猫七箇胡椒四十九粒右同炒令猫焦碎去之取椒爲末熱酒調下渺

二薑丸

大治心脾冷痛炮乾薑良薑等分爲末糊和丸梧子大橘皮湯吞下二三十丸渺

熱心痛

積熱攻心暑毒入心面目赤黃身熱煩燥掌中熱大便堅宜連附六一湯金鈴子散莎芍散梔

薑飲

甚者大承氣湯渺下之渺實熱心痛小

柴胡湯

方渺去人參甘草枳殼梔子仁赤芍藥

各一錢水

煎服

醫

連附六一湯

治熱鬱胃腕痛甚黃連六錢附子一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎熱服渺

金鈴子散

治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩右爲末每二錢酒調下痛止與枳朮丸防覲去

其餘邪

保命

名玄金散

門人

莎蒿散

治會服熱藥熱物致胃腕痛久成痼瘻香附子川芎各五錢黃連梔子各二錢半木香乾

薑各一錢半檳榔酒黃芩芒硝各一錢

右爲末

每二錢熱薑湯調痛時服

梔薑飲

治胃熱作痛山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入生薑汁三匙再煎熱服或入川芎

一錢尤

妙

門人

去來痛

心痛或作或止久而不愈也。心包絡爲風邪冷熱所乘痛故成痲不死發作有時經久

不得差

神仙九氣湯

方

吞下九

痛元

方

見一服

卽止

癥

心胃久痛宜用莎蒿散

方

見妙應丸

方

見

妙應丸

方

積元

方

傷

脾

心痛亦有六

一曰脾心痛二曰胃心痛三曰腎心痛四曰積心痛五曰厥心痛六曰真心痛

脾心痛

者心下急痛也。心痛甚而至於脇下如刀割

也

○宜用訶子散手拈散坊見復元通氣散

氣門

訶子散

治心脾冷痛不可忍。一服見效。訶子炮厚朴

乾薑

炮草果陳皮良薑

炒茯苓神麴

炒麥芽

炒甘草

炙各等分右龜末每三錢水一盞入鹽一捻候痛時煎服

胃心痛

者腹脹而心痛。胃脘當心而痛內經曰木鬱之

厥陰

之勝。胃脘當心而痛上支兩腸。膈咽不通。又

太過故民病

有土敗木賊之候也。夫胃爲脾之府

陽先於陰故藏未病而府先病也

○宜用草豆蔻丸

方見加味枳术丸

清熱解鬱湯清鬱散

加味枳术丸

治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噫氣吞酸嘔

吐脾疼等證白术三兩枳實蒼术猪苓麥芽炒神
曲炒半夏各一兩澤瀉赤茯苓川芎黃連東壁土

同炒白螺螄殼煅各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁土
炒青皮蘿蔔子炒乾生薑各五錢陳皮去白便
香附瓜蔞仁厚朴檳榔各三錢木香甘草各二錢
右爲末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子大

清米飲下

百丸劑

清熱解鬱湯

治心痛卽胃脘痛一服立止山梔子炒
黑一錢半枳殼川芎香附子各一錢黃

連炒蒼术各七分陳皮乾薑炒黑甘草炙各五
分右剗作一貼薑三片水煎服戒飲食半日

醫

清鬱散

治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔
吐酸水惡心煩悶半夏陳皮曰茯苓蒼术便

香附神麴黃連薑汁炒梔子薑汁炒各一錢川芎六分乾薑炒黑五分甘草炙三分右剉作一貼入

薑三片水

煎服

醫

腎心痛

心痛與背相控善瘛如從後觸其心僵僂者腎心痛也

下重而若泄寒中名腎心痛

○下急痛病名曰瘛

○癇

○最甚五苓散

○治腎心痛

○

腎傳之心病筋脉相引心下急痛病名曰瘛

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

神聖復氣湯

○治腎元

○與膀胱經中陽氣不足致胷脅

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子炮各三分
白葵花三朵去心碎右剉作一貼水五大盞同煎
至二盞入黃芪草豆蔻煨各一錢橘紅五分同煎
至一盞乃入前浸兩藥再煎至一大盞去渣熱服

空心
陳

積心痛

飲食積聚遇食還發名曰積心痛癲 ◇ 凡人飲食後忽然暈倒口噤不言目不識人四肢不舉

多因飲食過度氣道窒塞或着氣惱而然急用薑鹽湯多灌探吐之後服平胃散內傷六君子湯貽

餸

◇ 食積心痛宜用行氣香蘇散煮黃丸

方見草豆蔻丸

方見加味枳术丸

方見加味枳术丸

行氣香蘇散

治內傷生冷外感風寒又觸七情惱怒飲食填滯脅腹脹痛紫蘇葉陳皮蒼朮

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一

錢右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服

右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服

右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服

厥心痛

者因內外邪犯心之包絡或他藏之邪犯心之支脉謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又

痛極則發厥也

入

○厥心痛者他藏病于之而痛也邪在心則亦心痛

瞤

○寒厥心痛者手足厥逆

寒門

而通身冷汗出尿清不渴氣微力弱急以术附湯

方觀

溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩躁其脉

洪大可與金鈴子散

方觀社

○乍間

乍甚成疹久不

名曰厥心痛

顆

真心痛

心痛手足青至節名曰真心痛

顆

○真心痛者

手足青至節心痛甚朝發夕死

夕發朝死

櫼

○真心痛者大寒觸犯心君或

血衝心手足青過

真節者

朝發夕死夕發朝死

櫼

○心爲諸藏之主不

可傷傷之而痛者爲真心痛

手足青至節朝發夕死夕發朝死不假復治

搏

○真心痛者因內外邪

犯心君一日卽

死無治法

心腹並痛

心腹並痛宜二炒香良散二胡散厚朴湯桂

靈散雞舌香散坊見蟠葱散前觀五積散坊

無效

寒備急丸救急

蘇合香元方門

二炒香良散

治心腹痛香附子良薑等分各炒爲末

入鹽少許每一錢米飲調下若同炒則

無效

入鹽少許每一錢米飲調下若同炒則

無效

二胡散

治心腹痛玄胡索胡椒等分

爲末每二錢溫酒調下

門入

厚朴湯

治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各一錢赤茯苓

乾薑炮甘草炙各一錢右剉水煎服之

門入

桂靈湯

治心腹大痛危急者桂心五靈脂良薑炒厚

朴製各等分右細末熱醋湯服一錢立止

門入

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

門入

無效