

傷寒論淺注



第一輯

公書

〔清〕陈修园集注

傷寒論箋注

北京市中国书店

内 容 提 要

《伤寒论浅注》6卷，清·陈念祖撰。陈念祖（约1753—1823年）字修园，号慎修，福建长乐人。陈氏富于著述，由后人辑成有《南雅堂医书全集》等，在普及医学知识方面有较大的贡献。《伤寒论浅注》系陈氏按《伤寒论》原文，删去平脉辨脉篇、伤寒序例、诸可与不可等篇，另加注浅释而成。其注文以张隐庵、张令韶二家学说为主，兼采诸家精义以阐明经旨，是影响较大的《伤寒论》注本之一。今据上海广益书局印本影印。

伤 寒 论 浅 注

出版：北京市中国书店

发行：北京市新华书店

印刷：北京大中印刷厂

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：5.5

定价：1.10元

辨太陽病脈證篇

關長樂陳念祖修園集註

太陽主人身最外一層之為病。外則脈應之浮。何以謂經內經云太陽之脈連風府上頭

頭項強痛。何以為氣內經云太陽之上寒氣主之其病有則手足循身之背故其為病

衛外之氣也。若病太陽之氣則通。此言太陽之為病。總提大綱。

體惡寒若病太陽之經則背惡寒。此言太陽之為病。總提大綱。

太陽強痛之病。若得病發熱。風為陽邪其性汗出。風之欲見風始惡而為惡風。數性

於脈之中而緩者。名為中風。其命為中奈何。蓋以風者善行而最速。此論風中太陽

之肌腠。定業許步雲按風陽邪也。太陽之性為

太陽強痛之病。中風外又有陰邪之證。其氣感者其時或未發熱。然已發

曰不同而於其先。然者一在惡寒。以傷風者有風時始覺其寒也。一在體痛。以寒邪外乘

也。一嘔逆。以寒邪內侵。裏脈陰足陽寸俱緊者。以太陽本寒而加以外寒。兩寒之氣

曰傷寒。其名為傷寒。何以廣表。此論寒傷太陽之廣表。陰兩陰相合之為病。蓋在惡寒二字

人之言傷寒者。動曰傳經。其所以然之理。難言也。有正傳有邪傳。有陰陽。有傷寒。一日太陽

氣受之。然太陽與少脈若安靜。為止在太陽。不傳陰於少也。頗欲吐者。即少陰欲吐。若

兼見足躁。陰少煩。其脈數急。而靜者。乃病太陽之化。為傳也。傷寒如此。中風亦然。

又以六經之傷寒二日當陽明三日當少陽主氣之期若陽明反為熱之外證不見者為氣之相傳也傷寒如此他經可知矣此二節一論陰陽表裏相傳

一論六經之氣相傳

且夫太陽病之即發者有中風傷寒之異至於不即發者內經謂冬傷於寒春必病溫為伏邪在少陰或熱邪自內出其證脈浮而強痛發亦謂之太陽病但初發熱而渴不發寒者類於外証別為溫病治之類若無項強痛其性以導之如麻杏甘石湯阿膠湯主之病輕者陽虛陰虛之人周身之經絡渾是熱氣布復治法只宜求之太陽若黃連湯明書之表如所云心中懊憹去上胎者梔子豉湯主之渴飲水口乾舌燥者白虎加若醫誤用辛溫之劑汗之其內證之熱得幸發汗已身反灼熱者所處逆變重泄名曰風濕風濕之為病若何脈陰又陽寸俱淺其自汗出病為太陽中風之本原而大可患者全身皆而多眠睡息必軒為腎熱而語言難出為腎上連心也若被誤下者津液渴便不利津液渴於上則直視且既竭之餘腎氣將絕失津危乎若更被火熨者以熱攻而現出微者皮發黃色為土剝則攻心如驚痛生風時應瘕止後黃竟若火熏之現出香之衣色是下為一逆尚可引日再逆則促其命期推而言之凡服一切清導之藥皆皆其可破火之禁繫此言太陽病中有溫病誤治即變為厥逆也

太陽底面即足少陰治太陽之病即宜預顧少陰二經標不寒熱不同醫者必先了然於心後推緣入扣內經云太陽之上寒氣主之以寒為本以熱為標也又云少陰之上君火主之以熱為標也病有發熱惡寒者發於太陽之標也無熱惡寒者發於少陰之標也發於

陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也此一節提陰陽寒熱標本之大

綱並按陰陽之數以定病愈之期言手足標本之異手之太陽其標也與手少陰為表

也與足少陰為裏裏無熱忌

裏發於足少陰之標陰也

何以謂發於陽者七日愈太陽病頭痛證至七日以上應奇自愈者以太陽之行其本經

請言其所以愈之故如太陽病頭痛證至七日以上應奇自愈者以太陽之行其本經

已盡七日故也若愈欲作再經者陽明受鍼足陽明足三里穴使經不傳則愈推之發於

例而得其旨矣此節承上文而言病愈之期又提出行其經三字謂自行其本經與

傳經不同曲盡傷寒之變幻六經皆有行有傳舉太陽以為例

索陰陽之數既可推其病愈之日而六經之病欲解亦可於其所旺時推測而知之

氣隆太陽之所主也邪欲退正欲此一節承上文而言病愈之時以見天之六淫能傷

人之正氣而天之十二時又能助人之正氣也

邪解後未全暢快曰病衰曰少愈皆可以風家七日陽得奇表而解然難而餘不了了

者侯過五日五日為一候十二日精神愈愈推之寒為陰邪如發於陰之病六日陰得候

者五臟元氣始充合共此一節承上文而言既愈之後而定以全愈之期也

標治又不在此例此一言太陽脈日即在下陰脈知太陽標熱而本寒少陰標寒而本熱太陽之

標即少陰之本少陰之本即太陽之標上善以於熱而熱言猶未暢明其義故請再申之為

辨太陽之證者病人身大熱熱在外而反欲得近衣者寒在內是熱在太陽所皮膚寒

在少陰所骨髓也身大寒寒在外而反不欲近衣者寒在內是寒在太陽所皮膚熱

在少陰所骨髓也。陽根於陰，司命者不可不深明此理也。此一章承前章陰陽寒熱

標本之旨，深一層立論。

上章言其所居此章言其所發皆探其病情詳情云陰陽屬

之前三章彼為從外以審內法此則從內以審外法

以立方先以太陽言。太陽中風，風為陽邪而中陽寸浮而陰尺弱。陽浮者風勢迅發不熱

自發陰弱者津液滿流不汗自出。而審審欲聞之惡寒，漸漸欲聞之惡風，翁翁欲聞之狀而

發熱。陽邪上鼻鳴，陽邪上乾嘔者，中風脈證。桂枝湯主之。此一節言中風太陽之肌腠

立方以救治也。桂枝湯方。桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大枣十二枚右

五味以咀，以水七升，微火煮取三升，去滓。適寒溫服一升。服已須臾，歎熱稀粥一升餘

以助藥力，溫覆令一時許，遍身絳熱微似有汗者，益佳。不可令如水流漓，病必不除。若

一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，後服小促，復其間，半日

許，令二服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不

出者，乃服至二三劑，禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物。

桂枝湯調陰陽和營衛為太陽中風之主方。醫者必於頭痛發熱等公同證。汗出一

而異功用不止此也。凡中風傷寒雜病皆係太陽為病，必於頭痛發熱等公同證。汗出一

為大主腦汗出則惡風者，桂枝湯主之。審其汗出所用之無有不當矣。此一節承上

毛竅空虛亦因而惡風者，桂枝湯之用。

節而推廣桂枝湯之用。雖然病在太陽之肌腠，桂枝湯誠為切當。若太陽經輸之病，專用桂枝湯。太陽病項背不

原方恐未能懸錄入扣內，經云邪入於輸，腰脊乃強，蓋太陽之經脈在背。太陽病項背不

而強如短羽之鳥欲飛凡凡是邪入太陽之經輸也夫邪之中人始於皮毛次及肌反汗出而惡風視桂枝證非得芎藭入土最深其蘇延蔓似絡須桂枝直入桂枝加葛根湯

至之此一節言太陽經輸之證亦承上節推廣桂枝湯之用而不泥其方桂枝加葛

根湯方桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑切三兩 大棗枚十二 葛根四兩右六味以

水七升內諸藥者取三升去滓溫服一升不須啜粥餘如桂枝將息及禁忌法

桂枝湯為肌腠之主方邪在肌腠既可於汗太陽病下之後則太陽之氣當從肌腠

出等正而秀出亦可與誤治後反面動出太陽病下之後則太陽之氣當從肌腠

氣竟上衝者足不固下而內陷可與桂枝湯方用前啜粥溫法從肌腠外若不上衝者

肌腠之間桂枝不可與之此一節承上節以起下文五節之意張令韶曰經云太陽

根於至陰是太陽之氣由至陰而上於胸膈由胸膈而出於肌腠由肌腠而達於皮毛

外行於三陽內行於三陰氣從此而出入邪亦從此而出入師所謂其氣者指此而言

也請者知正氣之出入如此則邪氣之出入亦如此則於此道知過半矣所以傷寒言

邪即言正而言正即可以識邪按詩熱此註方知益中經氣傳行及

然而不可與者又不止此太陽病三日已為盡發汗則肌表之若吐則中膈之邪當解若溫餓

當解當解而仍不解者此為誤治壞病肌腠故桂枝湯不中與也觀其脈證知犯何逆

或隨吐下溫鍼之逆或隨其證此一節承上節言病不問於肌腠者桂枝湯用之而不當

且更有不可與者桂枝湯本為解肌火及肌腠惟風性迅速從膚表而入肌腠則肌腠

汗而膚表虛所以脈浮緩若其人脈浮緊發熱汗不出者明不在肌表不可與也桂枝湯

為不汗出當須識此勿令誤也此一節承上節分別桂枝本為解肌大殊發表之劑重為叮嚀

桂枝本為解肌以汗自出若酒客病濕熱發於內其無病時熱氣重則多汗出及其病不在肌表之內故不可與桂枝

湯與之得此湯甘能壅滯則為嘔蓋以酒客喜苦不喜甘故也推之不必酒客凡素患熱

此一節承上節桂枝本為解肌向言濕熱之自汗不為肌表之病又當分別

桂枝本為解肌若嘔則為邪拒於表表氣不通而作宜麻黃而不宜桂枝喘家高難愈而作宜桂枝湯

不可桂枝湯宜加厚樸故時而杏子利其氣佳此一節承上節桂枝本為解肌向言喘

不盡由於肌表之病不可專用桂枝湯

得湯則嘔但嘔而且吐者熱而欲利神反能逆起熱勢所逼故傷陽請中其義凡當服桂枝湯

其後必吐膿血也此一節申明前二節得湯則嘔之義序例謂桂枝下咽陽盛則斃者此也

太陽病因當汗之若不發汗過遂滿不止前云如水波滿其人惡風然不去汗流於小

便難四肢陽氣以養之故微急且難以屈伸者此因大汗以亡陽因桂枝加附子湯主

之以方中取附子以固少陰之陽固陽即所以救液其理微矣

居桂枝湯之泛應不窮也張令詔云自此以下八節論太陽之氣可出入可內可

外外行於陽內行於陰出而皮膚入而肌腠經絡無非太陽之所操縱也

桂枝加附子湯方 即桂枝湯原方加附子一枚炮

不但誤汗而陽亡於外故若誤下亦致太陽病誤下之後陽衰不能出入於外內以脈數中其名促氣滿胸而滿者桂枝去芍藥主之益桂枝湯為太陽神方調和其氣使出入於若脈不見微後惡寒者為陽虛桂枝去芍藥方中加附子湯主之助益桂枝之力微必上節促而見微後惡寒者為陽虛桂枝去芍藥方中加附子湯主之助益桂枝之力微必上節

言誤汗而陽亡於外此節誤下而陽衰於內其方只一二味出入主治判然按陽亡於外宜引其陽以內入芍藥在所必用陽衰於內宜振其陽以自立芍藥則大非所宜也即

桂枝湯原方去芍藥桂枝去芍藥加附子湯方即桂枝去芍藥加附子一枚炮

太陽頭痛項強發病得之八日已九日正當少陽主氣之期如瘧狀亦見寒熱發熱惡寒

現出太陽本證與真者不同所幸者寒熱並見之中熱於多而寒却少太陽以陽為主熱多是其人不嘔邪不轉

便欲自可明其寒熱屬陽一日二三度發不以建之有定候太陽得少陽脈微者為競者為

後為欲愈之證也設脈但見微而不見其變是邪衰而不能自容之象脈微者為競者為

皆今脈微即露少陰脈沉細之機此虛而少陰太陽俱虛不可更發汗更下更吐也

惡寒即伏少陰脈逆及背寒之兆此虛而少陰太陽俱虛不可更發汗更下更吐也

證脈如此宜其面色無熱色矣而面色反有熱色者以諸陽之氣在於面而陰氣未收尚能未幾欲

自作小解也其不能得小汗出於肌表又察其肌表之氣未和而知用身必癢邪欲出

出宜桂枝麻黃各半湯之助此一節言病在太陽值少陽主氣之期而藉其樞轉也

桂枝麻黃各半湯方桂枝一兩十六芍藥生薑切甘草炙麻黃各一兩大棗四枚杏

仁二十四箇湯浸去右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八

合去澤溫服六合

太陽病審其為桂枝證用桂枝湯初服桂枝湯升反煩不解者緣此湯只能治肌腠之病

而適其年先刺風池風府中之熱却與留而未桂枝湯法服之則愈此一節言太陽之

病涉於肌腠而復干於經脈也風池二穴在頭上三行顛額後髮際陷中足少陽之經

穴鍼入三分留三呼風府一穴上髮際一寸大筋內宛宛中督脈之經穴鍼入四分留

三呼二者皆太陽經所過之處故刺之以瀉太陽之邪

邪之在表與在肌其治不可或混而病之在表服桂枝湯取微似有汗大汗流滿出病

不除脈勢必於浮洪大者察其桂枝證與桂枝湯如前似汗之法是法也可以發汗汗

汗精勝而邪却也凡傳寒熱往來其形如瘧此則作輕與常日再發而別者不屬肌

表病汗出必解宜桂枝二麻黃一湯此服桂枝後少此一節言太陽之氣在肌而復通

於表也桂枝二麻黃一湯方桂枝一斤芍藥一斤麻黃十六銖生薑一斤桂枝去皮芍藥去皮生薑切

杏仁十六箇甘草一斤大棗五枚右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內

諸藥煮取二升去澤溫服一升日再服

太陽之氣由肌服桂枝湯當取微似有汗者大汗出後陽明之津液俱亡大煩陽明之上

大渴不解陽氣亢脈洪大無者白虎加人參湯主之此一節言太陽之氣由肌腠而通

於陽明也白虎為西方金神秋金得令而炎氣自除加人參者以大汗之後必救其液以

滋其燥也。白虎加人參湯方。知母六兩。石膏一兩。甘草二兩。粳米六合。人參二兩。

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

太陽之氣外行於陽。內行於陰。不能外達者。將何以辨之。辨之與證。與脈之相反。太陽為病。其證發熱。

而且。有陷入於陰。不能外達者。將何以辨之。辨之與證。與脈之相反。太陽為病。其證發熱。

惡寒。太陽以陽熱多。寒少。為主。辨客氣。是辨之。辨之與證。與脈之相反。太陽為病。其證發熱。

太陽。負而。則曰不得。此。而脈。則無陽也。陽主裏。不可發其汗。從脈。不從證。宜桂枝二越婢一湯方。以發越之。此一節言太陽之氣陷於脾。而脾氣不能外達者。不發其表汗。宜越其

脾氣也。桂枝二越婢一湯方。桂枝。去。芍藥。甘草。各十。生薑。一。兩。麻黃。二。兩。石膏。二。兩。杏仁。四十。枚。水。一。斗。煮。取。五。升。分。三。服。無。汗。者。加。麻。黃。半。兩。有。汗。者。去。麻。黃。加。芍。藥。半。兩。白。朮。半。兩。白。薇。半。兩。以。水。一。斗。煮。取。五。升。分。三。服。

黃。十八。兩。石。膏。二。兩。碎。綿。裹。右。七。味。以。水。一。斗。煮。取。五。升。分。三。服。無。汗。者。加。麻。黃。半。兩。有。汗。者。去。麻。黃。加。芍。藥。半。兩。白。朮。半。兩。白。薇。半。兩。以。水。一。斗。煮。取。五。升。分。三。服。

取二升。去滓。溫服一升。本方當裁為越婢湯。桂枝湯。合飲一升。今合為一方。桂枝二越

婢一。按。方。下。所。註。知。仲。景。所。用。皆。古。方。真。迷。而。不。作。之。聖。也。

不獨陷於脾。而不能外達。而且。有。服。桂。枝。湯。服。後。未。愈。醫。者。不。審。或。疑。桂。枝。湯。之。下。之。仍

臨。表。證。不。能。轉。輸。者。太。陽。病。服。桂。枝。湯。服。後。未。愈。醫。者。不。審。或。疑。桂。枝。湯。之。下。之。仍

解。而。為。頭。項。強。痛。翁。翁。發。熱。無。汗。且。又。兼。見。心。下。滿。微。痛。小。便。不。利。者。然。無。汗。則。表。邪

三。焦。不。行。決。瀆。而。下。出。內。經。云。三。焦。膀。胱。者。脾。理。毛。其。應。是。言。通。體。之。太。陽。也。此。時。所。出

妙。用。而。發。汗。亦。在。其。中。以。桂。枝。去。桂。加。茯苓。白。朮。湯。主。之。所。以。加。茯苓。白。朮。者。助。脾。之。轉

則。諸。病。有。然。矣。此。一。節。言。陷。脾。不。轉。輸。之。治。法。也。桂。枝。去。桂。加。茯苓。白。朮。湯。方。芍。藥。三。兩。甘草。二。兩。生。薑。六。兩。茯苓。白。朮。各。三。兩。大。棗。十二。枚。右。六。味。以。水。一。斗。煮。取。五。升。分。三。服。

易。經。命。義。主。一。大。陽。篇。二。五

升去滓溫服一升小便利則愈

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掣急

此與桂枝證初似但脚掣急不似此證

同處得其所獨今據此字急一證便知太陽之證

風瀾微則胃之熱新成與汗自小便數皆係熱證即有微惡寒一證亦可如表之惡

寒瀾微則胃之熱新成與汗自小便數皆係熱證即有微惡寒一證亦可如表之惡

充龍有悔陽之便見厥證水而咽中乾水火燥躁火逆吐逆者乾薑炮黑以苦寒之劑不受惟以

之德用甘草以甘草乾薑湯與之以從治復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與

之德用甘草以其脚即伸若胃氣不和謬語者謂於此辛熱之毒少與調胃承氣湯

逆湯主之均係亡陽而此一節言太陽標熱合少陰本熱之為病誤治而變證不一也

甘草乾薑湯方 甘草四兩 乾薑二兩 右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫

再服 芍藥甘草湯方 芍藥四兩 甘草四兩 右二味咬咀以水三升煮取一升半

去渣分溫再服之 調胃承氣湯方 大黃四兩 去滓 甘草二兩 芒硝半升 右三味

咬咀以水三升煮取一升去滓納芒硝更上火微煮令沸少少溫服之 曰逆湯方

甘草二兩 乾薑半兩 附子一枚生用去 右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓

分溫再服 強人可大附子一枚乾薑三兩 問曰證象陽旦按桂枝湯加附子增法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語歸曰

和字言夜半陰陽手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰兩手六寸口其脈下指

為浮而脈形寬大浮則為風和也為陽大則為虛陰虛於內不能風則陽故生微熱虛則

陰液不兩脛掣病證象桂枝因桂枝加附子故其間增桂枝二兩名陽令汗出以附

子溫經亡陽故也益附子為溫經之藥陰寒用事得之則溫經以亡陽如桂枝加附子湯

其微逆咽中乾陽明內結語語煩亂知其因服乎熱更治法飲甘草乾薑湯引外越之夜

牛天人之陽生陽氣亦還兩足當溫陰陽相接而厥回但脛尚微拘急重與芍藥甘草湯甘

陰生其弱乃脛伸其弱語未止者誤服湯且渴之熱視桂枝湯為治別以桂陽明內結以大

承氣湯便微瀉燥屎亦下則止其謬語故病可愈此一節設為問答承上節而明誤藥之

變證更進一層立論

肌腠實則膚表虛而自汗入於經輸既有桂枝加葛太陽病項背強几几前已詳其無汗

根湯之法而膚表實而無汗入於經輸者治法何如說矣其無汗

為邪拒於表惡風者現出太陽葛根湯主之此一節言邪從膚表而涉於經輸與邪在

表氣守也其惡風者之本原也

肌腠而涉於經輸之不同另立葛根湯取微似汗法張令詔云自此以下四節俱論太

陽之氣循經而入不在肌腠之中也葛根湯方葛根四兩麻黃三兩桂枝去皮

二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚上七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去

沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

太陽之惡寒發熱頭與陽明之熱渴日晡身重等證同時合病者兩經之熱邪並出不得

太陽之惡寒發熱頭與陽明之熱渴日晡身重等證同時合病者兩經之熱邪並出不得

其所通必自下利然難下利而邪猶在表未可奪之於裏既非誤下邪陷之裏虛葛根湯而不守其下利斷不可以偏於下利之法治之仍當以兩經之表證為急故以葛根湯主之 此一節言太陽合於陽明而為下利證也

太陽與陽明合病其機則全在不下利而但作嘔者當求其說蓋太陽主開陽明主闔今上下利則開於葛根加半夏湯主之蓋以半夏除結氣以達其此一節承上節而言太陽合於陽明不下利而但嘔也二節言太陽與陽明合病重在太陽之間一遠與下章合

病用麻黃法不同小註宜細玩而熟記之 葛根加半夏湯方即葛根湯原方加半夏半升洗

太陽病頭痛項強有汗桂枝證病在腎反下之由臥而內陷利遂不止然邪雖內陷而氣仍時見一止而無脈促者表邪未罷也能速出則喘毛閉而汗出者七桂枝證中

可再用桂枝湯而以葛根黃芩黃連湯主之 此一節言太陽證雖已陷邪亦可以乘機而施升發使內者外之陷者舉之之妙也 張令詒云下後發喘汗出乃天氣不降地

氣不升之危證宜用人參四逆輩仲師用此方專在表未解向雖然仲師之書豈可以形逆求之耶總以見太陽之氣出入於外內由外而入者亦可由內而出此立證立方之意也 葛根黃芩黃連湯方 葛根半斤甘草二兩黃芩三兩黃連三兩右四味以

水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽在肌之病當之詳 太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

太陽病頭痛發熱困不得身疼病在太陽之氣也經云太陽腰痛者

發於而鳴者不可用解肌之桂麻黃湯主之。此一節言太陽病在膚表之治法也。張

令詔云自此以下三節俱論太陽之氣在表為麻黃湯證也。柯韻伯曰麻黃八證頭痛

發熱惡風同桂枝證無汗身疼同大青龍證本證重在發熱身疼無汗而喘又曰本條不

冠傷寒又不言惡寒而言惡風先輩言麻黃湯立治傷寒不治中風似非確論蓋麻黃

湯大青龍湯治中風之重劑桂枝湯葛根湯治中風之輕劑傷寒可通用之非主治傷

寒之劑也。麻黃湯方。麻黃三兩桂枝三兩甘草一兩杏仁七十箇右四味以水

九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須

啜粥餘如桂枝法將息。

前以葛根治太陽與陽明合病重在太陽之間一違也然二陽合病太陽之氣從胸而出

其陽明主關之勢過於太陽則為內而不外之理不可不知何則太陽之氣從胸而出

胸與陽明合病二陽之氣不能外達於皮膚而又有胸滿之者切不可下以致內陷者

若麻黃湯汗以主之此一節言太陽與陽明合病之用麻黃法也重在陽明主關一違

與上章用葛根法分別。

太陽病頭項強痛等症十日已去陰主氣之期其少脈浮為太陽之氣從胸而出不得少陰之氣

兩相和合外已解也投令胸滿脇痛者少陰為陰根少陽為陽根惟小柴胡湯能轉其氣

故知其外已解也設令胸滿脇痛者少陰為陰根少陽為陽根惟小柴胡湯能轉其氣

益與以小柴胡湯藥證若對脈但浮而不者能外出非關根也與麻黃湯以達此言太

少陰陽之氣表裏相通而太陽又得少陰之根以為出入也張令詔云此以上三節

