

類編朱氏集驗醫方

五

新編朱氏家範

三

類編朱氏集驗醫方卷之十一

○小兒

辨小兒虛實

面紅如桃花色大黃稠小便清徹手足和暖乃表裏俱實其子易養也不宜服藥振唇口亦不可服鎮心涼藥恐傷動脾胃嘔妳糞青而生驚掣

面紅色乃爲童顏外實也大黃黃稠膩內實也不宜服藥也

不宜服涼藥有七

足脛冷 腹虛脹 糞青色 面脫白
嘔妳乳 眼珠青 脉微沉

不宜服熱藥有七

足脛熱 兩腮紅 大便秘 小便黃

渴不止 上氣急 脉緊急

小兒驚風二證方書中未嘗分析詳細蓋驚自驚風自風當分別而治療之世傳通言熱極生風殊不知寒暑燥濕之極亦能生風見兒作搐不察形氣虛實使用牛黃朱砂腦射之劑以致不救者多矣蓋真氣者元陽也其藥性溫則固養元陽冷則敗傷真氣故宜用溫中下氣藥治之

以上並宿州陳氏方論

形色歌曰

火色紅傷寒

青驚白色疳

黑時因中惡

黃即困脾端

驚

辰砂丸治咳嗽安驚化痰

辰砂

研一半入藥

白礬

枯

白附子

炮各

南星

壹兩去皮臍切作片再用雪水煮焙乾

大半夏

壹兩半湯七次生薑自然汁作餅炙

右細末糯米粉煮糊爲丸如小菴豆大每服二十九丸
茶薄荷湯下余長雛感患三年服之而愈

蜈蚣丸治驚風

白附子

天南星

赤脚蜈蚣

防風

半夏

右剉碎諸藥刷地一小竅用炭火煨煉約半日一日尤
好地脉透熟入黃子醋在竅八分滿隨傾諸藥入醋煮
之用瓷盆一隻快捷蓋住以泥封四圍至次日相對方

取出焙乾碾爲末用獐猪心血研爛同蜜煉熟爲丸不拘九子大小用薄荷湯下仍量小兒大小投藥余年七歲感患得此方而愈神効巨言

龍齒散治小兒驚悸夜啼

龍齒

茯苓

白附子

炮

蟬退

甘草

右等分細末每一小錢薄荷湯下臨卧服尤佳

防風導赤散治小兒初驚

生乾地黃

川木通

防風

甘草各等分

右生用咬咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎

寧神膏後用此藥

茯神

朱砂各壹兩

麥門冬

去

麝香

壹分

右碾細煉蜜爲小餅子每服一餅臨睡同薄荷湯化服

一夜一服（二方）何統制智大云昨在江州日兒子偶有驚作遂訪一老醫求藥劑服三服隨即全愈遂師問之渠云三代小兒科家傳只有四五藥加減愈人無數且如驚搐多是熱證若首先使用驚風藥（白附子）（全蝎）（姜）（蚕）（川烏）之類便成壞證家中驚藥只用（導赤散）（加北防風）（進一）（二服）導去心經邪熱其搐隨手便止次服（寧神膏）是家傳此本自後常以二藥救人取效甚多

（羌活膏）祛小兒驚風定驚

羌活

防風

川芎

茯神

各去木
各貳錢

茯苓

白朮

白附子

炮

薑蚕

姜汁炒
各壹錢

全蝎

半錢

右爲末煉蜜爲丸每服紫豆大麥門冬薄荷湯化下

（羌活丸）治風熱化痰安驚

羌活

荊芥穗

甘草

桔梗各半兩

白朮

白附子炮

川芎

防風

茯苓

各貳錢

朱砂

各貳錢壹半入藥一半爲衣

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大每服一九至两丸薄荷湯化如涎盛加臈茶湯下此方最穩

（防風天麻散）治驚風頭疼

防風

天麻

川芎

白芷

甘草

川烏

壹箇炮

麻黃去節

右等分細末葱蜜湯下薄荷湯亦可如驚搐加（全蝎）壹箇（烏蛇肉尾）（白附子）（麝香）各少許（羌活）煎湯下無不効者傷風加（零陵香）（羌活）

疳

六神丸治小兒諸疳極妙

木香

濕紙裹炮

黃連

去鬚

神曲

炒

川練子肉

蕪荑

麥蘖

炒

右等分爲細末獐猪膽蒸熟爲丸如麻豆大每服三四十九看兒大小加減不飢不飽服

蘆薈圓治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土寒熱往來目溢口臭齒斷爛黑常服長肌肉退黃殺蟲進乳食

新增

乾蝦蟇

去腸肚

大皂角

各壹兩三件燒灰存性爲末

青黛

二錢半

蘆薈

射香

朱砂

各壹分

右合研勻用湯浸蒸餅爲元如麻子大每三歲兒叁拾圓溫米飲湯下不拘時以兒大小加減

治疳勞四肢小腹大者

毛髮落面黃小便似泔大便爛思飲食者是

（新增）

雄猪肉

五斤重

使好石灰

糝一日洗去石灰置在新

傳上使物盖一夜用糟燠契效後服利水飲

治五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮焦黃不思乳食糞中有蟲米穀不化小便如油睡中盜汗（新增）

蘆薈

二錢

史君子

柒箇

木通

炮壹錢

檳榔

錢壹

黃連

去鬚炒貳錢

蕪荑

炒去膜

雷丸

剉炒壹錢

青皮

炒壹錢

龍腦草

錢壹

右件爲末雄猪膽汁蒸過爲元粟米大每叁拾圓飯飲

送下

〔六妙丸〕治疳積

保童丸

蘆薈丸

化蟲丸

肥兒丸

六神丸

蚶蚞丸

右各一貼合和為丸隨兒大小加減服湘中翁仁壽方

〔鮓湯圓〕

〔新增〕

南星

乳香

滑石

白丁香

青黛

壹錢

輕粉

貳錢

金銀箔

五斤

巴豆

去油六粒

錫末

先將水銀安紙上溶入手那碎

右為末糊圓如粟米大每叁拾圓薄荷湯下疳積鮓湯下脹滿茴香湯下赤白痢甘草湯下瘡疾桃柳枝湯下

〔三聖圓〕治疳

〔新增〕

黃連

三錢

史君子

二錢

木香

半錢

右爲末糊圓米飲空心下

〔龍膽丸〕治小兒疳病發熱

〔新增〕

龍膽草

去蘆

黃連

炒去鬚

青皮

去白

史君子

炒去皮

右等分爲末猪膽汁和爲丸如小豆大每服二十九以意加減臨卧服熟水下

〔肉棗丸〕治小兒因疳而瘡侵口鼻

肉棗兩枚去核入〔青礬〕如核大在內以火煨存性爲末入麝少許油調塗親用有效

〔黃連散〕治小兒頭上瘡瘡

羯羊膽一枚用盞子擘開傾膽汁在盞內看汁多少入好麻油如膽汁許以乾竹煎令香熟入鷹爪黃連細末調令得所傳瘡上曾用有效

積

丁香丸治積熱傷寒

烏梅

壹箇切片用土瓦焙乾

丁香

叁箇

縮砂仁

肆箇去殼

巴豆

兩箇去殼用蘇子葉包打碎去巴油入鉢內研爛

右除巴外爲細末入巴豆研勻却用研細百草霜和勻麪糊爲丸如小菡豆大一歲一九米飲下積塊不妨常服有功

六味三稜丸曠明仲云五六箇月小孩兒未喫穀食有癖

積者保安丸太重尺服此六味爲佳

莪朮

煨剉

三稜

煨

神麪

炒

麥蘖

炒

青皮

陳皮

右等分爲細末水煮清糊爲丸熟水下

(丁皮散)治小兒脾積疼痛有效

丁皮

白朮

茯苓

青皮

陳皮

良薑

縮砂

神曲

麥蘖

甘草

真桂心

右各等分爲末燒鹽湯點服

(褐圓子)治傷食膨脹

新增

羅白子炒

莪朮炮各

胡椒

半兩

右末糊圓菽豆大每拾伍圓不拘時煎蘿蔔子湯下

(五積圓)治疳勞諸積

新增

南星

去風積

川乙金

去熱

巴豆

食積

肉桂

去皮

姜蚕

去驚積

史君子

爲末

右麵圓粟米大

湯空 心煎

熱

解肌湯

麻黃

去節
半兩

人參

川芎

北芍藥

獨活

各半兩
前胡壹分

右咬咀每一錢水半盞薑一片薄荷一葉煎三分去滓
三歲以下二歲以上一服作二服

人參羌活散

川獨活

羌活

柴胡

川芎

白茯苓

人參

甘草

各壹兩

前胡

地骨皮

桔梗

天麻

酒浸炒
各半斤

枳殼

壹兩
麩炒

右咬咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉棗半枚煎

三分瘡疹未發之先亦可服二方極穩

羌活散散風邪止驚搐退熱解肌

羌活

粉草

天麻生

茯苓

川芎

各貳錢

荊芥穗

白薑蚕炒

白朮

白附子

炮各壹錢

桔梗

貳錢半

防風

壹錢半

全蝎

半錢去刺炒

朱砂

半錢

天南星

壹字熟炮

右爲細末薄荷湯下如傷風鼻塞流清涕葱白煎湯下

或嗽氣促桑白皮煎湯下常服白湯亦可

和解散

治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸

自汗肢節疼痛及豆瘡已發未發皆可服

羌活

防風

川芎

人參

乾葛

升麻

甘草

右咬咀每服三歲小兒一錢水三分盞生薑半片棗子半箇同煎二分去滓服不拘時候

小麥煎湯治小兒夾食夾驚傷寒正受傷寒咳嗽夜熱晝涼傷風瘡疹之疾大効劉道方

麻黃

半兩去節湯泡

白朮

炮

乾葛

叁錢半

白茯苓

甘草

各貳錢半

右咬咀入麥子二十一粒同煎一方用葱白二寸煎服

天麻散治小兒傷風鼻塞涕鼻塞咳嗽身熱並皆治之

天麻

防風

甘草

川芎

羌活

白芷

麻黃

去節

右等分爲細末葱湯食後服

木香散能和表裏通行津液