

黃帝內經素問註證發微卷四

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蔣仲化註證

通評虛實論第二十八

評論也。內論病有虛實之義故名篇。

黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。此先明虛實二字之義也。言人非無故而實，以邪氣盛則實耳。邪氣盛者，外感也，非無故而虛，以正氣奪則虛耳。正氣虛者，內傷也。

帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者，肺虛也；氣逆者，足寒也，非其時則生，當其時則死，餘藏皆如此。

此舉肺虛一藏，其生死必隨乎時，而可以例諸藏也。肺

主氣氣虛者肺虛也。氣逆者氣上行而逆則在下之足
以無氣而寒。故此肺虛而非相尅之時則生。如春秋
是也。如遇相尅之時則死。如夏時之火是也。餘藏虛者
其生死亦如此而已。夫帝問虛實而伯先以虛爲對。未
及於實也。

帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脉滿
是謂重實。重平聲
後同

此言病有重實之義也。大熱爲病，邪氣甚熱。以後文寒
氣暴上脉
滿而實，照之則此氣熱者。其脉甚滿，是實而又實，謂之
邪氣熱也。非人之中氣也。

重實也。

帝曰：經絡俱實，何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰：滑則從，澹則逆也。夫虛實者，皆從其物類始。故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也。秋冬爲逆，春夏爲從。治主病者。帝曰：經虛絡滿，何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿，脈口寒澹也。此春夏死，秋冬生也。帝曰：治此者，柰何？曰：絡滿經虛，灸陰刺陽。經滿絡虛，刺陰灸陽。

此節卽經絡俱實，絡虛經實，經虛絡實者，而擬其脈體決其死生，分其治法也。經者，十二經也。絡者，十五絡也。

虛者卽前精氣奪則虛也實者卽前邪氣盛則實也經
爲陽絡爲陰故經中亦有屬陰者而以絡並之則經皆
爲陽絡中亦有屬陽者而以經並之則絡皆爲陰寸部
爲陽尺部爲陰急脈爲陽緩脈爲陰滑脈爲陽濇脈爲
陰脈熱爲陽脈寒爲陰今寸部急而見陽是經實也尺
脈緩而見陰是絡亦實也所謂經絡俱實也必其急緩
之脈帶滑則爲順而生帶濇則爲逆而死何也大凡物
類皆有虛實必滑澤則生枯濇則死非特脈爲然也故
五藏骨肉滑利所以其脈亦滑可以長久而生也若五
藏濇滯則其脈亦濇必不能長久而死矣何以異於物

類也哉。其有絡氣不足，經氣有餘，是絡虛經滿也。惟經氣有餘，故脉口熱。唯絡氣不足，故尺部寒。春夏屬陽，合經與寸；秋冬屬陰，合絡與尺。惟脉口熱而尺部寒，故時逢秋冬，則陰氣盛而脉口不宜熱，熱爲逆而死。時逢春夏，則陽氣高而脉口宜熱，尺中宜脉皆爲順而生。卽主病者而治之，何經有餘則寫之，何絡不易則補之。其有經氣不足，絡氣有餘者，卽經虛絡滿也。滿者實也。唯絡脉滿，故尺部亦熱滿。惟經脉虛，故脉口亦寒。濇春夏應經與寸，所以寒濇則死。秋冬應絡與尺，所以熱滿而生。不言治主病者，卽上文可以例推也。治主病者何如絡

為陰今滿則灸之虛則刺之經為陽今滿則灸之虛則

刺之由此觀之則大抵灸主於寫而刺則可補也

帝曰何謂重虛岐伯曰脉氣上虛尺虛是謂重虛帝曰何

以治之岐伯曰虛謂氣虛者言無常也尺虛者行步惛然

脉虛者不象陰也如此者滑則生濇則死也

按甲乙經作脉虛脉之下

缺一虛字氣虛氣之下多一上字尺虛三者並虛為當故

下文以氣虛尺虛脉虛為答詳上文重實以氣熱脉滿為

重實此節脉虛氣虛尺虛為重虛者甚有理不但尺

寸俱虛為重虛也王氏似未當還以甲乙經為的

此言病有重虛之義也脉虛氣虛尺虛謂之重虛氣虛

者真氣不足也故脉動無常尺虛者腎氣不足也故行

步惛然脉虛者手太陰寸口所見之脉按之不應手也

如此三虛是謂重虛。若帶滑利則生，否則澹滯而死矣。
帝曰：寒氣暴上，脉滿而實，何如？岐伯曰：實而滑則生，實而
逆則死。

此言氣寒而脉實者，亦以滑爲生，而澹爲死也。帝言上
文氣熱，脉滿已謂重實，必滑則從，澹則逆。今者寒氣暴
上，脉亦盛滿，與氣熱脉滿者異。其於滑澹逆從，生死何
如？伯言不問寒熱，止論滑澹，雖因寒而實，必其脉滑而
爲順則生，脉澹而爲逆則死也。

帝曰：脉實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則
死。



此卽脉證雜見陰陽者而以時決其死生也。脉實滿者是陽脉也。頭熱者是陽證也。皆邪氣有餘也。手足又寒是陰證也。乃真氣又虛也。若此者真邪不分陰陽相雜。然春秋者陰陽未盛之時也。正平和之候故生。冬夏者偏陰偏陽之時也。脉盛頭熱者不能支於夏。手足寒者不能支於冬。故死。

脉浮而濇。濇而身有熱者死。

此言證與脉反者死也。脉浮而濇乃肺脉之應於秋者也。而身有熱則火盛金衰主死。此前後無問答之語疑爲錯簡也歟。

帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脉急大堅尺瀦而不應也如是者從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

有口字

此言陽病者當得陽脉陽證也身形盡滿乃陽病也氣口之脉急大而堅是陽脉也宜尺部則瀦而不相應耳然必手足溫者是陽證也故有是脉有是證則爲從而生否則脉雖急大堅而手足反寒是謂逆而死也

帝曰乳子而病熱脉懸小者何如岐伯曰手足溫則生寒則死帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脉何如岐伯曰喘鳴

肩息者脉實大也緩則生急則死

此言乳子脉與病反者復有他證可驗病證俱甚者復有脉體可據而決其死生也乳子而病熱陽證也而脉則懸小是陽證見陰脉也然手足溫和正氣猶存脉雖懸小特未大耳故可以得生否則手足寒而死矣又乳子中風發熱喘鳴肩息者陽證也脉當實大惟實大中而緩則邪氣漸退可以得生若實大中而急則邪氣愈增其病當死矣

帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脉沉則生脉浮則死帝曰腸澼下濃

血何如岐伯曰脉懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身
不熱脉不懸絕何如岐伯曰滑大者生懸澼者曰死以
藏期之

此言腸澼之屬有便血者有下白沫者有下膿血者隨

證隨脉而可以決其死生也腸澼者大小腸有所辟積

而生諸證故腸澼爲總名而下三者爲諸證也生氣通天論曰

因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔所以亦用便血者大便
腸澼二字太陰陽明篇亦云久爲腸澼

中下純血也有等俗名腸風下血有糞前來者爲近血是腎肝有火糞後來者爲遠血是心肺有

火今茲腸澼便是血爲陰而下血爲陰證若身熱則火
血用下血皆是是血爲陰而下血爲陰證若身熱則火

盛故主死身寒則火衰故主生其下白沫者非膿非血

而白沫下行。是肺氣受傷也。然亦陰證之類。故脉沉則

生。以陰證宜見陰脉也。若脉浮則死。以陰證見陽脉也。

其下膿血者。赤白相兼。氣血俱傷。

靈樞邪氣藏病形篇謂之痼泄難經謂

之大痼世後世曰痼。然脉以懸絕為死。正氣不足也。滑大則生。王

氣有餘也。帝問凡腸澼之屬。有身不熱則證不死。脉不

懸絕則脉不死。伯言終當以元氣為主。故脉必滑大則

生。若懸澼則死。其死者以藏期之。所謂肝見庚辛死。心

見壬癸死。肺見丙丁死。腎見戊己死。脾見甲乙死者。是

也。

按脉訣云。下痢微小却為生。脉大浮洪無瘥日。今屢治此疾。亦有滑大而生。沉小而死者。其澼之謂邪

當以經言為的也

帝曰癰疾何如岐伯曰脈搏大滑久自己脈小堅急死不

治帝曰癰疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死

此言癰疾之脈得陽脈虛脈而生也癰疾者陽證也故

搏大滑則陽證得陽脈所以病久自己若脈小堅急則

得陰脈故死不治然癰疾之脈當有取于虛也必搏大

滑中帶虛可治若帶實則邪氣有餘乃死候也脈訣云恍惚之

病定癰狂其脈實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未

聞人救得正與此大義相合又按長刺節論第十一節

則刺狂癰有法又以靈樞癰狂篇考之則義無餘蘊矣

帝曰消痺虛實何如岐伯曰脈實大病久可治脈懸小堅

病久不可治

此言消癰之病得陽脉而生也消癰者熱證也故脉實

大雖病久亦可治若懸小堅又至於病久則益不可治

矣脉要精微論云癰成爲消中靈樞五變論消癰可參看

帝曰形度骨度脉度筋度何以知其度也方盛衰論云診有十度脉度藏

度肉度筋度俞度又按靈樞有骨度脉度篇名而又有經筋篇名至於形度則無之今帝以爲問而下文無答語乃他篇之錯簡也

帝曰春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六府冬則閉塞閉

塞者用藥而少鍼石也所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰

疽不得頃時回亟音棘塞入声

此言三時治病各有所宜而冬時則用藥而不用鍼也

春時治病治其各經之絡穴夏則治其各經之俞穴秋則治其六府冬則閉塞但用藥而不用鍼石所謂冬時少用鍼石者非謂冬時癰疽亦不用鍼石也彼癰疽不得頃刻挽回若不用鍼石以寫之則內爛筋骨藏府豈得不用鍼石哉特謂他病則冬時不用鍼石耳

癰不知所按之不應手乍來乍已刺手太陰傍三疔與纓脉各二按癰大熱刺足少陽五刺而熱不止刺手心主三刺手太陰經絡者大骨之會各三暴癰筋纒隨分而痛魄汗不盡胞氣不足治在經俞

疔音賄按腋同纒軟同

此承上文而言治癰之法有此三等也凡癰疽痛無定

所故按之不應手亦無定時故乍來而乍已當刺手太

陰肺經之傍三痛蓋肺經之穴在胃中者曰雲門今曰

肺經之旁則是足陽明胃經氣戶等穴也刺瘡曰痛三

痛者三次也

刺三次則有刺瘡者三

其曰纓脉各二者亦以胃經

之穴如人迎水穴在結喉旁一寸五分則是結纓之所

故曰纓脉各二者左右各二也有等腋下生癰其體大

熱當刺足少陽膽經之穴五痛宜是膽經之淵液穴也

腋下三寸宛宛中舉臂得之鍼三分禁灸

若刺之而熱不止當刺手厥陰心

包絡經即手心主之穴三痛宜是天池穴也

腋下三寸乳後一寸

鍼二分灸二壯

又刺手太陰肺經之經穴經渠

寸口陷中鍼二分禁灸絡

穴列缺

去腕側上一寸半
鍼二分灸三壯

及大骨之會各三痛當是手

太陽小腸經之肩貞穴也

在曲胛下兩骨解間肩髃有
後陷中鍼三分灸三壯

等暴發為癰隨其分肉筋縷而痛在外之魄汗出之不

盡在內之胞氣則不足而小便不通當治受患本經之

俞穴如手太陰肺經列缺為俞之類也

按癰疽大義悉
具靈樞癰疽篇

八十

腹暴滿按之不下取手太陽經絡者胃之募也少陰俞去
脊椎三寸傍五用圓利鍼

此言治腹暴滿之法也凡腹中暴滿按之不下取手太

陽經之絡穴支正

在手腕後五寸
鍼三分灸三壯

胃之募曰中脘是也