



南京中医药大学图书馆版权所有

論張仲景傷寒論

漢張太守仲景著傷寒一書立一百一十三方三百九十七法隨病之變遷用之千變萬化靈妙無窮萬病皆當倣之爲法不可僅作傷寒書讀也乃後之註是書者五十餘家移前易後互相訾議迄無定論愚按是書當分兩大段看法其前一段爲表寒而作寒爲天地燥結之氣燥故化火也速寒氣從外收斂搏束氣機津液不行故停濕者多後一段爲裏寒而作裏寒或由外直中於內或虛則寒自內生總不外脾腎陽虛陽虛則不獨

不能禦寒而且脾陽虛則不能散精腎陽虛則不能行水不能散精行水故化濕者多化火者少其法雖分經亦不外三焦言六經者明邪所從入之門經行之所病之所由起所由傳也不外三焦者以有形之痰涎水飲渣滓爲邪所搏結病之所由成也觀其論中曰胸中曰心中曰心下曰胸脇下曰胃中曰腹中曰少腹雖未明言二焦較言三焦者更細也人身一小天地膈膜以上天氣主之肺與心也膈膜以下地氣主之脾胃二腸膀胱三焦腎也界乎天地之間者爲膈膜膈膜乃肝膽

部位如地之有樹木者。然行乎肌肉之裏筋骨之外。以
運行血脉者爲經絡。如地之有脈絡溝渠以通天氣者。
然從膈下而上。上至胸旁。至脇皆清氣與津液往來之。
所。其病不外痰涎水飲爲邪。所擊搏與氣相結。由胃中
脘及腹中下抵少腹。乃有渣滓穢濁之物。邪氣得以依
附。之而成下證。一爲清陽。一爲濁陰。人身所以爲一小
天地也。觀仲景先師所立方法。確就邪傷人身之天地
者治之。六經固不爽毫釐。三焦亦不踰分寸。千古醫聖
之稱。舍仲景其誰與歸。以太陽論。太陽經脈行背背者。

胸中之府。胸中爲肺之外廓。肺主皮毛。凡邪從太陽入者。必自毛竅始。且六經之氣。皆天氣所運行。未有經氣鬱而天氣不鬱者。故傷寒論云。太陽病頭痛發熱。身痛。腰痛。骨節痛。惡風無汗而喘。又曰。喘而胸滿劇者必衄。衄乃解。夫頭痛以下。皆太陽見證。喘而胸滿。乃邪阻肺氣不舒也。衄者。寒燥化熱。熱甚動血。由肺之清道出也。衄解與汗解同。故曰。衄乃解。經言太陽固明。明兼言肺矣。且邪由皮毛而肌肉。由肌肉而經脈。一層收近一層。是橫入邪由外橫入。藥由內橫托。故用輕虛之麻黃湯。

由肺化汗外達皮毛以出肺之空竅卽以出太陽之門。戶經云輕可去實又云薄則發洩厚則發熱。麻黃體性空虛氣味俱薄輕薄上浮空虛外達太陽藥卽肺藥也故用以爲君卽以爲使桂枝辛溫微潤主溫肌肉枝亦橫達故以爲臣杏仁質潤微辛微苦苦重於辛開而能降且仁含生意又能入心化汗炙甘草微潤而甘能緩藥性於上故以爲佐方雖四味神妙無窮奈後世舍而不用偏用羌獨荆薄辛燥濁烈之品不知厚則發熱服之徒增煩躁且麻黃主開是橫升羌獨等主升是豎力肺主天氣天氣宜開宜降而不宜升故羌獨等味自神農本經已有之但非爲治傷寒溫病設也仲景所以不一若發汗汗不出而煩燥者此邪鬱熱生內灼肺津也用大青龍湯辛涼潤以解之。麻黃湯加石膏薑桑麻已極湯名青龍者以龍爲主其有表邪未解搏束在裏之水族行津發汗之義也。

濕熱走於肌膚發黃者。麻黃連翹赤小豆生梓皮湯。辛涼燥以解之。其有發汗後。汗出而喘。或飲水多而喘。此表邪雖解未盡。肺中尙有留邪。與水邪相搏。故取麻杏甘膏湯。辛涼解表。表解則水邪自從汗而出。若停水之重者。發熱表不解。心下有水氣。乾嘔而歎。而喘。或渴。或不渴。或大便利。或小便不利。一派皆停水見證。主小青龍湯。麻桂開表。芍草護營。尤妙在細辛之辛潤行水。半夏之辛滑降逆。乾薑五味子並用。溫肺陽而固肺陰。無微不到。真神劑也。方下對證加減。亦毫釐不爽。微利者去麻黃。加蕘花。渴者去半夏。加瓜蔞根。小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓。喘者去麻黃。加杏仁。誤飲冷水。令汗大出。寒水相搏。其人噎者。去麻黃。加附

子。蓋汗爲水類。肺爲水源。汗不解則邪搏肺氣。不能通調水道。下輸膀胱。以致水停肺胃之間。若不開表而徒利水。無以解其搏束。若一味開表。而不用辛以行水。又無以祛其水邪。此方升中有降。開中有闔。眞如神龍變化。不測。後人何曾夢得論曰。病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈浮微。或脈乍緊。或手足厥冷。胸中痞。轆氣上衝。咽不得息者。此胸中有寒也。當吐之。藥後探吐宜瓜蒂散。夫所謂寒者。卽寒飲也。觀神農木草。瓜蒂亦小豆。吐下胸腹中水邪可知。更有汗吐下後。正氣不運。痰涎結氣。留

於心胸之間擾動。清陽虛煩不寐。劇者反復顛倒。心中懊憹。梔子豉湯吐之。藥後探吐。梔子輕虛上浮。微甚泄發。蘊蓄蓄之。若心中懊憹。饑不能食。但頭汗出。熱豆豉本蒸曬醞釀而成。故能宣發痰涎結氣。欲洩不得。或煩熱汗出。胸中窒者。胸滿而喘者。心中結痛者。則皆主以梔豉宣化。而不用探吐之法。以汗出故也。他如嘔者。梔豉生薑湯。誤下微煩者。梔子乾薑湯。潔熟發黃者。梔子柏皮湯。下後心煩腹滿。卧起不安者。梔子厚樸枳實湯。食復者。枳實梔豉湯。有宿食者。加大黃如博碁大一塊。此二湯治心中並治腹中。觀麻杏甘膏以下。

諸湯皆兼治胸心中水飲痰涎結氣者也。所謂六經不外三焦者如此。所謂寒燥搏濕者如此。而未已也。更有六七日發熱不解而煩渴欲飲水。水入則吐。名曰水逆。此表邪未解。裏又停水。其人無惡寒見證。與小青龍證有別。但發熱不解。又不可不兼治。主以五苓散。桂枝白朮茯苓猪苓澤瀉多飲暖水。汗出愈。蓋取方中桂枝化膀胱之氣。又能解肌。一藥而兩用之者也。他如發汗後水停胸中。不下煩渴。小便不利。或因誤下而痞口燥。煩渴。小便不利。或病本應汗而反以冷水浴之。致水氣結於皮膚肌。

肉之閒。肉上粟起。意欲飲水。意欲二字宜玩。是欲飲而又不飲之意。而反不渴。皆與五苓散導胸中水邪。從小便解。若陽明發熱渴。欲飲水。用猪苓湯。是不取五苓散中之桂枝解表化氣。而取猪苓湯中之阿膠滑石潤燥清熱矣。猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠若少陰下利。咳而嘔。心煩不得眠。停水見證用文蛤散引心下濕熱。從小便出。以文蛤燥濕清熱。又能滋陰。一舉而三善備焉。又有汗出不渴者。水邪外溢也。厥而心下悸者。水邪凌心也。皆主以茯苓甘草湯鎮水邪下降。不爾。汗多則亡陽。水由心下入胃。則作利也。凡此皆治膀

膀府邪者也。夫膀胱爲至下之府。而見證多在心肺。之閒者。以金爲水源。金鬱則不輸水。水上逆則克火。故見

證如此。所謂寒燥搏濕病。見膈上者又如此。若太陽中

風中卽傷也。

文自有說。夫太陽中風爲寒中之風。由毛竅僅

襲肌肉。雖由太陽

穴道

太陰毛竅

門戶而來。而未入於經脈

之中。見證鼻鳴乾嘔。肺氣雖亦被傷。而未甚遏鬱。所以

脈來陽浮寸陰弱尺陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇

嗇惡寒。浙浙惡風。

惡風未有不惡寒者。但惡寒甚輕。非若傷寒及陰經之甚也。

翕翕

發熱。

翕翕鳥羽掀張之貌。狀其在外之熱勢。非若陽明蒸蒸發熱之由裏出也。此衛分有邪

論張仲景傷寒論

卷三

不能衛外。又不能護營。營氣不共衛氣和諧之象。衛行脈外。主溫肌肉。肥腠理。腠謂津液滲泄之所。理謂文理會逢之所。所以桂枝湯取桂枝甘草生薑溫衛。芍藥甘草大棗護營。營衛兩和。病自可已。服後須臾。歎熱稀粥。以助藥力。溫覆取熱。黎黎微似有汗者佳。不可令如水淋漓。病必不除。以汗多動營。汗從營出。衛邪仍在。故也。凡解肌法。皆當如此。與傷寒發汗不同。與溫病由裏達表亦不同。若發汗太過。遂漏不止。其人惡風小便難。四肢微急。難以屈伸。津液少。之此衛分表邪未盡。而又有津脫陽虛之象。主桂枝。



加附子湯疏衛護營回陽止汗若燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝如豚奔者然宜炙其核主

各一壯與桂枝加桂湯取桂枝多則味重下達不獨禦寒且能爲膀胱化氣也若下後脈促胸滿中虛而表邪仍在者主桂枝去芍藥湯下後陽虛微惡寒者主桂枝加芍藥加附子湯下後微喘及未經下面白喘者皆表未解故也宜解表兼消痰降逆主桂枝加厚樸杏仁湯其有陽脈濇陰脈弦者當腹中急痛此太陰土虛肝木來乘故也先與小建中湯卽桂枝湯加飴糖取大甘以和中土

治太陰不差者卽轉而治少陽與小柴胡湯疎土中之木若發汗後身疼痛脈沈遲表未盡而裏已虛者桂枝加芍藥生薑人參湯發汗過多其人叉手自冒下悸欲得按者汗爲心液多則心氣虛主桂枝甘草湯若其人惡寒振振欲擗地者則陽虛已極不能制水又非用真武湯不克發汗後臍下悸者欲作奔豚主茯苓桂枝甘草大棗湯化膀胱之氣以鎮水邪太陽病八九日過經不解發熱惡寒一日二三度發如瘡狀但其人不嘔非少陽證清便自調無裏熱證此餘邪未盡主桂

麻各半。湯輕劑解之。若脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更用汗吐下法。其有面有熱色。身痒者。此微邪在皮膚中。欲自出不得。亦主以此湯取其小汗。若身痒加蟲行皮中狀者。此久虛也。又不可用汗。後形如瘧。日再發微邪未盡者。當汗出愈。主桂枝二麻黃一湯。微解之。發熱惡寒。熱多寒少者。主桂枝二越婢一湯。辛涼解之。婢湯。麻黃石膏甘草生薑大棗。服桂枝湯後。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗心下滿。微痛。小便不利者。此停飲也。主桂枝去桂苓。术湯。傷寒脈浮。宜以汗解。醫誤用火迫汗。遂致亡陽。

驚狂起卧不安者。此火迫其胸中之陽。與少陰汗出之神鎮。主桂枝去芍藥加大黃湯。導邪出陽明。攝。主桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。鎮驚癥。疾又有誤用火炎致邪無出路。火氣上逆。陰氣獨滯於下腰以下。重而痺者。此名火逆。主桂枝甘草龍牡湯。和陰鎮逆。此證心無痰閉。故不用蜀漆。本太陽證。醫反下之。引邪入太陰。腹滿時痛。主桂枝加芍藥湯。以斂太陰之邪。若大實痛者。乃邪氣結於太陰。主桂枝加大黃湯。導邪出陽明之府。凡此皆衛分肌腠之邪。因誤汗。誤下。誤火。致生諸變。表邪猶未盡去。故皆從桂枝湯隨證加減。以救其誤。