

方硃砂黃連丸

黃連

四兩

硃砂

一兩

生地

二兩

右件共為細末。煉蜜為丸。以燈心棗湯下。五七九日三服。

上消不能食而渴。以白朮散主之。

方見三卷內。

上消能食而渴。以白虎人參湯治之。

方見三卷內。

諸渴疾。以黃芪湯主之。

方黃芪湯

茯苓

天花粉

麥門冬

各一錢

五味子

六分

甘草

炙四分

生地黃

黃芪

各一錢

右咬咀。水煎熟。食前溫服。

治一切消渴。

方丹谿乳汁膏

黃連

四兩 未

生地汁

生藕汁

天花粉汁

各二斗

右將連末入三汁中。加牛乳二升。生薑汁半升。煉蜜十兩攪勻。重湯頓成膏。每以一兩。置舌上徐徐噙化。白湯吸下。日五七服。

治心火上炎。腎水不濟。煩渴引飲。氣血日消。以降心湯。

方降心湯

人參

遠志

當歸

川芎

熟地黃

各一錢

白茯苓

五味子

黃芪

各一錢

甘草

五分

天花粉

一錢五分

右咬咀。棗子二枚。水煎熟。食前服。

津液衰少。不思飲食。以參苓飲子。

方參苓飲子

人參

白茯苓

麥門冬

五味子

白芍藥

熟地黃

各一錢

黃芪

一錢二分

天門冬

甘草

四分 烏梅 一枚

生薑 三片

棗子 二枚

右咬咀水煎熟食遠溫服。

治腸胃結熱一切消症用猪肚為腸胃之引使黃連清熱知母

麥冬天花粉生津止渴。

方猪肚丸

猪肚

一具男用雄女用雄

黃連

六兩

知母

四兩

麥門冬

四兩

天花粉

六兩

右件共為細末入猪肚內以線縫合蒸爛加煉蜜石臼內杵

成泥丸如梧桐子大每米飲下五十丸日三服。

治口唇乾燥小便數舌上赤脉以和血益氣湯。

方和血益氣湯

黃芪 二錢

人參 一錢五分有嗽去五分

甘草

蒼朮 各一錢

柴胡 升麻 各五分

木香 四分

陳皮 八分

右咬咀水二鍾煎一鍾食遠溫服。

治一切口乾煩渴此乃虛火上炎所致也經云虛火宜補又云

甘溫能除大熱虛熱生津止渴。

方玉泉丸

人參 三兩

黃芪 二兩

茯苓 二兩

甘草 炙七錢

天花粉 四兩

麥門冬 一兩

乾葛 二兩

烏梅 一兩

右件共為細末煉蜜為丸如彈子大每溫白湯嚥下一丸日

三服。

病消渴大便閉澁喜溫飲陰頭退縮舌燥咽乾眼澁難開黑處見浮雲以當歸潤燥湯。

方當歸潤燥湯

細辛

甘草生熟

紅花

杏仁各三分

熟地黄

升麻

各一錢

柴胡

石膏

黃蘗酒炒

防風

各五分

知母

桃仁

麻仁各六分

當歸身

八分

荊芥

四分

小椒三枚

右咬咀水煎熟食前溫服。

病消中能食而瘦口舌乾枯自汗大便結燥小便頻數以生津

甘露飲。

方生津甘露飲

升麻

四分

防風

五分

甘草

生熟各二分

防已

生地黃

各五分

柴胡

一錢

當歸身

六分酒洗

羌活

黃芩

酒洗

黃芪

知母

各一錢

石膏

龍胆草

黃蘗

各一錢五分

紅花

少許

桃仁

五箇

杏仁

十箇

酒

少許

右咬咀水二鍾煎一鍾食遠溫服。

老弱之人大渴以易老門冬飲。

〔方〕易老門冬飲

麥門冬

知母

五味子

生地黃

茯神

各

分人參

天花粉

葛根

各一錢

甘草

炙五分

右咬咀水二鍾煎一鍾食前溫服。

〔治〕一切消渴其効如神。

〔方〕彌絲湯

繭絲水

甘寒陳久者良不拘多少

蓋此水由水火交濟而成有陰陽交濟之用大能升水降火不拘時服。

治自汗大便硬小便數而善食易飢者以調胃承氣湯和之用

此暫徹胃熱不可常服

方見三卷內

消渴飲少小便反多以八味地黃丸治之

方見四卷內

善食多飢以瀉黃散

方瀉黃散

藿香

山梔子

甘草

防風

石膏

各等分

右咬咀水煎熟食遠服。

耳輪焦黑小便如膏以六味地黃丸

方見本卷前

或十全大補

湯去桂倍地黃加酒製知母酒炒黃蘗主之

方見三卷內

病食已如飢。胃熱消穀。陽明脉盛。心火上行。面黃肌瘦。胸滿脇脹。小便赤澀。以加減茯苓湯。

〔方〕加減茯苓湯

赤茯苓

橘紅

澤瀉

桑白皮

赤芍藥

半夏

薑製

石膏

各一錢

白朮

一錢半

人參

八分

石咬咀。用生薑五片。水煎熟。食前溫服。○如病甚。加大黃。朴硝。須看人虛實加入。

〔治〕心移於肺。飲此洩多。此名肺消。法當補肺平心。以黃芪補肺。

湯治之。

方見本卷前。

心膈有熱。消渴。咽乾面赤。以地黃人參湯。

〔方〕地黃人參湯

生地黃

人參

熟地黃

枇杷葉

各一錢

甘草 四分

黃芪 八分

天門冬

麥門冬

澤瀉

石斛 各七分

右咬咀水二鍾煎一鍾食前溫服。

渴飲水多停蓄不散心下漉漉有聲小便不利以五苓散主之

若熱渴去桂加人參名春澤湯 方見三卷內

消渴兼有白濁以茯苓丸主之。

方茯苓丸

兔絲子 五兩 五味子 三兩五錢

白茯苓 二兩五錢

蓮肉 一兩五錢

右各件共為細末以山藥末三兩作糊為丸如梧桐子大每

服五十丸米飲空心送下。

○諸熱

上中二焦積熱不散。令人口苦咽乾。唇舌生瘡。或因服餌丹藥。或食炙煨所致也。必大小便澀閉。此皆實熱。法當清利。心火有下虛之人。口燥煩渴。精神短少。懶于動作。此是虛火上炎。當滋腎水。使虛火得安其位。不可作實熱施治。

口舌生瘡。痰實不利。煩渴便溺閉澀。以涼膈散主之。時值盛夏。加黃連。

方涼膈散

薄荷

連翹

冬一錢五分

山梔子

甘草

生

黃芩

各一錢

○如大便結燥。仍用大黃朴硝

各一錢

右咬咀。水煎熟。食後溫服。

三焦燥熱。咽喉腫閉。便澀溺赤。以三黃丸主之。

方三黃丸

黃連

黃芩

大黃

煨各等分

右各件共爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服四十九。白湯送下。食後服。

一方。加龍腦少許。夜間噙化。

病肺熱喉腥。胃熱口臭。脾瘴口甜。膽瘴口苦。咳嗽咯血。衄血。諸淋下血。消渴。並以龍腦鷄蘇丸治之。

方龍腦鷄蘇丸

柴胡

二兩銀州者勝

木通

二兩二件用湯浸二宿取汁

生地黃

六兩

黃芪

一兩

麥門冬

四兩

人參

阿膠

蒲黃

炒各二兩

甘草

炙一兩五錢

右各件製度。除浸二味汁。生地黃另研細末外。其餘同爲細末。用好蜜二斤。先煉三四沸。入生地黃末在內。不住手攪。

勻。入二味浸汁。慢火熬成膏。勿令焦色。和丸。如梧桐子大。每服四十丸。嚼破白湯下。

若煩熱消渴驚悸。皆用人參湯下。

若咳嗽咯吐衄吐等血。俱用麥門冬下。

如諸淋。車前子湯下。

熱毒不散。狂語亂言。以黃連鮮毒湯主之。方見三卷內。

蘊積熱毒不散。及治急驚失瘡。狂妄喉疼。以龍腦丸治之。

方龍腦丸

龍腦後研

硃砂

鵬砂

牛黃

右各等分。先研三味極細。方入龍腦。畧研得勻。便止。鎔黃蠟為丸。如米粒大。每服三五丸。用甘草人參湯。不拘時。送下為愈。

治諸般熱證。中風驚癇神志不寧。以當歸龍會丸治之。

方當歸龍會丸

當歸

草龍膽

山梔子

黃連

黃蘗

黃芩

大黃

廬薈

青黛

各五錢

木香

二錢五分

麝香

右各件共為細末。煉蜜為丸。如小豈大。每服二十九。淡生薑湯送下。

一方加柴胡。川芎。各五錢。

肌熱目赤。面紅煩渴引飲。脉洪大而虛重。按全無。此乃血虛火盛。以當歸補血湯治之。

方當歸補血湯

黃芪

一兩

當歸

五錢

右咬咀。水煎熟。分作二服。

〔病〕口燥。嗌乾。精神短少。此是虛火上炎。以清心蓮子飲。加炒山

梔仁。黃蘗治之。

方見三卷內。

〔治〕腎水衰乏。相火妄動。上盛下虛。口燥足冷。以十全大補湯。加

黃蘗。知母主之。

方見三卷內。

○痺論

痺者。麻木不仁之謂也。症狀多端。是以方書有痛痺。行痺。著痺。週痺。肉痺。骨痺。脉痺。等名之異。雖然種種不同。未有不由體質虛弱。風寒溫氣。乘之所致。是以經云。風寒濕三氣雜至。合而為痺。風勝為走痺。濕勝為著痺。寒勝為痛痺。春月遇此為筋痺。夏月遇此為脉痺。秋月遇此為脾痺。冬月遇此為骨痺。至陰月遇此為肉痺是也。大抵痺之為患。在肌肉則麻木不仁。在筋則拘

屈不便在脉則血凝不流入骨則重者不舉若邪在肌肉之時或針或汗或灸俱易成功不然至入筋骨之際必不易治患者醫者兩宜致意焉雖然又有氣虛不能導血榮養筋脉而作麻木者有因血虛無以榮養肌肉以致經隧滯澁而作麻木者又不可專執汗灸針三法當要分辨氣虛血虛痰飲瘀血而療如氣血宜四君子爲主加減血虛宜四物爲主加減因痰導痰爲先因瘀血則行瘀爲本宜各推宜不可執一

○脉症奇言

脉浮而濡屬氣虛。脉浮而緩屬濕爲著脾。

脉紫而浮屬寒爲痛。脉弦而滑屬痰。

脉澀而芤屬瘀血脉見。前痺在上體關後痺在下關內痺在

中

痺症雖因風寒濕三氣而成。未有不由于正氣虧敗所致。則客於筋脉皮肉筋骨。久而不已。入於五臟。則死矣。

如煩滿喘而嘔者。是痺客於肺。

如煩心上氣。噤乾恐噫。厥脹滿者。乃痺客於心。

多飲小便數。小腹病。如妊娠夜臥則驚。是痺客於肺。

如善脹尻以代養。以代頭者。是痺客於腎。

如四肢懈惰。發咳嘔沫。上為大寒者。是痺客於脾。

又有腹痺。胞痺。隨其腑。諭以施針灸。或先瀉後補。或補瀉兼施。

可也。

痺症多由氣血虧敗。風寒濕等邪乘之。是以有氣虛。血虛。挾風。

挾痰。挾濕。挾寒。挾瘀血等。因不同。治宜補養氣血為本。疎。

理邪氣為標。

如因氣虛人參白朮爲主治。

如白血虛宜以當歸地黃芍藥爲主治。

如風勝防風羌活爲主治。

如因濕勝宜以白朮蒼朮爲主治。

如因寒勝宜以烏頭附子乾薑爲主治。

如痰勝宜以南星半夏香附等爲主治。

如瘀勝宜以桃仁紅花牛膝等爲主治。

病風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻痺不仁以五痺湯。

○五
車易 薑黃

防已

各一錢

羌活

一錢二分

白朮

一錢五分

甘草

炙四分

右咬咀用生薑七片水煎熟如病在下食前服如在上食後

溫服。