

S28

1780

1P8

名醫類案

第八



名醫類案卷第八

新都篁南江瓘集 後學

仁余 錢塘魏之琇玉璜 仁沈 鮑廷博以文

血症

張杲在汝州因出驗尸有保正趙溫不詣尸所問之即云衄

血已數斗昏因欲絕張使人扶掖至鼻血如簷滴張謂治

血莫如生地黃遣人覓之得十餘斤不暇取汁因使生服

漸及三四斤又以其滓塞鼻須臾血定又癸未娣病吐血

有醫者教用生地黃自然汁煮服此治熱日服數升三日

名醫類案卷第八 血症



而愈有一婢半年不月見金中餘汁。輒飲數盃。尋卽通利。其效如此。

東垣治一貧者脾胃虛弱。氣促精神短少。衄血吐血。以麥門

冬二分。人參歸身三分。黃芪白芍甘草各一錢。益氣血脫五味

五枚。作一服。水煎稍熱服。愈繼而至。冬天寒居密室。臥大

熱炕。而吐血數次。再求治。此久虛弱。外有寒形。而有火熱

在內。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉裏之虛熱。夫

冬寒衣薄。是重虛其陽。表有大寒。壅遏裏熱。火邪不得舒

伸。故血出於口。憶仲景傷寒有云。太陽傷寒。當以麻黃湯

發汗。而不與之。遂成衄。却與麻黃湯立愈。此法相同。遂用



之以麻黃桂枝湯人參益上焦元氣而實其表麥門冬保

肺氣各三分桂枝以補表虛當歸身和血養血各五分麻

黃去根節去外寒甘草補脾胃之虛黃芪實表益衛白芍

藥各一錢五味三枚安其肺氣臥時熱服一服而愈

丹溪治一婦貧而性急忽魴作如注倦甚脉浮數重取大為

陽脉亦有大則為虛非重取而得之也且此陽滯於陰病雖重可治急以

萱草根入薑汁各半飲之本草云萱草根同薑汁服乃大熱魴血仙方就以四

物湯加香附側柏葉四服覺渴仍飲以四物十餘貼而安

有形之血不能速生無形之氣所當急固況症倦甚而魴

如注即乃先生以為陽滯於陰不投參朮而用四物後學

宜細心別焉

一壯年患嗽而咯血發熱肌瘦吐血發熱治女人要問經次行否恐氣升而不降當閱經

水俞子容醫用補藥數年而病甚脉瀯此因好色而多怒治案可法

精神耗少又補塞藥多榮衛不行瘀血內積肺氣壅遏不

能下降治肺壅非吐不可精血耗非補不可唯倒倉法二

者兼備但使吐多於瀉耳兼灸肺俞右二穴肺俞勝在三

椎骨下橫過各一寸半灸五次而愈

一人咳嗽吐血四物加貝母瓜蒌五味桑白皮杏仁欸冬花

柿霜今人治血大率如此

一人年五十勞嗽吐血以人參白朮茯苓百合白芍藥紅花

細辛細辛紅花配方甚奇黃芪半夏桑白皮杏仁甘草阿膠訶子青

黛瓜萆海石五味天門冬

一人近四十咳嗽吐血四物換生地加桑白皮杏仁欬冬花
五味天門冬桔梗知母貝母黃芩

一人不欬吐而血見口中從齒縫舌下來者藥用滋腎水瀉
相火治之不旬日而愈後二人証同俱以此法治之效

一人因憂病欬吐血面黎黑色藥之不效曰必得喜可解其
兄求一足衣食地處之於是大喜卽時色退不藥而瘳經
曰治病必求其本又曰無失氣宜是知藥之治病必得其
病之氣宜苟不察其得病之情雖藥亦不愈也

滑伯仁治一婦體肥而氣盛自以無子嘗多服煖宮藥積久

火盛迫血上行爲衄。衄必數升餘。面赤脉躁疾。神恍恍如癡。醫者猶以上盛下虛丹劑鎮墜之。伯仁曰。經云。上者下之。今血氣俱盛溢而上行。法當下導。奈何實實耶。卽與桃仁承氣湯三四下。積瘀旣去。繼服旣濟湯二十劑而愈。

一人病嘔血。或滿杯。或盈盆盎。且二三年。其人平昔嗜市利。不憚作勞。中氣因之侵損。伯仁視之。且先與八寶散一二日。服黃芩芍藥湯。少有動作。卽進犀角地黃湯。加桃仁大黃湯。稍間服抑氣寧神散。有痰用礞石丸。其始脉芤大。後脉漸平。三月而愈。屢效。

一人乘盛暑往途中吐血數口。亟還則吐甚。胸拒痛。體熱頭

眩病且殆。或以爲勞心焦思所致。與茯苓補心湯。仁至診其脉洪而滑。曰是大醉飽。胃血壅遏。爲暑迫血上行。先與犀角地黃湯。繼以桃仁承氣湯。去瘀血宿積。後治暑。卽安。一人病咳血痰。診其脉數而散。體寒熱。仁曰。此二陽病也。在法不治。當以夏月死。果然。

子和治一書生過勞。大便結燥。欬逆上氣。時喝喝然有音。吐嘔鮮血。以苦劑解毒湯。加木香。漢防已煎服。時時啜之。復以木香檳榔丸泄其逆氣。月餘而痊。

呂滄洲治一人病衄。浹旬不止。時天暑脉弱。衆醫以氣虛不

統血。

老生常談

日進芪歸茸附滋甚。求治。呂至。未食頃。其所衄

血已三覆器矣。及切其脉，兩手皆虛芤。右上部滑數而浮。

躁。脉浮參以時令其鼻赤查而色白。卽告之曰：此得之酒。酒毒

暴悍而風暑乘之，熱蓄於上焦。故血妄行而淖溢。彼母某

嘗飢走赤日，已而醉酒向風臥。公所診誠是，爲製地黃汁。

二升許。補其本兼用防風湯。瀉其標飲之卽效。

項彥章治一婦，患衄三年許。醫以血得熱則淖溢，服瀉心涼

血之劑，益困。衄纔數滴，輒昏。六脉微弱，寸爲甚。曰：肝藏血

而心主之。今寸口脉微，知心虛也。心虛則不能司其血，故

逆而妄行。當養心，仍補脾。實其子，子實則心不虛矣。虛則補母

有之虛而補子之說，今見此案，信哉醫理。以琥珀諸補心，無窮盡無方體也。故其命方曰歸脾湯。



藥遂安

許先生論梁寬父病。右脇肺部也。欬而吐血。舉動喘逆者。肺脹也。發熱脉數不能食者。火來刑金。肺與脾俱虛也。脾肺俱虛而火乘之。其病爲逆。如此者。例不可補瀉。若補金則

慮金與火持。而喘咳益增瀉。火則慮火不退位。而疰癖反

甚。

真知箇中三昧

正宜補中益氣湯。先扶元氣。少以治病。藥加之。

聞已用藥未效。必病勢若逆。而藥力未到也。遠期秋涼。庶可復爾。蓋肺病惡春夏火氣。至秋冬火退。只宜於益氣湯中。隨四時升降寒熱。及見有證。增損服之。或覺氣壅間與加減枳朮丸。或有飲間服局方枳朮湯數月。逆氣少回。逆

氣回則可施治法但恐今日已至色青色赤及脉弦脉洪則無及矣病後不見色脉不能懸料以既愈復發言之惟宜依准四時用藥以扶元氣庶他日既愈不復發也其病初感必深恐當時消導尚未盡停滯延淹變生他証以至於今宜少加消導藥於益氣湯中庶可漸取效也

一人膏粱而飲至今病痢醫曰諸見血者爲熱以清涼飲子投之卽止越數日其疾復作醫又曰藥不勝病故也遂投黃連解毒湯或止或作易數醫皆用苦寒之劑俱欲勝其熱而已飲食起居浸不及初肌寒而時躁言語無聲口氣臭穢似熱惡如冷風其衄之餘波則未絕也或曰諸見血者

熱衄熱也。熱而寒之理也。今不愈而反害之何耶。內經曰以平爲期。又言下工不可不慎也。彼惟知見血爲熱而以苦寒攻之。抑不知苦瀉土土脾胃也。脾胃人之所以爲本者。今火爲病而瀉其土。火未嘗除而土已病矣。土病則胃虛。虛則榮氣不能滋榮百脉。元氣不循天度。氣隨陰化而無聲肌寒也。噫粗工喜噃以爲可治。熱病未已。寒病復起。此之謂也。

吳球治一少年患吐血。來如湧泉。諸藥不效。虛羸瘦削。病危亟脉之。沉絃細濡。其脉爲順。血積而又來。寒而又積。疑血不歸源故也。嘗聞血導血歸。未試也。遂用病者吐出之血。

瓦器盛之。俟凝入銅鍋炒血黑色。以紙盛放地上。出火毒。細研爲末。每服五分。麥門冬湯下。進二三服。其血遂止。後頻服茯苓補心湯數十貼。以杜將來。保養半年復舊。

徐德占治一人患衄尤急。灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立止。蓋血自此入腦。注鼻中。常人以線勒頸後。尚可止衄。此灸宜效。

秀州進士陸迎忽得疾。吐血不止。氣蹙驚顫。狂躁跳躍。雙目直視。至深夜欲拔戶而出。如是兩夕。諸醫盡用古方及單方。極療不瘳。舉家哀禱。事觀音。夢授一方。但服一料。當永除根。用益智一兩。生硃砂二錢。青皮半兩。麝香一錢。爲細

末燈心湯下。

治驚狂吐血方莫過於此

陸覺取筆記之服之乃愈

一人勞瘵吐血取茜草一斤

琇按後云茜草狀如茜草則此處當作茜草

淨洗碎

爲末入生蜜一斤和成膏以陶器盛之不得犯鐵器

日蒸一曝至九日乃止名曰神傳膏令病人五更起面東坐

不得語言用匙抄藥如食粥每服四匙良久呷稀粟米粥

壓之藥只冷服粟米飲亦不可太熱或吐或下皆無害凡

久病肺損咯血吐血一服立愈

翦草狀如茜草又如細辛婺台二州有之惟婺可用

饒州市民季七常苦鼻衄垂困醫授以方取蘿蔔自然汁和

無灰酒飲之則止醫云血隨氣運轉氣有滯逆所以妄行

蘿葡最下氣而酒導之是以一服效經五日復如前僅存

喘息而張思順以明州刊王氏單方刮人中白置新瓦上

火逼乾以溫湯調下卽止

按人中白能去肝火三焦火導膀胱火下行故也且不多用火

力則清涼矣

今十年不作張監潤之江口鎮適延陵鎮官曾棠

入府府委至務同視海舶曾著白茸毛背子盛服濟潔正

對談之次血忽出如傾變所服爲紅色駭曰素有此疾不

過點滴耳今猛來可畏覺頭空空然張曰君勿憂我當爲

製一藥移時而就持與之血止不復作人中白者旋盆內

積鹹垢是也蓋秋石之類特不多用火力治藥時勿令患

人知恐其以爲汚穢不肯服此方可謂奇矣

魏華佗善醫嘗有郡守病甚佗過之郡守令佗診候佗退謂其子曰使君病有異於常積瘀血在腹中當極怒嘔血卽能去疾不爾無生矣子能盡言家君平昔之懃吾疏而責之其子曰若獲愈何謂不言於是具以父從來所乖謬者盡示佗佗畱書責罵之父大怒發吏捕佗佗不至卽嘔血升餘其疾乃平

獨異志

蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄衄血甚已死入殮血尚未止

琇按血未止則生氣猶存

一道人過之聞其家哭詢之道云

是曾服丹或燒煉藥子藥之當卽活探囊出藥半錢七吹

八鼻中立止得活乃梔子燒存性末之

一人鼻衄大出欲絕取茅花一大把水兩碗煎濃汁一碗分二次服立止良方

一人指縫中因搔痒遂成瘡有一小竅血濺出不止用止血藥及血竭之類亦不效數日遂死復有一人於耳後髮際搔痒亦有小竅出血與前相似人無識者適有道人云此名髮泉但用多年糞桶籬曬乾燒灰敷之立愈使前指縫血出遇之亦可以無死矣

邵村張教官患衄血多諸治不效首垂任流三晝夜不止危甚一道人教用生藕一枝搗貼顙顙更以海巴燒存性爲

末鵝管吹入鼻內二三次卽止

海巴俗名壓驚螺卽雲南所用肥也