

婦人小兒

二症疹

墨書全書

卷
五十一
五十二
五十三

朱生亮



婦人小兒

痘瘡方

景岳全書長



會稽 張介賓 會卿著

瀛海 賈棠 青南訂

婦人

安胎飲一 治妊娠五七個月用數服可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草

紫蘓

炙黃芩

各一錢

古用薑水煎服○一方有砂仁

安胎散二

治妊娠卒然腰痛下血

熟地

艾葉

白芍炒

川芎

黃芪炒

阿膠炒

當歸

甘草炙

地榆各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱

或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃
氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加
黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐
東臯曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小產此由體
弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎
多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清

和無火煎燂則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行
欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快
脾氣多用亦耗真氣况香燥之性氣血兩傷求以安胎適又
損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化
工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子
共知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩

各一錢

川芎

白芍藥

熟地

各八分

白朮

二錢

炙甘草

砂仁

各五分

糯米

一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月
之後方無慮也

地黃當歸湯

一名內補丸○治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟地 二兩

當歸 一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗膏和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方

當歸湯五

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參

各二三錢 阿膠 炒

甘草

炒各一錢

連根葱白

一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六

或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上搶

短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃芪

炙甘草

等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七

治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或

去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠

炒一兩

艾葉

數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八

治胎動腹痛

阿膠炒

白茯苓

白朮炒

川芎

當歸

陳皮各一錢
甘草炒三分

右薑棗水煎服

良方黃芪湯九

治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合

黃芪炒

川芎各一兩

右水煎分三服

良方釣藤湯十治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

釣藤鈎

當歸

茯神

桑寄生

人參各一錢
苦梗一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方白朮散十一

治妊娠傷寒內熱等證

白朮

黃芩 炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方

三味白朮湯

十二

治妊娠內熱心痛

白朮 四錢

赤芍藥 三錢

黃芩 炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方

四味白朮湯

十三

治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮

炒一錢

人參

五分

甘草

炒

丁香

各二分

右薑水煎服

全生白朮散

十四

治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎

腫

白朮 一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓 各半兩

右爲末每服二錢米飲下○如末應佐以人參甘草

探胎飲 十五

婦人經水不來三月疑似用此驗之

川芎

不拘多少爲末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者
乃血瘕也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯 十六

治妊娠心腹急痛或去血過多而眩運

當歸

白芍藥 炒

白朮 炒

茯苓

澤瀉

各一錢
川芎 二錢

右水煎服

益母地黃湯 十七

治妊娠跌墜腹痛下血

生地

益母草 各二錢 當歸

黃芪 炒各一錢

右薑水煎服

良方獨聖散 十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒
勿令焦黑取仁爲末

右用熱酒調服四五分或一錢。此物有安胎導滯易產之

功實妊婦之要藥也

良方安胎寄生湯 十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生

白朮

茯苓 各五分 甘草 一錢

右水煎服

二黃散 二十

治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

作渴或脇肋脹痛等證

生地

熟地

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散

治漏胎下血

條芩

白朮

砂仁

阿膠 各等分

右爲細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按

此方若改爲湯砂仁用當減半

良續斷湯

治妊娠下血尿血

當歸

生地黃 各一兩 續斷

赤芍藥 各半兩

右爲末每服二錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯

治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡

阻

枳殼炒

黃芩炙各半兩

白朮炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻柴胡○若因晡熱內執宜用逍遙散

滑胎枳殼散

二四

此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產累

日不下南山道人進此方

粉草炒一兩

商州枳殼麩炒二兩

右爲末每服二錢空心沸湯調日三服比孕六七月宜服之

○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散二五

方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯一六

治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不

利或胎死腹中皆效

當歸

芍藥 各一錢 白朮 一錢

茯苓 一錢半

橘紅 五分

鯉魚 一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半八藥加生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯二七

治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方

有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃芩 各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四
物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘓飲

治妊娠失調胎氣不安上疝作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘓葉

當歸

各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾
氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜
用四君芎歸

安樂散

二九

治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋甚妙

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛
等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服二錢麥冬湯調服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏粱厚味宜用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散 三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤

洗畧炒

香附

炒

陳皮

甘草

烏藥

等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘓三葉水煎食前日

進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯

羚羊角散 三一

治妊娠虛風頸項強直筋脉攣急語言寒澀

痰涎不利不省人事名日子癇

羚羊角 鎊

川獨活

棗仁

五加皮

薏苡仁 炒

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

去皮尖
各五分

炙甘草

木香

各一分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致須用加

味逍遙散

人參橘皮湯 三一

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲

食少進益胃和中○一名參橘散

人參

陳皮

麥門冬

白朮

各一錢

厚朴 制

白茯苓

各五分

炙甘草

三分