

卷三

頭痛

髮髮

耳病

耳塞

耳聾

耳衄

面病

眩暈

鼻病

附鼻軌

鼻淵

鼻膿

鼻蟲

瘰肉

鼻瘡

鼻疳

欠嚏

鼻衄

附九竅出血

口病

三消

消瘰

附口燥咽

唇病

金匱啟鑰 第三冊

濂江

黃朝坊

妙山

輯著

明萬曆間人

鹿江黃朝坊妙山輯著

頭痛論

夫人之頭象天。三陽六腑清陽之氣皆會於此。三陰五臟精華之血亦皆注於此。於是天氣所發六淫之邪。人氣所變五賊之逆。皆能相害。或蔽覆其清明。或瘀塞其經絡。因與真氣相搏。鬱而成熱。則脈滿。滿則痛。邪氣羈留。其脈亦滿。而氣血亂。則痛甚。是痛皆爲寔也。若寒濕所侵。雖真氣虛。不與相搏。成熱然其邪客於脈外。則血注脈寒。寒則脈縮。卷緊。急外引小絡而痛。得溫則痛止。是痛爲虛也。世俗治頭

痛之法。不從風則從寒。安知其有不一之邪乎。有因風木痛者。則抽掣惡風。而或有汗。有因暑熱痛者。或有汗。或無汗。則皆惡熱。有因濕而痛者。則頭重。而遇天陰尤甚。因痰飲而痛者。亦頭昏重。憤憤欲吐。因寒而痛者。則絀急惡寒。更有氣虛而痛者。遇勞則甚。其脈大有血虛而痛者。喜驚惕。其脈芤。夫病形分之。更兼所見之証。察之。宜無不得之矣。由是斟酌其祛風散寒。清暑解熱。却濕化痰。攻寔補虛之劑。以治之。頭痛之病。豈猶有遺治哉。然有三陰三陽之異。而又不可不辨。太陽經頭痛。在頂連後腦。惡風寒。脈浮緊。川芎獨活之類。主之。少陽經頭痛。在側。脈弦細。往來寒熱。柴胡黃芩主之。陽明經頭痛。在前。

經頭痛必有痰。或體重腹痛。爲痰癖。脈沉緩。宜蒼朮半夏南星主之。
少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。而足寒氣逆。爲寒厥。其脈沉細。麻
黃附子細辛湯主之。厥陰經頭痛頂疼。或吐痰沫。且冷厥。其脈浮緩。
吳茱萸湯主之。上陰陽兩經除六陰。厥陰多用表藥。其有熱鬱於內
者。豈可概用乎。故有發熱惡熱而渴。此陽明頭痛者。可與白虎湯加
白芷治之。熱厥頭痛。雖嚴寒猶喜風寒。遇微暖處。或見烟火。其痛復
作。宜清上瀉火湯。後用補氣湯。痰厥頭痛。眼黑頭旋。半夏白朮天麻
湯主之。傷食頭痛。胸膈痞塞。噯酸噫出。氣如敗卵臭。畏食不思。雖發

子大角牛旁子
是也

金匱要略

卷三

二

熱而身不痛。宜治中湯。加砂仁。傷酒頭痛。惡心嘔吐。出宿酒。昏冒眩。
暈。宜葛花解酲湯。怒氣傷肝。及肝氣不順。上衝於腦。令人頭痛。宜沉
香降氣散。并蘇子降氣湯。下養正丹。頭痛連睛痛者。石膏牛子炒爲
末。食前茶清調下。外有臭毒頭痛。宜香附炒服之。若頭痛胸中痛。食
減少。咽噎不利。而寒冷。脈左寸弦急。宜麻黃吳茱萸湯。濕熱在頭。而
頭痛者。必以苦吐之。輕者用透頂散。搐鼻取涎。血虛頭痛。白魚尾眉
後連髮際上攻頭痛。當歸川芎主之。然血虛者。卽陰虛也。六味地黃
日魚尾丸左歸丸。聽其擇用。氣虛頭痛。人參黃芪主之。然氣虛者。卽陽虛也。
八味地黃丸。附子埋中湯。亦可投也。氣血兩虛。頭痛。補中益氣湯加。

白朮附子湯。冬月大寒犯腦。令人腦痛齒亦痛。名曰厥逆。出奇病論。
中宜羌活附子湯。有真頭痛。甚則腦盡痛。手足寒至節。此旦發夕死。
夕發旦死。蓋腦爲髓海。真氣之所聚。卒不受邪。受邪則死。古云。用黑
錫丹灸百會。猛進參附。川烏沉香。或可生。然天柱折者。不可治。又有
偏頭風。頭半偏痛是也。宜清空膏。丹溪云。有痰者多。左屬風。荆芥薄荷
兼屬血虛。川芎當歸。右屬痰。蒼朮法夏。兼屬熱。黃芩可用。或用生
蘿蔔汁。仰臥注鼻中。左痛注右。右痛注左。或用蓖麻子五錢。大棗十
五枚。去核共搗。令熟塗紙上。用筋一隻捲之。去筋納鼻中。良久取下。

清涕卽止。或用川芎散搐之。有雷頭風。頭面起核塊者。是也。或云頭如雷之鳴也。爲風邪所客。風動則作聲。治以清震湯。有大頭風痛者。頭大如斗。是天行時疫。病亦傳染於人。東垣製以普濟消毒飲子。全活甚眾。有眉稜骨痛者。眉骨者。目系之所過。上抵於腦。爲目屬於腦也。若諸陽經或挾於外邪。鬱成風熱之毒。上攻於頭腦。下注於目睛。遂從目系過眉骨相併而痛。選奇湯主之。若肝虛而痛。纔見光明。則眼眶骨痛。宜生熟地黃丸。有肝經停飲。發則眉稜骨痛。目間可開。晝靜夜劇。宜導痰湯。有頭風屑。梳頭有白皮落。見肺之証也。肺主皮毛。大便寔瀉。青丸。體虛者。宜人參。消風散。外宜白芷。未參之。又頭重。

皆得病頭重可用紅豆散搖之有頭搖者風也火也夫頭之真氣乃
陽之所過督脈與厥陰之所會故三經所逆之火火聚於此者皆從
風木而爲掉搖也平肝而風自息可參顫振門而酌治之

証治歌

經不上頭腎與脾

厥陰與督脈會於巔亦上頭

痰凝氣阻亦如錐

脾腎有時亦頭痛

大陽

頭痛腦連後浮脈川芎獨活施若痛少陽頭兩側脈弦寒熱柴

胡黃

芍治陽明額痛脈長緩

升麻葛根

石膏白芷醫疾發大陰必腹痛痰

多體重脈沉遲南星法夏兼蒼朮此葯一拔效可期脈細少陰氣逆

厥麻

黃附子

細辛不可移。厥陰頭痛脈浮緩。冷厥吳萸湯可爲上法。

肝脾外盡表。醫家豈僅表。芳規發熱口乾還惡熱。白虎

湯

加芷所宜。

知頭痛喜風爲熱厥。湯投

清上

瀉火氣扶持。

後服補氣湯

痛因痰厥眼旋。

黑半夏天麻白朮司飲食有傷胸滿悶。噯酸有臭味差池。畏食不思。

身發熱砂仁

入治中湯主之。傷酒惡心頭痛眩。湯號

蒼花

解醒服一。

扈肝因怒燥上衝腦。沉香降氣

湯

莫猜疑。蘇子湯名亦降氣。煎吞養。

正丹莫遺有連情痛石膏好。牛子茶清勿逶迤。臭毒痛頭香附炒。卽

宜調服白揚眉頭連胸膈咽喉痛減食麻

黃

吳

湯起危濕熱痛頭。

雖用吐輕將透頂。散搐鼻堪緩。血虛頭痛陰虛証。魚尾上攻頭痛悲。

風右痰
也

湯八味丸資氣血兩虛宜補益氣湯加蔓非細生芎服解頤

更有風虛頭痛者湯名尤附子方難離冬寒犯腦痛連齒活附子

湯投無險夷腦盡痛兮疾更苦朝發夕死急如斯丹投黑錫正如法

參附川烏沉香服莫遲百會灸甦法亦美如天柱折別離時頭風痛

在一邊側不用清膏更有誰披閱書云有異致風痰血熱各分岐

左風荆芥薄荷好藥用芎歸因左虧右屬痰凝尤半夏熱用黃芩

醫匪癢摘鼻可將蘿蔔汁右痛注左左右宜方用蓖麻兼大棗和融

紙上用紛披用箸捲之畢抽箸納鼻病鬆即洩垂或以川芎散搐鼻

三才文編 卷三 頭痛 五

莫嫌外法不爲奇。更有雷頭風痛証。忽生核塊清震。湯怕頭如斗大。

相傳易古方。普濟消毒。飲可詳推選奇湯。止眉稜痛。眶痛。生熟地黃。

九可免。咀稜痛。晝平夜劇甚。湯飲導痰。自不疲。屑風梳有白皮落。便。

寔濕青丸可通。若是虛証莫妄用。人參消風散。進信無疵。細研白芷。

末勻摻。此法用之有不欺。頭重濕淫痰飲。遇可將紅豆搗無差。頭搖。

治約何方的。鸛振門求自可師。

脈

寸口緊急。或短。或弦。或浮。皆頭痛。浮緊爲大陽。浮緩爲陽明。沉緩大。

陰沉細少。陰沉緩。沉陰浮弦。爲風浮共爲大。右寸母或大或弦。而前。

左右皆不足氣血兩虛右寸緊盛食積左關洪大爲胃熱上攻寸口
弦細膈上有風涎冷痰或嘔吐沉細爲陰毒傷寒但頭痛身不熱也
診頭痛目痛久視無所見者死病若頭痛目痛脈急短澀死浮滑風
痰易治

方

吳茱萸湯 治陽明症食穀欲嘔若得湯反劇者則屬上焦少陰症
吐利手足厥冷煩燥欲死厥陰症乾嘔吐涎頭痛

吳茱萸

泡

人參

大棗

生薑

病上瀉火湯

羌活 三分

生地 五分

黃芩 酒炒 半分

防風

升麻 七分

柴胡

藁本 五分

黃連 酒炒 五分

知母 去毛酒 炒 半分

甘草 五分

川芎

荆芥 二分

蒼朮

當歸 三分

細辛

紅花 各少許

京子食遠熱服

補氣湯

黃芪 八分

炙草

當歸身 二分

柴胡

升麻 二分

細辛

麻黃 炒 分

丁香 各五分

水煎服

平夏天麻白朮湯

治脾胃內傷、眼黑、頭眩、頭痛如裂、身重如山、惡

心煩悶、四肢厥冷、謂之足大寒、痰厥煩滿。

黃芪蜜炙

陳皮

茯苓

澤瀉

天麻

乾薑

黃柏

酒洗

麻黃吳茱萸湯

蒼朮

麻黃

羌活

各五分

吳茱萸

三分

藁本

柴胡

升麻

黃芪

當歸

黃柏

黃連

黃芩

各二分

半夏

蔓荊子

川烏

各一分

細辛

紅花

食遠熱服

透頂散

治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近

細辛

二莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

麝香

各如黑豆

大一粒

右將腦麝乳鉢內搗極細却將前四味另研勻爲細末然後乳鉢

內盪起腦麝令勻用缶罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搖之
一大豆許良久出涎一升許則安

白朮附子湯

治風虛頭重眩苦極食不知味用此煖肌補中益精

氣

白朮

甘草

附子

炮

右每服用薑棗同煎

清空膏

治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及腦苦痛不

止

黃芩酒

黃連酒

羌活

防風

柴胡

白芍

甘草

炙

川芎散

青黛

二小半

蔓荊子

川芎

二小分

鬱金

細辛根

芒硝

各一

石膏

一不小

薄荷葉

二小

紅豆

一粒

右爲細末，搗鼻取涎。

生熟地黃丸

治肝虛目暗，眼見黑花，或見如飛虫者，翳膜遮障，眉

稜骨痛者，均宜用治。

石斛

枳殼

防風

牛膝

各六兩

生地

熟地

各一斤半

羌活

杏仁

各四兩

菊花

一斤

右為細末蜜和丸如梧子大每服三十丸以黑豆三升炒令烟盡為度淬好酒六升每用半盞食前送下或茯苓湯下

羌活附子湯

黃芪

麻黃

各一

羌活

蒼朮

各五

防丰

升麻

甘草

各二

白芷

三

黑附子

一分

白僵蚕

黃柏

各三

右水煎食後溫服若有寒微加佛耳草

選奇湯

羌活

夏生冬熱

防丰

黃芩

酒炒

甘草

右水煎熱服