

醫
內
篇



南海何夢瑤報之輯

雜症

○傷風寒

附鼻淵

有卒倒等症爲中無卒倒等症爲傷下各篇做此

甚者徧傳經絡已見傷寒論此言其輕淺者邪止犯皮毛皮手

爲肺之合皮毛閉則肺氣不得外泄故上壅而嚏蒸成涕液壅

塞鼻中故聲出重濁肺氣鬱而成熱故肺癢而欬其人平素體

氣寒者則無汗熱者則有汗或發熱或不發熱或頭痛或不頭

痛蓋雖輕症其中又分輕重也虛者參蘇飲見發熱實者川芎茶

調散此症與鼻淵相似而不同傷風屬肺有噴嚏且爲寒邪



故涕清鼻淵屬腦故無噴嚏且係熱邪故涕濁甚則有穢氣鼻
出血蓋鼻淵屬風熱入腦熱氣湧涕傷鼻兩孔氣出如火痛或
成瘡熱不得泄傷及所過營血則衄矣初起蒼耳散散之久病
熱深防風通聖散見中風清之衄者犀角地黃湯見血涼之鼻衄痛
成瘡猪胆汁調冰硼散見口塗之此醫宗金鑑云兩然鼻淵屬腦
熱云無嚏於理未的詳欠嚏篇
可見矣

○破傷風

或損破或瘡潰風從破處入鬱遏正氣為熱理同傷寒而或甚
者以曾經去血挾虛也故多搐瘲等症 先須辨瘡口平而無
水者止于鬱熱而已若腫而出水則熱鬱而蒸成濕矣 脈浮

在表宜汗羌活防風湯九味羌活湯表解後以白朮防風湯貴

之 脈弦者半表半裏宜和解小柴胡湯見寒羌活湯地榆防

風散 脈沉實不大便在裏宜下大芎黃湯江鰮九後服羌活

湯 發表藥宜辛涼不可辛熱 服風藥過多汗不止者白朮

黃耆湯 瘡瘻不已蠲痺湯凡瘡瘡須養血潤燥加引經藥者

後瘡者羌活獨活防風甘草面筋瘡者升麻白芷獨活防風甘

草兩旁瘡者柴胡防風甘草右瘡加滑石右屬脾手足顫掉

不已朱砂指甲散 頭目青黑額上汗珠不流眼小目瞠痛不

在瘡處者傷經絡也並不治 亦有瘡熱鬱結多着白痴瘡日

閉塞氣不宜通鬱熱生風者此為內風但須清熱解鬱 外治

法初於人家糞堆內或爛草房上取蟻螬蟲一枚捏住其背待
蟲口吐水就抹在瘡口上覺麻即汗出立愈或玉真散傅之或
杏仁去皮細嚼和雄黃白麪傅腫消為度 牙關不開蜈蚣一
條焙乾研末擦牙吐涎立甦

○傷暑

熱盛傷氣

壯火食氣也又氣為汗泄則益耗散矣

脉大而虛

氣虛故脉虛

其症自汗面

垢背惡寒

氣從汗泄則陽虛背屬陰陽微故惡寒也

口乾前板齒燥

熱氣初口出故前齒燥

煩

悶或頭疼

火上也攻也

發熱盛也

熱外

神思怠倦

殊甚

暑傷氣而不傷形

則寒

則

傷形血脉為

寒所滯也

此脈虛彼脈實也

又與濕溫相似而異

此身熱而渴彼身涼不

痛與傷風寒異

又與溫熱病相似而異

又與濕熱病相似而異

又與濕熱病相似而異

又與濕熱病相似而異

又與濕熱病相似而異

又與濕熱病相似而異

又與濕熱病相似而異



北京中医药大学图书馆版

渴也此症首在察汗之多少 汗少則熱盛于裏而傷其內氣

肺氣傷必喘乏人參白虎湯見發熱脾氣傷則四支困倦不欲食

人參白虎湯多用甘草腎氣傷則津液涸小便少六味地黃湯

知知栢見虛損又暑先入心心屬火以類相從就燥之義也觀則

先燃濕則心氣受熱而浮心血受熱而燥証見心煩口乾辰砂

五苓散見傷濕硃砂安神丸見煩躁加黃連小腸為心之腑五苓利

心經暑毒使從小便出為治暑上劑益元散尤佳 暑氣攻裏

腹內作痛小便不通生料五苓散加木香七分或益元散大便

不通者加味香薷飲見中暑仍佐以三黃丸見發熱暑毒客於上

焦胸膈痞塞湯藥至口即出不能過關或上氣喘急六和湯浸

暑扁 卷之二 傷暑 三

冷調入麝香少許 暑氣久不解遂成伏暑內外俱熱煩燥自

汗大渴喜冷香薷飲加黃連一錢繼進白虎湯見發熱若不愈暑

毒深八結熱在裏謔語煩渴不欲近衣二便結澀調胃承氣湯

見大便不通或三黃石膏湯伏暑煩渴多熱痰者消暑丸每兩入黃

連末二錢名黃連消暑丸或二陳湯見痰或小半夏茯苓湯見並

可加黃連一錢 自汗手足厥冷六和湯蘇合香丸見諸中 白

汗手足時搐搦者謂之暑風緣汗出毛孔開風乘之火得風扇

益虐筋脉枯急故也香薷飲或香薷湯並見中暑並加羌活一錢痰

盛者風火交煽則痰湧盛六和湯星香散見中風各半貼暑月身痒如針刺

間有赤腫處亦名暑風風邪留于皮膚熱不得泄故痒痛六和湯為末和消風

散見頭酒調服 汗多則熱泄于外陽衰于中真氣耗散宜急

收其汗人參黃花白朮正味也屬以溫中固表為宜 又汗大

泄不止亡陽且令腎水竭絕津液內枯是為亡陰急當滋水之

上源三伏之義為庚金受囚也金遇丙丁失其清肅故孫思邈

謂夏宜常服五味瀉丙以補庚恐金氣為熱所甚散故錄之欲之即補也壬水絕于

巳癸水絕于午西北寒清絕矣故前人立法謂夏月宜補乃補

天元之真氣非補熱火也令人夏食寒是也生脉散見中主之

如兩足欹側脚膝痿弱行步不正是痿也加酒洗黃柏知母令

兩足湧出氣力 東垣謂熱傷元氣四支不收兩足痿軟遇早

晚則寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽血氣俱不足

卷之二 傷暑 四

故陰虛而熱厥陽虛而寒厥也

熱盛則陰虛氣傷則陽亦虛也

口不知味

肝熱則口

酸心熱則口苦肺熱則口辛腎熱則口鹹脾熱則口甘或淡是為口中不和則不知味又氣虛則食不化傷食之人亦不知味也

目中溜火

肝火上透也

視物眊眊無所見

精神恍惚也

小便頻數大便

秘結

熱在下焦

胃脘當心痛

氣虛不運或食或痰或死血滯于胃脘或痛

胸中悶塞時顯

嘔噦

皆不運之故

或有痰嗽

金受火刑

口沃白沫

腎水上泛

腰背腹皆痛甚則

如刀刺腹

皆氣血凝滯之故

頭痛時作

火上升

兩脇痛

肝氣鬱

或急縮臍下

周圍如繩束之急

帶脈血凝枯筋縮

食不下

或食入即飽全不思食

火氣脹悶

目汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上

氣弱陽不外伸兼汗多浸體使然

皆熱傷元

氣所致黃耆人參湯主之

又察其有無別邪如冒暑飲酒酒熱與暑氣內盛發熱大渴小

便不利其色如血生料五苓散見傷濕去桂加黃連一錢或以五

苓去桂吞酒煮黃連丸如傷食者其人頭痛背寒氣為食鬱不達于背

也畏食惡心噫酸臭氣胸膈痞滿六利湯倍砂仁若因暑渴飲

冷致暑毒留結心胸精神昏憤語音不出者寒閉熱于肺管故聲不出香薷

湯見中暑化蘇合香丸見諸中若先飲冷後傷暑者此必心下痞懷

五苓散生薑湯調服佳或君子湯見氣調中亦可中和後或小便

不利或莖中痛宜蒲黃三錢滑石五錢甘草一錢

又暑每兼濕時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之四支困倦

精神短少懶于作動小便黃赤者熱也肢節疼痛大便溏泄身

體沉重者濕也脉洪大熱也而濡或遲濕也須以清熱燥濕之劑治

之東垣清暑益氣湯謂熱傷氣故以黃耆益氣固表為君人參

甘草為臣蒼朮白朮澤瀉等滲利除濕升麻葛根解表熱兼勝

濕風藥也故能勝濕

濕熱壅滯則食不消而痞滿炒鞠青皮消食快食

氣亂於胸中清濁相干陳皮理之黃柏以瀉熱救腎人參五味

麥冬救金以滋水之上源為佐血虛加當歸氣鬱加升柴中滿

去甘草咳去人參咽乾加乾葛血減心煩加人參

陽能生陰也

當歸

少加黃柏瀉火如煩猶不止加黃連然苟非兼濕則諸利水之

品反足以耗竭腎水致損兩目慎之

東垣又謂風犯汗眼汗閉不出為濕身重體痛或渴或不渴小

便不利此風濕相搏也頭痛或上熱壅盛心煩情思慘澹有不

樂生之意

陰濕之情狀如此此陰勝陽之極也

此陰勝陽之極也病甚則傳為痿

厥厥者氣逆上衝也痿者四支痿軟無力也由濕鬱成熱熱極

上衝而厥筋脉受傷則痿也利濕清熱為宜矣

清燥湯可用

又傷暑後復感風寒者身痛頭疼發熱去衣則凜着衣則煩感

風則有汗五苓散

見傷濕

內用桂枝感寒則無汗六和湯加藿香

柴蘇市井中多此症往往日間冒暑經營夜間開窓眠臥所致

有此症而發潮熱似瘧而未瘧者六和湯養胃湯

見瘧

各半貼若

鼻流清涕或鼻孔熱氣時出者亦六和湯加川芎五分羌活黃

芩各七分

已上皆夏月感受暑邪而為其所傷者也

昔人所謂動而

得之為陽症者是也有不必動而得者感其熱氣即病也益元散

又有因避暑貪涼而反為寒

涼所傷者或納風涼以傷其外或食瓜果以傷其內因而頭痛

發熱惡風無汗昔人名此為中暑或又名為中症似傷寒此

為陰寒所遏周身陽氣不得伸越也治宜辛涼發散辛溫消導

此全未傷暑而感風寒者與上文先傷暑續感風寒不同昔人所謂靜而得之為陰症者也

暑月多食生冷忽受暑邪熱入於內陰陽錯雜冷熱相搏中氣

擾動上壅則吐下迫則瀉故多吐瀉霍亂嘔不止者砒礞散

見中去茅根吞來復丹見中嘔而痰却暑散見中吞消暑丸或

小半夏茯苓湯見痰嘔而渴者浸冷香薷湯見中或五苓散見傷

濕兼吞消暑九瀉而渴生料平胃散見傷生料五苓散各半貼

名胃苓散或連理湯即理中湯加黃連白茯苓也建中湯見中寒瀉止仍渴春澤湯

前五苓或縮脾飲見中瀉而腹痛有積者生料五苓散霍香正

氣散見中暑各半貼雖無積而腹痛甚氣滯也生料五苓散加木

香七分或六和湯加木香五分或用二湯調蘇合香丸見諸瀉

而發熱者胃苓散如吐利不止外熱內寒煩躁欲裸形此陰盛

格陽香薷飲加附子或大順散加參附並浸冷服又有吐極胃

虛粒米不入病甚危篤者人參一錢黃連五分薑汁炒焦糯米一撮

水一茶鍾煎至一酒杯候冷與一茶匙許漸漸與之與盡便可

投藥食暑月人多服香薷飲以預防之若元氣素虛或房勞過

度者服之為害不淺若飲預防惟生脈散為宜暑病多陰証

死而肢體爪甲青黑者是也故治暑之劑多用溫熱



傷濕

雨露本乎天清陽也故傷于土止犯皮毛

汗多衣濕不換致濕氣返入于內者周之

泥水本乎下濁陰也故傷于下侵及骨肉二者皆自外入飲食

之濕脾土所生之濕本乎人皆自內出在外在土者汗之以苦

溫甘辛之劑

辛散濕苦燥濕甘溫益氣以散邪

在內在下者利之以苦熱酸淡

之品

恐其土行故用酸苦以歛而降之以淡泄之

治飲食之濕在上則吐之在下則

瀉之

食濕則利之飲濕則瀉大便利之利小便

治脾土所生之濕則察其兼化蓋土

德兼該挾風則為風濕

走注

挾火則熱濕

煩熱

挾寒則為寒濕

痺痛

又上下中外無處不到

在土則頭重胸滿嘔吐在中則腹

身腫重

當分部為治隨所兼寒熱溫涼以用藥又須察其為

何藏之邪如自病土虛生濕則補土如火盛生濕則清心如氣鬱成濕則升旺如金寒水冷泛溢為災則煖腎所治之藥各從所人不特二大其症發熱惡寒惡濕身重自汗骨節疼小便便秘濇大傷泄腰脚痺冷跗腫肉如泥除濕湯見中若兼腰痛特甚不可轉側如纏五六貫錢重者濕入腎也腎著湯滲濕湯見中小便秘大便秘濇五苓散吞戊己丸見中若兼感風則証兼惡風或額上微汗除濕湯桂枝湯各半貼令微發汗不可大發已得汗而發熱不去者敗毒散加蒼朮一錢防已五分若兼感寒則無汗慘凜煩痛五積散見中和除濕湯見中五苓散各半貼若感寒又感風者汗出身重惡風喘滿骨節煩痛狀如歷節風臍下

至脚冷痺不能屈伸所謂風寒濕合而為痺也防己黃芪湯或

五痺湯

見痺

若浴出未解濕裙褲忽爾熟睡濕侵腎經外腎腫

痛腰背彎曲五苓散加八真坏少許下青木香丸

見氣

三服臧府

通腫消腰直痛止

坐濕處腎九腫痛六味地黃

見虛

加柴胡

吳茱萸肉桂各一錢獨活五分

若濕與熱相搏清熱滲濕湯

其証肩背沉重疼痛

有熱則上行于肩背也

土熱胸膈不利及通身疼痛

者拈痛湯

見身軀痛

濕熱發黃當從鬱治

比濕熱之物必鬱而後黃

逍遙散

茵陳五苓

酒麴乳酪停滯不化除濕湯及蒼白二陳湯消息之

二

陳加二米二陳見疲飲

上吐下利二法利比吐為多以濕水也多就下

又利大便小便二法利小便比利大便為多以濕非挾痰食等