

聖濟總錄

吳錫璜著

已4

86245

大德重校聖濟總錄卷第一百五十九

逆產門

逆產

論曰逆產者蓋因妊婦初覺腹痛產時未至驚動傷早兒迴轉未竟便用力產之即令逆也又或安產之處及坐卧須順四時方面并避五行禁忌若觸犯者多致災禍

治難產或經數日或生不以理橫逆艱難百方千計終不平安者急服此藥在兒身上立生若妊娠八月便服臨產則易不覺兒出酥膏方

真牛酥

壹斤

秋葵子

壹升

白蜜

半斤

大豆黃卷

貳兩

滑石

搗末貳兩

蘧麥

壹兩

右六味先將藥四味為末次取酥於慢火中煎化後下蜜攪勻將藥投入調和得所以資合盛每服一匙溫酒調下加至二匙

治橫產及倒生胎斃腹中及衣不出母欲絕半夏散方

半夏

為末用生薑汁製作餅暴乾半兩

白欬

壹兩

右二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下產難一服橫產二服倒生三服胎

斃衣不出四服此方加瞿麥一兩煎服尤佳

治逆產不正小麥飲方

小麥

小豆各揀淨炒

右二味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治婦人橫產倒生死胎在腹脹爛不出催生柞木葉飲方

柞木葉

壹把圍參寸長并細枝子剉

甘草

壹莖長壹握如小拇指拍破

右二味用水三升半慢火同煎至一升半去滓用瓷瓶盛紙封瓶口於產婦房內慢火煨先服一小盞少頃心頭快更服一小盞不問服數三四盞內惡物下尋常催生甚驗

治橫生倒產子死腹中胎衣不下烏金散方

當歸

酒浸切焙

沒藥

研別

生乾地黄

焙

蒲黃

生用

芍藥

炒

紅藍花

炒各壹兩

鯉魚鱗

臘月者佳

桂

去麤皮各貳兩

血餘

小兒胎髮真者貳枚

右九味將血餘鯉魚鱗二味用銷銀鍋子先以炭火燒為灰沒藥別研餘藥搗羅為末和勻每服二錢匕溫酒調下不拘時

治難產經三四日或橫倒不出垂死滑胎煎方

瞿麥

取總壹兩

酥

伍兩

滑石

葵子

各貳兩

黑豆皮

壹合

白蜜

肆兩

牛膝

去苗壹兩

右七味除酥蜜外擣羅為末將酥蜜鍊熟入諸藥末及牛乳汁五兩煎成煎以瓷器盛每服半匙溫酒或湯化下不拘時

治橫產倒生安胎酸漿飲方

五葉酸漿草不拘多少

右一味取自然汁半盞酒半盞染煙脂末半錢匕和勻溫飲之未効再服

治逆產法

大蒜

蒜頭去皮

生薑

半兩

葱白

去青參拾莖各拍碎

右三味置在一盆子中以百沸湯五椀乘熱投於盆中速扶產婦於盆上坐候冷易之凡三易則胎正

又法

右取竈底心黃土細研五合以生薑汁煎令熱調如麪糊塗產母臍中以熟帛繫之頻換

又法

右取鹽和胡粉醋調塗兒兩足下即順

又法

右取蒲黃用水調塗兒足心底

又法

右取丹砂末半錢匕蜜調塗兒足底又以丹砂筆書兒兩足底左作千字右作里字即順

又法

右取三家鹽熬令黃研末以津唾調塗兒足底次取三家飯置產婦手中

又法

右以父名書兒足底即順

又法

右取車釭中膏書兒足底作出字

又法

右以鍼刺兒先出足底兒足痛驚還即順手出如刺足法

又法

右以中指取釜底墨煤交書兒足下即順

治逆產及子死腹中艾葉湯方

生艾

伍兩

右一味以清酒一升煮取七合旋服之則順或不飲酒用水煮之

又方

大麻人

淨揀研
爛半兩

右一味以水二盞同煎至一盞去滓溫服

又方

右取牛鰾延絞以溫酒和服之

又方

右燒錢七枚令赤投一盞酒中去錢飲之

又方

葵花

焙乾葵子
亦得參兩

右一味擣羅為散每服二錢匕溫酒調服

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

右取竈屋上黑塵以溫酒服二錢匕

又方

右取彈子二枚擣羅為散以溫酒調服二錢匕

又方

右取甌帶燒灰研散溫酒調服二錢

又方

右取蛇蛻皮燒灰研末溫酒調服一錢匕面東向服一方取蛇皮灰豬脂丸如梧桐子大每服五丸面東吞之

又方

右取晚蠶子紙一幅燒灰研末米飲調服

又方

右取夫十指甲燒灰研末以酒溫調服

又方

右取梁上塵三指撮以暖酒調服之

又方

右取菟絲子搗為末溫酒調服二錢匕

又方

右取車前子搗為末溫酒調服二錢匕

又方

當歸

切焙
壹兩

右一味搗羅為末每服二錢匕溫酒調服

又方

大豆五合

右一味以苦酒二升煮減半分溫服之

產難

論曰臨產或難蓋為和氣動亂心氣不寧所致也古人有預備方法臨月服滑胎散并日行一二千步貴使血氣下順至產無留難之慮欲產先須看產圖及催生湯藥無致喧雜驚忙又須產閣溫暖或遇嚴寒之日四圍燒火及備熱湯

聖濟總錄
卷之二十一
熱諸異香常令香火湯氣及身惟諳事人看候產婦纔覺腹痛速與食飲令飽
無或困乏飢以雌雞煮粥渴以蠟蜜煎湯悶以新汲冷水少飲或空痛經日而
胎未動者宜安心熟忍以薦蓆鋪地就上安產免為地氣所侵又就上行三五
百匝或困於行暫且扶立須臾又行如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆也諸
餘法度宜次序行之

治難產不下經日車前子散方

車前子

微炒
半兩

榆白皮

刮淨剉
碎壹兩

滑石

半兩

當歸

切焙
半兩

瞿麥穗

壹兩

右五味擣羅為散每服二錢匕用酒調下溫湯亦得如血水未下用大黃二
錢煎湯一盞分作三服調前藥下

治產難催生如意膏方

蓖麻子

參桑粒去
殼研如膏

丹砂

半錢
研細

右二味一處和研勻用油單一片方圓如盞口大將藥攤之當臍下少腹間
貼之外以帶帛繫令固候產罷并胞衣下畢速去之稍緩即脫人氣血此藥
覺腹痛便宜用之

治難產經日未生牛酥煎方

真牛酥

參兩

秋葵子

壹合

白蜜

貳兩

滑石

瞿麥穗

大豆黃卷

各壹兩

右六味先以清酒一升研細葵子內酥蜜中微火令銷後即下諸藥慢火煎常如魚眼沸約強半如膏成則將瓷器中以綿濾之用溫酒調初服半匙漸加至一匙

治難產車前子煎方

車前子

壹升又以前布裏熟於水中熟按漉出日暴乾

生地黄汁

壹升

白蜜

壹升

好酥

伍合

右四味相和微火煎常令如魚眼沸起即瀉於瓷器中每服半匙以沸湯調通口服之

治難產數日不下蛇蛻皮丸方

蛇蛻皮

壹條燒灰

臘月兔腦髓

壹枚

車脂

東許大暴乾

右三味除兔髓外擣羅為末以兔髓按和為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

治難產滑胎貝母散方

貝母 壹兩半 去心秤 槐子 十月上巳日採 之佳壹兩半

右二味搗羅為散每服三錢匕以熟水調服未生更服

治難產產乳論云三十後嫁者謂之晚嫁也少嫁則筋骨軟懦易產也晚嫁則筋骨堅強所以難產八月宜常服苧麻根飲方

乾苧麻根 新者刮削 淨剉碎 陳橘皮 湯浸去 白焙

甘草 炙

生乾地黄 焙 烏梅 去核 取肉 人參 各貳 兩

右六味麤搗篩每服二錢匕以水一盞生薑二片同煎至七分去滓溫服日夜各一

治腹痛雖甚二三日不產蒲黃散方

蒲黃 壹合 研 槐子 微炒 半兩

右二味搗研為細散每服二錢匕以溫酒調服須臾即生

治難產如覺痛甚服此散即覺平安馬齒莧散方

馬齒莧 常莧 各暴乾參兩 重午日採

右二味搗羅為散每服二錢匕新汲水調服宜頻服之

治難產燒弓絃散方

弓絃伍寸對碎 箭簞伍寸對碎

右二味同燒作灰研為細散作一服以溫酒調下其子即出未効再燒服

治數日不產胎上衝心欲死牛酥飲方

牛酥兩半 冬葵子淨淘微炒壹合 滑石參分

右三味以二味搗羅為末和牛酥置生絹袋內盛之用酒一升煎至七合去

藥袋子令溫每服半盞一二服如未下更服之

治難產生地黃飲方

生地黃汁壹盞 生薑汁貳分

右二味同煎至一盞分四服每以湯或酒和服胎則生也

治難產催生芍藥散方

赤芍藥貳兩 溫麻頭壹握揀擇淨對碎 芍藥

茯苓去木 甘草微炙 陳橘皮湯浸去白焙各貳兩 當歸切壹分 亂髮灰壹分

右八味搗羅為散臨卧時溫酒下二錢匕頻服之立生

治難產蟹爪飲方

蟹爪合劉壹

甘草微炙半兩

阿膠炙合壹兩

右三味㕮咀如麻豆每服三錢匕以東流水一盞煎至七分去滓溫服如未產更一二服

治難產澤瀉湯方

澤瀉壹兩

瞿麥去根劉碎貳兩半

榆白皮刮淨劉碎貳兩

甘草

炙令赤壹兩半桂皮去麤

木通劉碎

牛膝酒浸半日切焙壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半入生薑三片同煎至一盞去滓溫服一服未產更服

治難產腹痛胎不轉動甘草湯方

甘草

微炙半兩

榆白皮刮淨劉碎壹兩

桂心壹兩半

葵子壹合

滑石

參分

右五味搗篩為麤末每服四錢匕以水一中盞煎至六分去滓溫服

治難產催生抵聖散方

紅藍花

六月六日取

蜀葵花

五月五日採

桃花

三月三日採

凌霄花

七月七日採

大麥

七月十五日採各壹分

右五味依時採取搗羅為細散每服三錢匕以熱酒調下立產

又方

蛇蛻皮

壹條全者取端午日置於沙羅中用紙壹張

右一味蛇皮用水浸於日煎之候乾收此紙有難產者剪三小片子如蛇形新汲水吞之立產或每片紙子內拌牛糞中豆與吞亦神効此男左女右手內把出藥也

又方

蘧麥

半兩

桂心

貳錢半

蟹爪

半合

牛膝

酒浸半日切焙半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服如未產更服

治難產疑胎斃腹中試驗當歸湯方

當歸

切焙貳兩

芍藥

剉貳兩

右二味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎至六分去滓溫服如胎活則便安

如胎斃即下又一法苦酒調下亦驗

治產難數日不出或子死腹中母氣欲絕桂心湯方

桂心

去麤皮壹兩半

瞿麥

穗取

木通

剉碎

牛膝

酒浸半日切焙

榆白皮

剉淨剉碎各貳兩

右五味麤擣篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服如未生更服
又一方單煮瞿麥服之亦出

治婦人血氣不調心腹疴痛或月閉不通每有妊娠多難產易生湯方

蒼朮淨洗去皮
拾貳兩

桔梗陸兩

枳殼去瓢
楚炒

麻黃去根
節

附子炮裂去
皮臍

陳橘皮湯去白
各參兩

芍藥

白芷

芎藭

當歸切焙

甘草剉

桂去麤
皮

半夏湯洗
柒次

赤茯苓去黑皮各
壹兩半

厚朴去麤皮生
薑汁炙

乾薑炮各
貳兩

右一十六味除桂枳殼二味別為麤末外一十四味同為麤末慢火炒令色
轉攤冷次入桂枳殼末令勻每服三錢匕水一盞半醋一合入生薑三片煎
至一中盞去滓稍熱服不拘時候

治婦人難產及橫逆生神聖散方

乾豬胎

鯉魚皮

女人亂髮參味各壹兩入
瓶子內燒令焦

鑄墨

伏龍肝細研各
半兩

墨煨醋淬
參度

當歸切焙

桂去麤
皮

芍藥

白殭蠶炒

白芷

白附子炮

芎藭各壹
兩

右一十三味擣羅為散再研細每服三錢匕熱酒調下臨產腹痛時便子母

俱無恙產後每日空心一服治月內諸血疾

治滑胎易產車前子散方

車前子

滑石各壹兩

阿膠炙燥壹兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕蜜湯調下不拘時服

治難產及已產胞衣不下或墮胎後血不下瞿麥湯方

瞿麥穗

消石

黃連須去

滑石

甘草炙各壹兩

王不留行

延胡索

當歸切焙

大黃剉炒各壹兩壹分

生乾地黄焙

連皮大腹剉

鬼箭羽

射干

威靈仙去土

雷丸

檳榔剉

京三稜煨剉

郁李人炒各壹兩半

吳茱萸

湯洗焙炒半兩

牽牛子炒貳兩

右二十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫

服不拘時

又方

真珠

研半兩

伏龍肝壹兩

右二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下

治婦人臨產胞傷風冷腹痛頻併不能分娩催生湯方

王不留行 京三稜煨 牽牛子炒 百合 當歸切

威靈仙各壹兩半 雷丸 大黃炒 天雄炮裂去皮

桂去麋皮 甘草炙各分 大腹貳兩

右一十二味吹咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治妊娠難產方

水銀壹分 膩粉壹分 兔腦拾貳目者

右三味研以免腦和為丸如梧桐子大不計時候以溫水下五九

治產難多時不下垂困宜服此七聖煎方

蘧麥 滑石各壹兩 牛乳 黑豆黃 酥參味各貳兩

冬葵子壹合 白蜜貳合

右四味搗篩為細末以乳酥蜜調藥令勻慢火熬成稀膏每服一匙熱酒調

下

治難產勝妙寸金散方

敗筆頭壹枚燒灰