

四

吳黼堂
評註

陳無擇三因方

上海棋盤街
文瑞樓印行

有中醫藥學會書簽

編號 11-185 $\frac{4}{8}$



三因極一病源論粹方卷之九

胸痞證治

病者心下堅滿。痞急痛。肌中苦痺。緩急如刺。不得俛仰。其胸前皮皆痛。手不得犯。胸中幅幅而滿。短氣。欬唾引痛。咽塞不利。習習如痒。喉中乾燥。時欲吐。嘔煩悶。自汗時出。痛引徹背。不治則數日殺人。病名胸痞。由下虛極。氣上控膈使然。其脈陽微陰結。

括蔞丸 治胸痞。胃中痛。徹背。氣塞喘息。欬喘。心腹痞悶。

括蔞

去穰取子。炒香熟。留皮與穰別用。

枳殼

麩炒等分。

右二味。為細末。先取括蔞皮穰研細。水熬成膏。和二物末為丸。如梧子大。滾水下二十五丸。食後服。

橘皮生薑湯 治胸痞。胃中噎塞。幅幅如滿。習習如痒。喉中澁。咳唾

燥沫。

陳皮 一兩

枳實 二錢麩炒

生薑 半兩

右為末剉散分二服。水二盞煎七分。去滓食前服。

梔子湯

治胸痞切痛。

此方與倉卒散煮製不同故別出之

山梔子

二兩燒存性

附子

炮三兩

右剉散。每服三錢。水二盞。薤白三寸。同煎至五分。食前溫服。

吳鞠堂曰。此症胃部發腫。西洋醫所謂胃炎。古人所謂胸痺症也。膈間痛痞。苦難名狀。不治則殺人。括萸枳殼善於排膿滑降。為胸痞第一對症之藥。又曰。此病狀與脂肪心亦相類。

健忘證治

脾主意與思。意者。記所往事。思則兼心之所為也。故詩云。言心未必是思。言思則必是心。破外人議。思心同時。理甚明也。今脾受病。則意舍不清。心神不寧。使人健忘。盡心力思量不來者。是也。或曰。常常喜



醫藥大學圖書館

忘故曰健忘。二者通治。

小定志丸 治心氣不定。五臟不足。甚者憂憂愁愁。不樂。忽忽善忘。

朝差暮劇。暮差朝發。及因事有所大驚。夢寐不詳。發高步險。以致神魂不安。驚悸怯恐。

遠志

去心薑汁淹炒

菖蒲

炒各二兩

茯苓

茯神

人參

各三兩

右為末。蜜丸如桐子大。辰砂為衣。每服五十丸。米湯下。一方去

茯神。名聞心散。每服二錢匕。無時煎服。

菖蒲益智丸 治喜忘恍惚。破積聚。止痛安神。定志。聰明耳目。

石菖蒲

炒

遠志

去心薑汁淹炒

人參

桔梗

炒

牛膝

酒浸各一兩一分

桂心

三分

茯苓

一兩三分

附子

製二兩

右為末。蜜丸如桐子大。每服三十丸。溫酒米湯下。食前服。

吳鞠堂曰。健忘乃神經之病。心通於腦。心氣不足者。亦或有之。陳

無擇引內經脾主意與思指為脾病而所用九者皆安神益智之品此本原之疾非湯藥所能奏效取用九方二則至簡至精我國醫學病原未甚洞悉而用方每多切當此蓋由久經實驗而來也其菖蒲益智丸配合尤有法度

虛煩證治

虛煩者方論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽虛生外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒大病不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產後多有此病其證內煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴輾轉不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷寒之說不可不辨又平人自汗小便頻併遺泄白濁皆憂煩過度之所致也傷寒屬外因憂煩屬內因霍亂兼不內外因學者當辨析而調治之淡竹茹湯治心虛煩悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及婦人產後



心虛驚悸煩悶欲死

麥門冬去心

小麥各二兩半

炙草一兩

人參

白茯苓

各兩半

半夏製二兩

右剉散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一團如指大煎

七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也以此藥主之又治驚悸

製半夏

竹茹

枳實

麴炒各二兩

陳皮

二兩

炙草

一兩

茯

苓一兩半

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分去滓食前

服

酸棗仁湯

治霍亂吐下增劇虛煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒

熱頭疼暈悶



酸棗仁

炒一兩三分

人參

桂心各一分

知母

茯苓各三錢三字

石

膏

煨半兩

炙草

二分

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎七分去滓食前服
吳鞠堂曰大病後虛煩餘火紛擾者多而夾痰次之觀仲景竹葉
石膏湯一方而兩扼其要可以悟矣前人有云由血虛神不守舍
者此乃一小部份之症未可据為正論也

五痿敘論

夫人身之有皮毛血脈筋膜肌肉骨髓以成形內則肺心脾肝腎以
主之若隨情妄用喜怒不節勞逸兼併以致內藏精血虛耗榮衛失
度發為寒熱使皮血筋骨肌肉茶痿無力以運動故致痿躄狀與柔
風脚弱相類以脈證并所因別之不可混濫柔風脚氣皆外所因痿
躄則屬內藏氣不足之所為也宜審之

五痿證例

病者肺熱皮虛弱薄者足痿躄其色白而毛脫名曰皮痿由肺熱葉焦使然也肺為五臟長有所失亡所求不得則發肺鳴肺鳴則肺葉焦論曰五臟因肺熱葉焦發為痿躄

病者心下熱膝腕樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩不能任其地其色赤而絡脈溢名曰脈痿由悲哀太甚陽氣內動數洩血故本病論曰大經空虛發為肌痺傳為脈痿

病者肝熱口苦筋膜枯乾筋急而攣其色蒼而爪枯名曰筋痿由思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也

病者脾熱胃乾而渴肌肉不仁其色黃而肉蠕動名曰肉痿由隣於濕地以水為事居處下澤濡漬痺而不仁故下經曰肉痿者得之濕



地也。

病者腎熱腰脊不舉。骨枯而髓減。其色黑而齒枯。名曰骨痿。因有
遠行勞倦。遇大熱而渴。陽氣內乏。熱舍於腎。致水不勝火。則骨枯
髓虛。故下經曰。骨痿者。生於大熱也。

五痿治法

諸治痿法。養陽明與衝脈。陽明主胃。乃五臟六腑之海。主潤宗筋。束
骨。以利機關。衝脈者。諸經之海。主滲灌谿谷。與陽明合養於宗筋。會
於氣街。屬於帶脈。絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱。帶脈不引。故足痿
不用也。治之各補其榮。而通其輸。調其虛實。和其逆順。至筋脈骨肉
各得其旺時。病乃已矣。

加味四斤丸

治腎肝藏虛熱淫於內。致筋骨痿弱。不自勝持。起居

須人。足不任地。驚恐戰掉。潮熱時作。飲食無味。不生氣力。諸虛不



足

肉苁蓉

酒浸

牛膝

酒浸

木瓜

兔絲子

酒浸通軟
別研細

鹿茸

煨去毛
切酥炙

熟地

天麻

五味子

酒浸各
等分

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服五十丸。空心溫服。酒米飯食前服。

一法不用五味子。有杜仲。

麋角丸

治五癢皮緩。毛悴血脈枯槁。肌肉薄着。筋骨羸弱。飲食

不滋。庶事不興。四肢無力。爪枯髮落。眼昏唇燥。疲憊不能支持。

麋茸

銚一斤。酒浸一宿。

熟地黃

四兩

大附子

生。去皮臍。一兩半。

右用大麥米二升。以一半藉底。一半在上。以二布巾隔覆。炊一日。

取出藥與麥別研。焙乾為末。以浸藥漆清酒煮麥粉為糊。搜和得

所。杵三千下。丸如桐子大。每服五十丸。溫酒米湯任下。食前服。

王啟玄傳玄珠先生耘苗丹三方。序曰。張長沙戒人妄服燥烈之藥。

熱偏有所助。勝尅流變。則真病生焉。猶閔苗之不長。而堰之者也。若稟氣受血不強。合服此而不服。反忽畧之。是不耘苗者也。故名耘苗丹。上丹。養五臟。補不足。秘固真元。均調二氣。和暢榮衛。保神守中。久服輕身耐老。健力能食。明目降心。大交腎水。益精氣。男子絕陽事。女子絕陰。乃不能姪。腰膝重痛。筋骨衰敗。面色黧黑。神志昏寤。寤寐恍惚。煩憤多倦。夢遺餘瀝。膀胱邪熱。五勞七傷。肌肉羸悴。上熱下冷。難任補藥。服之半月。陰陽自和。肌肉光潤。澤顏色。開心意。安魂魄。消飲食。養胃氣。

五味子

四兩二作半斤

百部

酒浸一宿焙

兔絲子

酒浸另研

肉苁蓉

酒浸

杜仲

炒去絲

遠志

去心

枸杞子

防風

去蘆

白茯苓

巴戟

酒浸去心

蛇床子

柏子仁

研別

懷山藥

各二兩

右為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前。溫酒鹽湯任下。

春用乾棗湯。夏用五味子四兩。四季月加肉蓯蓉六兩。

秋加枸杞子六兩。冬加遠志肉六兩。食後兼服衛生湯。

衛生湯 補虛勞強五臟除煩養真氣退邪熱順血脈緩中安和神

志潤澤容色常服通暢血脈不生癰瘍養胃益津

當歸 去蘆尾

白芍藥

各四兩

黃芪

八兩

炙草

一兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓年老加酒半盞煎不拘

時服

中丹 補百損體劣少氣善驚昏憤上焦客熱中脘冷痰不能多食

心腹痞滿脾胃氣衰精血妄行容色枯悴

黃芪 去蘆

白芍

當歸

去蘆尾各四兩

白茯苓

去皮

人參 去蘆

桂心

各二兩

大附子

炮去皮臍

川椒

炒出汗一兩

黃芩

各一兩為末姜汁和作餅

右為末粟米飲搜和搗千餘杵丸如桐子大每服三五十丸



溫酒送下。食前服。

下丹別本作小丹 補勞益血。去風冷百病。諸虛不足。老人精枯神耗。女

子絕傷斷產。久服益壽延年。安神志。定魂魄。滋氣血脉絡。開益智

慧。釋散風濕。聰明耳目。強壯筋力。悅澤肌膚。氣宇泰定。

大熟地 肉蓯蓉酒浸各六兩 五味子 兔絲子酒浸各五兩 柏子仁

天門冬去心 蛇床子炒 覆盆子 巴戟酒浸去心 石斛各三兩

川斷續 澤瀉 人參 山藥 遠志肉炒 山萸肉 菖蒲

桂心 白茯苓 杜仲炒去絲各二兩 天雄炮去皮臍一兩

右為細末。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。食前溫酒送下。加至五

十丸。忌五辛。生葱。蕪荑。錫鯉。虛人多起。去鍾乳。倍地黃。多忘。倍

遠志。茯苓。少氣神虛。倍覆盆子。欲光澤。倍柏子仁。風虛。倍天雄。

虛寒。倍桂心。小便赤濁。二倍茯苓。一倍澤瀉。吐逆。倍人參。

芎桂散

見前中風門

治四肢疼痛軟弱行履不便

藿香養胃湯

治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗筋

無所養遂成痿躄

藿香

白朮

神麴

炒

白茯苓

烏藥

縮砂仁

半夏麴

米仁

人參

各半兩一錢半

華澄茄

甘草

炙各三錢半一本作各一錢

右用水二鐘薑五片棗二枚煎一鐘不拘時服一本為散每服四錢

吳鞠堂曰五痿治法均見精碁集中不數見也

失血叙論

夫血猶水也水由地中行百川皆理無壅決之虞血之周流於人身榮經府俞外不為四氣所傷內不為七情所梏自然順適萬一微爽節宣必至壅閉故血不得循經流注榮養百脉或泣或散或下而亡敗或反逆而上溢乃有吐衄便利汗痲諸症生焉十種走失無重於斯



中醫藥大學圖書館

隨症別之乃可施治

外因衄血證治

病者因傷風寒暑湯流傳經絡陰陽相勝故血得寒則凝泣得熱則
泛溢各隨藏府經絡湧泄於清氣道中衄出一升一斗者皆外所因
治之各有方

桂枝括蕞根湯 治傷風汗下不解鬱於經絡隨氣湧泄衄出清血或
清氣道閉流入胃管吐出清血遇寒泣之色必瘀黑者

桂枝 白芍

括蕞根

甘草

川芎

等分

右剉散每服四大錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分去滓服頭
痛加石膏

麻黃升麻湯

刻本發熱解利不行似悞

治傷寒熱不解汗不行血隨氣壅世謂

之紅汗是也



麻黃

去節湯泡三兩半

升麻

一分兩

黃芩

芍藥

甘草

石膏

煨

茯苓

各

右剉散

每服四錢

水盞半

薑三片

煎七分

去滓

熱服

微汗解

五苓散

治伏暑飲熱

暑氣流入經絡

壅滯發衄

或胃氣虛

血滲入

胃停留不散

吐出一二升許

方見傷暑門

如衄血

則以茺花煎湯下

用得效

吳鞠堂曰

茅花不若茅根之妙

除濕湯

治冒雨着濕

鬱於經絡

血溢作衄

或脾不和

濕着經絡

流入胃

胃滿吐血

茯苓

乾薑

各四錢

甘草

炙

白朮

各二錢

右剉散

每服四錢

水一盞半

煎六分

去滓

服

頭疼加川芎二錢

最

止浴室中發衄

內因衄血證治



病者積怒傷肝。積憂傷肺。煩思傷脾。失志傷腎。暴喜傷心。皆能動血。蓄聚不已。停留胸間。隨氣上溢。入于清氣道中。發為鼻衄。名五臟衄。止衄散。治氣鬱衄。無比神效。

黃芪

錢六

赤茯苓

白芍

生乾地黄

當歸

阿膠

炒各三錢

右為細末。煎黃芪湯。調下二錢匕。未知再作。

吳鞠堂曰。止衄散。病久者可用。若初起而用黃耆。衄必益甚。

不內外因證治

病者飲酒過多。及噉炙燂五辛熱食。動於血。血隨氣溢。發於鼻衄。名酒食衄。或隨車馬打撲傷損。致血淖溢。發為鼻衄。名打傷衄。

加味理中丸。治飲酒過多。及噉炙燂熱食動血。致發鼻衄。

人參

白朮

乾薑

炮

乾葛

炙草

川芎

各等分

右剉散。每服四錢。水一盞。煎七分。去滓溫服。

