

姑蘇葛可久吐編
此皆祖葛可久十藥神書

長樂陳脩園註
隨宜應變無過不及治

不愈然亦治之於初病之時與夫病之未經深入者

十藥神書註解

不知十方中錯綜變化有幾千百方故復採周氏之

便

上。便

翻刻必究

遠安堂藏板

葛氏自敘

夫人之生。皆稟天地之氣而成形。宜乎保養真元。固守根本。則一病不生。四體輕健。若曰不養真元。不守根本。病卽生矣。根本者。氣血精津也。予得先師之教。萬病無如癆症之難。蓋因人之壯年。血氣充聚。精液完足之際。不能守養。惟務酒色。豈分饑飽。日夜耽慾。無有休息。以致耗散精液。則嘔血吐痰。骨蒸煩熱。腎虛精竭。形羸頰紅。面白口乾。咽燥小便白濁。遺精盜汗。飲食難進。氣力全無。斯因火乘金位。重則半年而斃。輕則一載而傾。况

爲醫者不究其源。不通其治。或大寒大熱之藥妄投。亂進。不能取效。殊不知大寒則愈虛。其中大熱則愈竭。其所以世之醫者無察其情。予師用藥治癆。如羿之射。無不中的。余以用藥次第。開列於後。用藥之法。逐一條陳。如嘔血咳嗽者。先服十灰散。揭住。如不住者。須以花蕊石散止之。大抵血熱則行。血冷則凝。見黑則止。此定理也。止血之後。患人必疏解其體。用獨參湯補之。令其熟睡。一覺。不要驚動。醒則病去六七矣。次服保真湯。止嗽寧肺。太平丸潤肺扶痰。消化丸下痰疏氣。保和湯分

治血盛、痰盛、喘盛、熱盛、風盛、寒盛六事。加味治之餘無
加法。又服藥法曰：三日前服保真湯。三日後服保和湯。
二藥相間服之爲準。每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中。用
太平丸徐徐嚥下。次噙一丸。緩緩化下。至上床時候。如
此用之。夜則肺竅開。藥必流入肺竅。此訣最爲切要。如
痰壅。却先用錫糖烱消化丸百丸吞下。又依前嚼太平
丸。令其仰臥而睡。嗽必止矣。如有餘嗽。可煮潤肺膏服
之。復其根本。完其真元。全愈之後。方合十珍丸服之。此
謂收功起身藥也。前藥如神之妙。如神之靈。雖岐扁再

世。不過於此。吁。世之方脉用藥。不過草木金石。碌碌之
常耳。何以得此通神訣要。奇異之靈也。余蒙師授此書。
吳中治癆。何止千萬人哉。未嘗傳與一人。今衛世恐此
泯失。重次序一新。名曰十藥神書。留遺子孫。以廣其傳
矣。時至正乙酉一陽日。可久書於姑蘇養道丹房。
余自髫稚。學業醫道。攷究方脉。三十餘年。遍歷江湖。多
學廣傳者。不過言語文字形容之耳。及至用藥治病。皆
不能捷。是以日夜苦心用志。務在中病後。遇至人同處。
三月。斯人極明醫道。精通方術。用藥如發矢。無不中的。

余曰。必神人也。遂拜爲師。得授奇方一冊。閱之。或羣隊者。或三四味者。皆余目觀至人用效者也。使予如久旱逢霖。夜行得月。心中豁然。自此回至吳中。一用一捷。無不刻驗。信乎奇方。可鉅梓者也。余以三餘暇日。將至人所授奇方。併日用決效之法。類成一帙。名曰十藥神書。蓋用效者。輒記錄之。今西浙大癡道人。與余通家之好。用禮求授。故錄以奉養生濟人之功用。爾時至正戊子春正月三陽日。可久再書於姑蘇春先堂。

釋世以三朝曰何人再書外世將亦衣室

世無求計對疑以未發為元人之也其詞粗至五九千

蓋所茲普神指殺之今四朝人集世入財余通宋之世

世對清世相日用外疑之

不隨經言平海也其世集世也今以三對世也

蓋所史行世月中世集世也今以三對世也

世集世也今以三對世也

世集世也今以三對世也

姑蘇葛衆久先生精通方術與丹溪朱彥修齋名所
著十藥神書專治虛損雖編中僅列十方而用藥之
次第逐一條陳吳航陳修園謂其奇而不離於正誠
哉是言也顧前此流傳皆爲贋本修園解組後始得
原書重加注解將刊附於傷寒論金匱要略之後而
未果乙卯歲萱從舊書坊中得一鈔本於今二年矣
遍詢方家俱無是書萱不敢私自秘藏因並信湯方
俚謠亟謀付梓以廣其傳庶不負先生匡世壽人之

意云爾

咸豐歲次疆圉大荒落季冬後學林壽萱謹跋

十藥神書註解目錄

姑蘇葛可久編

閩長樂陳念祖修園註
東治林壽萱潤甫韻

全卷

甲字十灰散

乙字花蕊石散

丙字獨參湯

丁字保和湯

戊字保真湯

巳字太平丸

庚字沉香消化丸

辛字潤肺膏

壬字白鳳膏

癸字補髓丹

傷寒醫訣串解卷六

受業姪道著纂集

閩長樂陳念祖修園著

東治林壽萱校訂

厥陰篇第六

厥陰爲風木之臟從熱化者多從寒化者少以木中有火故也

何謂厥陰症。傷寒論云。厥陰之爲病。消渴。火盛。氣上。撞心。氣逆。卽火逆也。心中疼熱。火邪入心。飢火能消物也。而不欲食。木尅土也。食則吐衄。虫爲風化。一聞食臭。則上久於膈而吐出。下之利不止。誤下傷胃氣是也。厥陰爲兩陰交盡。宜無熱症。然厥陰主肝。而膽藏

於內。則厥陰熱症。皆少陽之火內發也。要知少陽厥陰。同一相火。相火鬱於內。是厥陰病。相火出於表。爲少陽病。少陽咽乾。卽厥陰消渴之機。胸脇苦滿。卽氣上衝心之兆。心煩卽疼痛之初。不飲食是飢不欲食之根。喜嘔卽吐衄之漸。故少陽不解。轉屬厥陰。爲病危。厥陰病衰。轉欲少陽。爲欲愈。

烏梅丸。爲厥陰證之總方。吐衄久利者。尤宜。

病初起。手足厥冷。脉微欲絕。宜當歸四逆湯。有久寒。加生姜。吳萸。酒水各半煎。以相火寄於肝經。雖寒而臍。

不寒。故先厥者後必發熱。手足愈冷。肝膽愈熱。故云厥深熱亦深也。姜附不可妄投。

脉結者。脉緩時一止曰結。活人云。陰盛則結。代者一臟氣敗。其脉動而中止。不能自還。而他臟伐之。心動悸。心氣不寧。炙甘草湯主之。按他經亦有此症。是陽氣太虛。虛極生寒。非姜附肉桂不爲功。若用此藥。是速其死也。惟厥陰症。肝中之相火本少。陽之生氣而少。陽實出坎中之真陰。卽經所謂陽予之正。陰爲之主。是也。

按前言表證而手足厥逆此言裏証而脉結代雖爲厥陰寒化終不用姜附大熱之品以厥陰之臟相火遊行於其間故也

脉微欲絕不可下若脉滑而厥是內熱鬱閉所謂厥應下是也下之是下其熱非下其實泄利下重者四逆散欲飲水數升者白虎湯皆所以下無形之邪也若以承氣下之則不止矣

熱利下重者白頭翁湯主之

下利欲飲水者熱也白頭翁湯主之

以上治熱化之法也。

厥者必發熱。熱與厥相應。熱深厥亦深。熱微厥亦微。此四症。此厥陰傷寒之定局。先熱後厥。厥熱往來。厥多熱少。熱多厥少。此四證是厥陰傷寒之變局。皆因其人陽氣多少而然。

乘脾乘肺二症宜辨。

曰傷寒腹滿。經云諸腹脹大。皆屬於熱。此由肝火也。譴語。經云肝氣盛則多言。寸口脉浮而緊。緊卽弦脉。此肝乘脾也。名曰縱刺期門。

曰傷寒發熱。嗇嗇惡寒。肺主皮毛。因無頭痛項強。非屬
太陽病。爲肺虛。渴欲飲水。無白虎證之欲飲。亦爲肺
虛。腹滿無承氣證。因肺虛不能通調水道。此肝乘肺
也。肺金虛不能制木。肝寡於畏。侮所不勝也。名曰橫。
刺期門。肝有亢火。隨其實而瀉之。
傷寒陽脉濇。陰脉弦。法當腹中急痛。此亦肝乘脾也。先
與小建中湯。肝以補脾不差者。中氣虛而不振。邪
尙流連。與小柴胡湯主之。令木邪直走少陽。使有出
路。所謂陰出之陽則愈也。

傷寒厥而心下悸者。宜先治水。當服茯苓甘草湯。却治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。此亦肝乘肺也。雖不發熱惡寒。亦木實金虛。水氣不利所致。上節腹滿是水在中焦。故刺期門以泄其實。此水在上焦。故用茯苓甘草湯以發其汗。此方是化爲汗發散。內邪邪之劑。卽厥陰治厥之劑也。

內經云。厥陰之上。風氣治之。所謂木也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。又曰。厥陰不從標木而從中見也。又曰。厥陰爲闔。又熱病論曰。傷寒六日。厥陰受之。厥陰