

臨證指南醫案

倪
韞
如



臨證指南醫案月

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室



臨證指南醫案卷九

丁丑九月 茗溪漫士臨木

許闕李太瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪 壯士堂

調經

愁鬱
氣血
滯

張九經先期色變。膚腠刺痛無定所。晨泄不爽利。從來不

生育。由情懷少歡悅。多愁悶鬱。則周行之氣血不通。而

脈絡間亦致間斷蒙痺。例以通劑

川芎

當歸

肉桂

生芫

小荷

則有大此味不香

有香附此不必用



脈數者不
宜用桂枝
建中湯為
仲景有明
文

後期
鬱傷
久嗽
肺氣
虛

桃

茯苓

生香附

南山查一益母膏九

久嗽背寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛穀

減不欲食此情志鬱傷此症難治延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪

桂枝

白芍

炙草

南棗

飴糖

肺為氣出人之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之饑已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣



而桂枝白芍非斂陰和血之妙品乎

肝犯胃 秦

一氣衝心痛嘔涎氣墜少腹爲瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

此是血枯之病不宜用燥藥

川連

小茴

川楝子

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

歸尾

鬱傷肝脾

華二

鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必

佐益氣之屬方爲合法 歸脾湯

又向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少



婦人全以
血為主治
法亦當以
血為事

處處用柴

胡而近日

目附天士

之門者云

天士終身

不用柴胡

腹氣衝過胃上膈咽喉腫癰四肢逆冷遂令昏迷此皆
肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速精動
極之徵為肝用太過宜制其用前此芪朮奇補不可用
矣一安胃理中丸去黃相細辛

錢

脈滯腕悶減食經水來遲腹痛墜

此當用血藥

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又諸恙未減腹但痛不墜逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許八經閉寒熱便澹腹痛加味逍遙散去山梔



不用柴胡
豈非夢境

血絡
鬱熱
腹痛

奇脈
虛寒
滯

某 血虛內熱經不至 加味道遙散去水

某 經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫九 奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續向八脈治

法 歸建中湯

久嗽遇勞寒熱 歸芪建中土薑

謝三 能食不通痕泄絡事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心竅八脈奇經交病

人參 扶苓 艾葉 製香附

淡薤蓉 淡骨脂 肉桂 當歸



鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏九

王三脈右緩左瀉經水色淡後期嘔吐痰水食物畢姻三載餘不孕此久鬱疑痰滯氣務宜宣通後陽明厥陰六

方

生夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法在

又

三月中用辛溫宣鬱方痰癰目下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用滑

養衝任栽培生氣方法

八珍去朮草地加小茴肉桂

斷艾香附紫石英河車膠九



肝腎虛寒

朱

六經水一月兩至或幾月不來五年來並不乃官月焦
此宜呢肢體常冷是衝任脈損無有貯蓄暖益腎肝主之

八參

河車膠

熟地製

歸身

白芍

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

衝脈

程

虛

七十三三年不孕其中勾病非一病人述經期遲至來
期預先三日周身筋骨脉絡牽掣發楚不得舒展凡女

人月水諸絳之血必彙集血海而下血海有即衝脈也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛



北京中醫藥大學圖書館版權所有

此案理明
阿達

肝腎
可脈
陰虛

未

損感見病治病之悞有終身不育淹淹之累肝血陰虛
木火內寄古人溫養下焦必佐涼肝堅陰勿執經後期
為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

何當重虛血藥

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

經云陽維為病苦寒熱緣上年冰雪甚少反失其藏

春牛潮濕地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生方淺

必云脈虛待可也

脈隸乎肝腎一身綱維八脈乏束固之司陰弱內熱

陽微外寒突替春當痛經事愆期血海漸涸久延虛出

情景已露局方逍遙散固交科聖藥大意重在肝脾二



經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱。勃可使條暢。全則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當索仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

此方無著

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

陰虛某

陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

菴蔚子

女貞子

桂圓



痛經
傷氣
血滯

張四
三寒熱間日經來腹痛

宜用清熱動之藥古凡見表一病未有不先治其表者

小生地

丹皮

知母

生薑

澤蘭

花粉

某二
十一
先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病
與下焦痕泄則異

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某二
六
寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱
傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯



歸身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

此方無著

周十室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日

為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴多瀉忽

結究脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而

奇經衝任躋維諸脈皆肝胃屬隸脈不循序流行氣血

日加阻痺失治心結癥聚痞痞之累

南山查 生香附 延胡 當歸 青皮

三稜 蓬朮 牛膝 川棟子 澤蘭

肉桂 炒小茴 荔枝汁丸

顧經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆

病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟一錢

丹皮三錢

炒查一錢

胡連八分

延胡一錢

澤蘭二錢

歸鬚二錢

生白芍一錢

又柏子仁丸

吳鬱傷絡脉痛經

此衝任脉有寒

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

費

經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷

形瘦日減脈來右大左弱上部火升下焦冷徹骨中陰



鮑魚海味也腥稔異常不堪人煎藥中欲藉以補陰豈本草中別無善藥氣分此老不過熱一時弄巧以異欺人遂開後日廣譽為奇立異之門取種種不堪入藥之食酸物臚列成氣血

陽乖違焉得孕育閭醫都以補血清劑宜乎

陽攝陰法
宜用溫經法

鮑魚內經用此生地
淡菰蓉

當歸
枳子仁
炒山查
牛膝

茯苓
紅棗蘼艾湯法丸

朱
脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有

熱

細子芩
白芍
黑山梔
釣藤
茯苓

當歸鬚
香附
茺蔚子
桑枝

李
酸漬入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三



北京中醫藥大學圖書館版權所有

方以為獨滯

開生面別

授秘傳足

徵廣博并

示靈巧此

風至今愈

甚此老難

辭作帥之

咎總之近

口時醫先

未能誠真

病症因不

敢施用經

方反藉此

希奇怪誕

之物塞責

一時明知

誤治轉可

令人無從

辨駁耳是

冒賜

朱

臨證指南醫案卷九
日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經遺意

以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其直絡者宜之

韭白汁

桃仁

延胡

小荷

當歸鬚

川棟子

王三

苦辛泄降胸脘脹悶已舒此嗽血皆肝膽氣火上升

必經來可安

南山楂

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香末

者韭白汁

當節令呵久煩倦秋深進食微有惡心病起至今月

事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔



以此風日甚而荷葉
退豆殼螺
殼橘白枇
杷核查核
淡菜丑筋
一切神農
本草及方
書所棄之
物收用不
遺吁此醫
道之一變
也

脾胃
陽虛

濕滯
腹痛

賦滯當停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減便澀浮腫無清嗽

通經之理扶持中土望其加穀

四君子湯

效者不宣

某

三經閉兩月腕痺嘔惡此氣室不宜胃陽礙鈍使然當

用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣

